





molis

M


12

19

f

28








LUGDUNI BATAVORUM.
Salomonem Wagenaer 7665

J. Halkius. fecit

BIBLIOTECA NAZIONALE
ROMA
VITTORIO EMANUELE



A. CORN. CELSI
DE
MEDICINA

LIBRI OCTO,
EX RECOGNITIONE

JOH. ANTONIDÆ
VANDER LINDEN.

D. & Prof. Med. Pract. ord.


Editio Secunda.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud SALOMONEM WAGENAREM

CLC LXV.







CLARISSIMO VIRO,
DOMINO
GUIDONI PATINO,
BELLOVACO,
DOCTORI MEDICO PARI-
SIENSI, ET PROFESSO-
RI REGIO, AMICO
SVO MAGNO
SALUTEM.



CLARISSIME VIR,
CICERONIS ista glo-
riatio est: *Latinos omnia invenisse
melius, quam Græcos; aut ab illis
accepta fecisse meliora.* Augusta pro-
fecto, & magno viro magnarum-
que rerum fiduciam habente dig-
na! Quam & veram minimeque

vanam deprehendit , quisquis à Romanis posteritati tradita comparat cum Græcis. Ne longum abeam , Oratorum quidem laus ita ducta fuit ab humili ad summum : fuere & Philolophiæ studia sic ad Latinos traducta , ut ne bibliothecis quidem Græcis egerint. Neque vulgare est , quod de nostra arte Celsus promeruit. Quam enim ab Hippocrate , ab Asclepiade , ab aliis Græcorum plurimis accepit scribendi de Medicina materiam , hoc ipso fecit meliorem , quod primus eam sic conceperit , ut esset ad discendum aptior , ad faciendum promptior. Græcorum antea nemini , quod sciam , id laudis datum , quod artem redegerit in systema , & corpus methodo constitutum. Celsus præstitit , & res faciendæ medicinæ utiles ac solum necessarias ita ingeniose ac diligenter ex antiquis elegit , ita per partes digessit , hasque ipsas innexuit inter se ,

se, ut vel Recentiores inter non noverim, quem ipsi jure possis anteponere. Neque ad eam laudem refert, sermone tantum, an etiam opere fuerit medicus. Si enim coire ista semper necesse est, quotusquisque hodie medicus est? Cathedrarios quippe videas medicinæ scientiam plerumque subtilius, quam ex usu, excolere, atque hoc per ambitionem, quam vocant veri scrutationem, agere, ut ingenio & facundia vincant. Contra, qui quæstui serviunt, bene gnari, morbos non eloquentia, sed remediis curari, ut populo placeant, ex quo ille major est, sufficere credunt secreta jactare & his curatorum longas ostentare tabellas. Hippocrates certe pro Medicis habet, qui veram artis sibi cognitionem compararunt: sed transferre ad usum suadet, & fructum eorum, quorum gratia est inventa. Saperene putandus est, qui lucernam accendit, & subter modium ponit? Sapit, &

bene de se ac proximo meretur,
qui accensam imponit candela-
bro, ut alluceat omnibus qui sunt
in domo. Cæterum hoc dubitare de
Celfo docti solent, fueritne in ope-
ribus Artis exercitatus. Quo de
quia meam aliquando sententiam
rogasti, dicam paucis. Magnum
quid medendi scientia est: majus,
prudencia atq; sapientia. illa quip-
pe scientiæ oculus; hæc manus est.
Absque prudencia si est, neque tem-
pora lustrare Medicus rei bene ge-
rëndæ, neque præcipientes captare
occasiones potest. Absque sapien-
tia si est, tractare homines ignorat,
& suo quæmque calopodio calcea-
re. Uti vèro scientia nisi discendo,
hoc est, legendo, audiendo, cogi-
tando; ita prudencia & sapientia,
nisi faciendo & rebûs se gerendis
accommodando, non comparan-
tur. Ex artis scientia Celsus si venit
æstimandus, vix persuaderi potest,
ut is non habeatur pro Medico, &
quidem usu longo atque exercita-
tione

tionē perfectō , qui suis scriptis
Medicinæ intima penetralia subiis-
se, abdita quæque enucleasse, peni-
tus abstrusa rimatum esse, suam
ubique de iis sententiam inter-
ponendo se prodit. Quod esse ju-
diciū novisti ejus , qui præfa-
tus olim ad Rubeum fuit. Pro-
bum mihi, & ex toto probatum.
Si, quæ in nullius non morbi cura-
tione elucēt , prudentiam atque
sapientiam spectemus, ubi, te quæ-
so , unum Hippocratem si exci-
pias, utriusque aut salubriora præ-
cepta , aut fideliora monita repe-
risti? Quæ, si numquam noster
venit in rem , quemadmodum fuit
affectus? Purasne , secreta atque
arcana artis , hoc est intimas &
occultas ad salutem cujusque per-
tinentes rationes scire posse eum,
qui in conclave numquam pene-
travit? Quæ sola felici ingenii
magnitudine complexum, & ob
id alieni operis interpretem atque
Hippocratis ejusque sectatorum

* §

disci-

discipulum, & exscriptorem habendum esse potius, quam medicinæ aliquem auctorem, judicium est viri egregie eruditi. Cui per me subscribere, quibus libet, licet. nam à me non impetro. Si rectum tamen, heu! quantos auctores amisimus! Ex toto quippe Galenico oceano, si dicere per invidiam fas est, non tot interiora medendi consilia quis hausserit, quam ex ubère hoc Cornelii rivo. Fateor, plus est in Galeno florum, ut & foliorum: sed fructuum plus in Celso est. Taceo multis locis sic illum loqui, ut, se fecisse medicinam, liquido satis demonstret: nullo sic, ut contrarium inde queat liquere. Solum obstare videtur, quod Plinius sua ætate, hoc est centum & viginti præter propter annis post, solam hanc artium Græcarum nondum exercuisse scribit Romanam gravitatem, & in tanto fructu paucissimos Quiritium attigisse, eosque ipsos statim
ad

ad Græcos transfugisse ; imo vero
 auctoritatem aliter quam Græce
 eam tractantibus, etiam apud im-
 peritos expertesque linguæ, non
 fuisse. Si ex vero ista, sicuti cau-
 sam non credendi non habemus
 oculato testi ; quei credimus Cel-
 sum, ex gente Cornelia, omnium
 Romæ nobilissima, oriundum,
 factitasse artem, populus quam
 expertus damnavit ? Non hoc
 ulli volo persuasum, fuisse ἐκ τῆς
 οἰοδότηων, quos vocat Mode-
 stinus l. 6. §. 1. ff. de Excusatio-
 nibus ; atque adeo solitum ἀνὰ τὴν
 πόλιν φοιτᾶν, & ægros visitatum
 circuire mercedis causa. M. Ca-
 tonem meminit idem Secundus
 professum, esse commentarium si-
 bi, quo mederetur filio, servis,
 familiaribus. Nec alia ratione
 medicinam exercuisse Cornelium
 puto ; nec apud alios, nisi for-
 te, quod nonneminis video place-
 re, in gravioribus casibus sic pas-
 suse adiri, & eam rogari operam,

quæ virum nobilem non dedecere-
ret. Verbo : talem opinor fuisse
Medicum, qualis Cato fuit, aut
quales sunt hodieque Regum ar-
chiatri. Qui, etsi non omnibus vi-
gilant, miserabilibus tamen per-
sonis & ad se, ceu Æsculapium ali-
quem, confugientibus suam nega-
re opem non sustinent; scientes,
nulla re hominem magis accedere
ad Deum, quam salutem homini-
bus dando. Præter hæc quæ aut
dici in eandem sententiam, aut
objici possunt, jam sunt ab aliis
vel occupata vel refutata: ut ne-
cesse non sit illis repetendis vel
tempus prodigere, vel doctas tuas
aures & gravioribus intentas cu-
ris obtundere. Hoc unum dicam,
qualis qualis noster fuerit, dig-
nissimus est, vel doctrinæ cul-
tu, vel elegantiae nitore, non so-
lum qui legatur, sed qui num-
quam de manibus deponatur. Me,
fateor, nullius post Hippocratem,
lectione vel affici magis, vel
erudiri.

erudiri. Quo factum, ut & sæpius
relegerim, & numquam sine vo-
ro, existeret aliquis, qui aut daret
eum nobis quam emendatissimum,
aut emendandi materiam suppeditaret. Quam tuo tandem beneficio
consecutus nobilem & locuple-
tem, statim operi admovi manum;
quo & meæ satisfacerem cupidita-
ti, & expectationi eorum, apud
quos nulla non occasione & lauda-
re Cornelium nostrum, & serio
commendare sum solitus. Quam
autem feliciter mihi res sub manu
fuccefferit, te velim vel in primis
judicare. Nam hæc inter plurimas
mihi causa est, quod Celsum i-
stum, quem meum imagine qua-
dam adoptionis feci, celeberrimo
tuo nomini, & multis mihi nomi-
nibus suspiciendo colendoque con-
secrarim. In seculi quippe hujus
& tam antiquitatis fastidiosi,
quam novitatis omnis cupidi,
conspectum proditurientem, nec
sine patrono ausum, cuius in
clien-

clientelam potius, quam tuam
debui dare? Absque illis certe sub-
sidiis, quæ mihi numquam sine
summa laude loquendum studium
tuum juvandi publicum tulit, si
fuisset, vel animum non applicuis-
sem ad recognitionem Authoris ut
eruditissimi, ita & corruptissimi.
Quis credat, post Egnatii, Cæsa-
rii, Constantini, Stephani, Pan-
tini, Ronssiei, Rubei, tot illu-
strum virorum diligentissimas
curas, fuisse mihi plusquam bis
mille locis corrigendum? Quo
ipso quia fecisse me opus putabam
non pœnitendum, aut tuo nomine
& seculo indignum, etiam hoc au-
sus sum illi inscribere. quamvis
non ignorem multo plura majora-
que me debere amoris & beneficiis
in me tuis. Itaque te rogo, Vir
Clarissime, hanc cautionem acci-
pere crediti, & animi ad omnem
se gratitudinis memoriam obligan-
tis. Certe hunc, quem eo vultu,
quo omnes literatos soles ample-
cti,

Et, suscipiendum tibi offero, si non
industriæ, saltem laboris mei fœ-
tum, testem esse volo, quanti &
sim & in perpetuum tibi sim futu-
rus debitor. Deus autem immor-
talis diu te sospitem atque incolu-
mem Rei medicæ, literariæ, pu-
blicæ, imo mihi & omnibus bonis
conserveret. Dabam Lugduni-Ba-
ravorum Mense Augusto, anni
cLo lccLVI.

*Tui nominis atque dignitatis
cultor propensissimus*

JOH. ANTONIDES
VANDER LINDEN.

LECTORI.



ISTO tibi, amice Lector,
A. CORN. CELSUM,
authorem latinissimum,
medicum sapientissimum
prudentissimumque. Cu-
jus ego amorem tibi si velim commenda-
re, idem fecero, quod hederam qui sus-
pendit vino veteri & bono. Quemad-
modum namque virtutem non potest
non amare ac sequi, quisquis ejus pul-
chritudinem atque pretium novit: ita
Celsum nemo non aestimat, nemo non
diurna versare manu, versare noctur-
na studet, quin in succum & sanguinem,
quod ajunt, convertere, nisi qui igno-
rat, quanto nitore atque cultu, quanta
industria atque solertia istos de Re me-
dica libros octo (solos nobis ex pluri-
bus eisque eruditissimis ingenii ac vi-
giliarum egregie elaboratarum monu-
mentis reliquos) scripserit, atque ex
Hippocrate cumprimis, medicina pa-
rente, contraxerit, adhibitis in omni
graviore negotio etiam in consilium a-
liis,

liis , & semper quidem optimis authoribus. Quales omnino necesse est fuisse, si sola confisus ingenii magnitudine , nulla artis exercitatione comparata notitia , tam admirandum nobis opus concinnare est aggressus. Quod me non credere , jam supra dixi. Scepticos inscribendo sequutum , author est Quintilianus. Quod si de sermonis ornatu intellexit , concedi potest : non facile , si de modo doctrine. Ita enim scripsit , ut qui neutiquam dubitavit , non suam modo sententiam aperte profiteri , sed & summorum quoque virorum ad incudem cum rationis tum experientie revocare ; quin & necessaria ac laudanda in artibus libertate mutare precepta eorum , qui medendo scribendoque se ostendebant aberrare , non tam à placitis & à doctrina majorum , quam ab officio medici , quod Asclepiades esse dicebat , referente nostro , ut tuto , ut celeriter , ut jucunde curet. Ubiq; autem ea usus est modestia Celsus , ut , ei si numquam tanti putaret authorem , quanti hominum salutem , neminem sua tamen laude fraudare

fraudaret. Quamquam vero jam ipsius
aetate medicina esset in tres sectas, easq;
plurimum inter se dissentientes, didu-
cta; ita tamen Dogmatica (quæ mini-
me omnium deflecebat ab Hippocrati-
ca) se applicuit adhasitque, ut nihilomi-
nus etiam ab Empirica atque Metho-
dica principibus acceperit, quæ rationa-
lis conjectura atq; fidelis usus compro-
bassent : dignus vel ipso proposito, ut
eum penetrasse cujusvis sectæ omnia,
atque delectu habito, in hanc velut mul-
torum operum epitomen conguessisse me-
liora quæque, credamus. Forma operis,
supra quam nostrum putat vulgus, or-
nata est, & ordinata. Sermo toto in ope-
re plenus, purus, venustus, castus, &
quod præcipuum est, accommodus rei
tradendæ; adeo ut in medicina quidem
nemo uti meliore scribendi magistro
queat. Ordo, quam in toto dilucidus, in
partibus articulatus, tam est in utrisque
appositus ad usum. Quem ut solum Cel-
sus spectavit, ita nihil eo non pertinens,
non necessarium attulit : quin, resectis
omnibus, non dicam superfluis, sed quæ
aliunde

aliunde & possunt & revera debent
accipi, eam solummodo Medicina par-
tem persecutus est, in qua proprie &
principaliter ars consistit. Quo de dice-
rem plura, nisi te discere hoc ex ipso
authore mallet. Ego certe, propter qua
dixi, illum mihi semper habui familia-
rem, & dignum in quo non solum ver-
sando studii, sed & emendando operæ
plurimum, atque laboris ponerem. Ita-
que conquisitis in eam rem necessariis,
quæ quidem potui, hoc in presenti egi,
ut textum exhiberem quam maxime
emendatum. Feci id adjutus iis subsi-
diis, quorum mox catalogum exhibebo.
Quantum fecerim, non aliunde rectius
cognosces, quam si conferre editionem
hanc cum omnibus velis, quæ prodie-
runt hætenus. Præter quæ dixi, sæpe
mihi fuit Hippocrates adeundus.
Quem quanti noster fecerit, non tam
ex ore ipsius, quam opere disces. quod,
quia omnibus paginis quamplura exin-
de transsumta continet, auctori meruit
nomen Hippocratis latini. Quæ causa
mihi curavi utrumque conferendi, &
colli-

colligendi quoque, quæ Foesius in doctissi-
mis suis ad Hippocratem notationibus
pridem observavit. Quædam, sed ad-
modum pauca, ex ingenio tentavi, & ni-
si cum res aperte postularet. In cæteris,
ubi mei mihi libri & ingeniosa summo-
rum virorum conjectura non praluce-
bant, malui errorem retinere, aut lo-
cum in suspitione saltem relinquere.
Quod & eo securius mihi licere puta-
vi, quia Cl. D. Johannem Rhodium,
virum inter seculi & nostræ artis pri-
mos, à multis annis ex multo plurimis
cum membranis tum libris emaculatissi-
mum & quem ab Authore habuit, ni-
tori hanc dubie restitutum ac luculen-
tissimis commentariis illustratum, pe-
nes se servare scio. Quem & rogo (si
quid veteris se amicitia memoria pati-
tur rogari) ut ne diutius protollat ex-
spectationem atque desiderium eorum,
qui & Celsum & Rhodium in pretio &
amore magno suo merito habent. Glos-
semata offendi plura: nullum tamen,
præter forte unum, quod nimio erat
ἀπεργασίον ausus sum de medio tol-
lere;

lere; quia nullum huc praevenire habebam librum. Librorum in capita distinctiones uti ab ipso authore esse certum est ex VI. 12. & VIII. 9. in fine: ita lemmata illis adscripta esse à librariis, & è margine in titulos transsumta, ne locus quidem dubitandi est. unde & aliquid licere mihi in istis putavi. quin, si forma operis fuisset, redire eo, unde venerant auctoris injussu, jussissem. Præter hæc animus erat, notas addere, & quasdam nostras in auctorem observationes: sed, præter quam modo retuli, causa alia fuit libri forma. Quam & ego & typographus Διμετακόμιστον in præsens malebamus: ille, lucri gratia; ego, auctoris. Quem mihi spes est reperturum tanto plures emtores lectoresque, quanto est editio ista cæteris emendatior, & elegantior atque aptior ad circumferendum. Vale, & tuus mihi favor sit stimulo ad tuum in commodum majora melioraque conandum.



LIBRI,

Quorum mihi usus fuit in hoc opere recognoscendo.

Mss. seu *Ἀρχαῖος* codicis Parisiensis, descriptum anno CIO CXXIV. Communicavit V. cl. D. Ioh. Hoornbeeck, SS. Theol. D. & Profess. ordin. in Academia, ac V. D. Min. in Ecclesia, quæ est Lugd. Batavorum, Collega reverendus.

Liber editus Venetiis, apud Aldum. 1528. in 4. sed sedulo collatus atque emendatus à V. cl. Iac. Carpentario, Doct. Med. Parisiensis & Prof. Regio, ex codicibus duorum Med. Parisiensium; nempe Ioh. Fernelii, viri incomparabilis, & Ioh. Capellani, qui ei in comitina Archiatrôn anno CIO IO LVIII. successit apud Henricum II. Galliarum Regem. Mutuo dedit V. cl. D. Guido Patinus, Bellovacus, Doct. Med. Parisiensis & Professor Regius, amicus mihi eximius.

Alius ibidem editus 1549. in fol. cum Medicis antiquis. Quem sua manu V. cl. Nic. Nancelius contulit cum editionibus, quotquot suo tempore exstabant, excepta Stephani; toto opere ad marginem adscriptis non modo lectionibus, ubi à libro, qui erat præ manu, varia-

variabant; sed & propriis conjecturis, raro non bonis & doctis. Hunc quoque utendum dedit V. cl. D. Guido Patinus, ob singulare publicum juvandi studium numquam & nulli non laudandus.

Alius Lugduni editus apud Ioan. Tornaesium, 1554. in 12. cui ad oram V. ill. Ios. Scaliger, seculi miraculum, & Veteris cuiusdam codicis lectiones & suas emendationes atque notas adscripsit. Quem ipse testamento reliquit V. cl. D. Ælio Everhardo Vorstio, Botanices ac Medicinæ, dum viveret, Professori primario; ego autem usui acceptum debeo V. cl. D. Adolfo Vorstio, Parenti optimo in utraque & professione & dignitate successori dignissimo, ac Collegæ meo honorando.

Variae lectiones, è Mss. Codice antiquo Bibl. Regiæ Parisiensis, qui inscriptus erat, Medicina antiqua, descriptæ anno 1631. à V. cl. D. Ioh. Walæo, Med. Doct. & postea Professore insigni.

Variae lectiones è libro Sacri Iohannis, ab eodem excerptæ. Et has & præcedentes mihi utendas dedit D. Antonius Clementius, à Mergæitns, Cl. D. Walæi ex sorore nepos, juvenis doctus, probus, pius, & , si fata svisissent, longiore vita dignus.

Præter quæ contuli etiam eorum editiones, emendationes, annotationes, lectionesque varias, quorum in epistola ad Cl. D. Patinum feci mentionem Quemadmodum & illa, que

*que Ianus Cornarius in comm. ad Gal. de
Comp. pharm. quæque alii & celebres inter
Criticos (quos Fax artium liberalium exhi-
bet) auctores observarunt. Hoc quoque te
scire tua interesse, Lector amice, putavi.
Nunc adi ad Authorem. Quem, si cum cura
& studio leges, spondeo,*

*Lectio lecta, magis decies repetita,
placebit.*

A. CORN.



A. CORN. CELSI
MEDICINÆ
LIBER PRIMUS.

PRÆFATIO.



V T ALIMENTA sanis corpo-
ribus Agricultura, sic sanita-
tem ægris Medicina promit-
tit. Hæc nusquam quidem
non est. Siquidem etiam im-
peritissimæ gentes herbas, aliaque promp-
ta in auxilium vulnerum morborumque
noverunt. Veruntamen apud Græcos ali-
quanto magis, quam in cæteris nationi-
bus, exulta est: ac ne apud hos quidem à
prima origine, sed paucis ante nos secu-
lis; utpote cum vetustissimus author Æscu-
lapius celebretur. Qui, quoniam adhuc
rudem & vulgarem hanc scientiam paulo
subtilius excoluit, in deorum numerum
receptus est. Hujus deinde duo filii, Po-
dalirius & Machaon, bello Trojano du-
cem Agamemnonem secuti, non me-
diocrem opem commilitonibus suis attu-
lerunt.

fessoribus peritos ejus fuisse accepimus :
clarissimos vero ex his Pythagoram , &
Empedoclem , & Democritum. Hujus au-
5 tem (ut quidam crediderunt) discipulus
Hippocrates Cous, primus quidem ex om-
nibus memoria dignis , ab studio sapien-
tiæ disciplinam hanc separavit , vir & arte
& facundia insignis. Post quem Diocles
10 Carystius , deinde Praxagoras & Chrysi-
pus , tum Herophilus & Erasistratus sic ar-
tem hanc exercuerunt , ut etiam in diver-
sas curandi vias processerint.

Iisdem temporibus in tres partes medi-
15 cina diducta est : ut una esset , quæ victu :
altera, quæ medicamentis: tertia, quæ ma-
nu mederetur. Primam *διατροφικὴ* , secun-
dam *φαρμακωλικὴ* , tertiam *χειρουργικὴ*
Græci nominaverunt. Ejus autem, quæ vi-
20 ctu morbos curat , longe clarissimi autho-
res etiam altius quædam agitare conati, re-
rum quoque naturæ sibi cognitionem ven-
dicaverunt, tanquam sine ea , trunca & de-
bilis medicina esset. Post quos Serapion ,
25 primus omnium , nihil hanc rationalem
disciplinam pertinere ad medicinam , pro-
fessus , in usu & experimentis eam posuit.
Quem Apollonius, & Glaucias, & aliquan-
to post Heraclides Tarentius , & alii quo-
30 que non mediocres viri secuti, ex ipsa pro-
fessione se *ἐμπειρικὸς* appellaverunt. Sic
in duas partes ea quoque, quæ victu curat ,
medicina divisa est , aliis rationalem ar-

tem, aliis usum tantum sibi vendicantibus: nullo vero quicquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationem magna ex parte mutavit. Ex cujus successoribus Themison nuper ipse quoque quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime viros salutaris ista nobis professio increvit. 10

Quoniam autem ex tribus medicinarum partibus, ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur, ante omnia de hac dicendum est. Et, quia prima in ea dissensio est, quod alii sibi experimentorum tantummodo notitiam necessariam esse contendunt: alii, nisi corporum rerumque naturalium ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est, quæ maxime ex utraque parte 20 dicantur, quo facilius nostra quoque opinio interponi possit.

Igitur hi, qui rationalem medicinam profitentur, hæc necessaria esse proponunt: Abditarum & morbos continentium 25 causarum notitiam, deinde Evidentium, post hæc etiam Naturalium actionum, novissime Partium interiorum. Abditas causas vocant, in quibus requiritur, ex quibus principiis nostra corpora sint, quid secundam, quid adversam valetudinem faciat. Neque enim credunt, posse eum scire, 30 quomodo morbos curare conveniat, qui, unde

unde hi sint, ignoret. Neque esse dubium,
 quin alia curatione opus sit, si ex quatuor
 principiis vel superans aliquid vel defi-
 5 ciens adversam valetudinem creat; ut qui-
 dam ex sapientiæ professoribus dixerunt:
 alia, si in humidis omne vitium est; ut
 Herophilo visum est: alia, si in spiritu; ut
 Hippocrati: alia, si sanguis in eas venas,
 10 quæ spiritui accommodatæ sunt, transfun-
 ditur, & inflammationem, quam Græci
 φλυμενὴν nominant, excitat, eaque in-
 flammatio talem motum efficit, qualis in
 febre est; ut Erasistrato placuit: alia, si ma-
 15 nantia corpuscula per invisibilia foramina
 subsistendo iter claudunt; ut Asclepiades
 contendit. Eum vero recte curaturum,
 quem prima origo causæ non fefellerit.
 Neque vero inficiantur, experimenta quo-
 20 que esse necessaria; sed, ne ad hæc quidem
 aditum fieri potuisse, nisi ab aliqua ratio-
 ne, contendunt. Non enim quidlibet anti-
 quiores viros ægris inculcasse; sed cogitas-
 se, quid maxime conveniret; & id usu ex-
 25 plorasse, ad quod ante conjectura aliqua
 ducti essent. Neque interesse, an initio ple-
 raque explorata sint, si à consilio tamen
 cœperunt. Et id quidem in multis ita se
 habere. Sæpe vero etiam nova incidere ge-
 30 nera morborum, in quibus nihil adhuc
 usus ostenderit. ut ideo necessarium sit
 animadvertere, unde ea cœperint; ceu sine
 quo nemo mortalium reperire possit, cur

hoc, quam illo, potius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evidentes vero has appellant, in quibus quærunt, initium morbi calor 5 attulerit, an frigus; fames an satietas; & quæ similia sunt. Occursurum enim initio dicunt eum, qui originem non ignorarit. Naturales vero corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus & 10 emittimus; cibum potionemque assumimus & concoquimus: itemque, per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modo submittant se, modo 15 attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia, neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis, intra hæc nascentibus, posse. Ex quibus quia quammaxime pertinere ad rem concoctio 20 videtur, huic potissimum insistent; & duce alii, Erasistrato, atteri cibum in ventre contendunt: alii, Plistonico Praxagoræ discipulo, putrescere: alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque 25 Asclepiadis æmuli, qui, omnia ista vana & supervacua esse, proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant. Illud vero 30 convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nā si teritur intus, eum quærendum esse, qui facil-

facillime teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum, qui maxime calorem foveat. At
5 nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur: ea vero sumenda, quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveni-
10 ant, perceperit. Præter hæc, cum in interioribus partibus & dolores & morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quas ipse ignoret.
15 Necesse est ergo esse, incidere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari. Longeque optime fecisse Herophilum & Erasistratum, qui nocentes homines, à regibus ex carcere acceptos, vi-
20 vos inciderint, considerarintque, etiamnum spiritu remanente, ea, quæ natura ante clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, durtiem, mollitiem, lævorem, confractum:
25 processus deinde singulorum & recessus, sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit. Neque enim, cum dolor intus incidit, scire, quid doleat, eum, qui qua parte quodque viscus intestinumve
30 sit, non cognoverit. Neque curari id, quod ægrum est, posse ab eo, qui, quid sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus viscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cujusque colo-

colorem partis ignoret, nescire, quid integrum, quid corruptum sit; ideo nec succurrere quidem posse corruptis : aptiusque extrinsecus imponi remedia , compertis interiorum & sedibus & figuris , cognitaque eorum magnitudine : similesque omnia , quæ propofita sunt , rationes habere. Neque esse crudele, sicut plerique proponunt, hominum nocentium, & horum quo- 10 que paucorum , suppliciis remedia populis innocentibus seculorum omnium quæri.

Contra hi, qui se *ἰατρικὸς* ab experientia nominant, evidentes quidem causas, ut necessarias, amplectuntur: obscurarum vero 15 causarum & naturalium actionum quæstionem ideo supervacuam esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit. Non posse vero comprehendere, patere ex eorum, qui de his disputarunt , discordia : cum de ista re , neque inter sapientiæ 20 professores, neque inter ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit , 25 omnium posse videri non improbabilis : si curationes , ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatem, Itaque neque disputationi , neque authoritati cujusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiæ 30 studiosos maximos medicos esse , si ratiocinatio hos faceret : nunc illis verba superesse , deesse medendi scientiam. Differre

ferre quoque pro natura locorum , genera medicinae ; & aliud opus esse Romae , aliud in Ægypto , aliud in Gallia. Quod si morbos hæ causæ facerent, quæ ubique eadem essent, remedia quoque ubique eadem esse debuisse. Sæpe etiam causas apparere, utputa lippitudinis, vulneris; neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiciat evidens causa, multo minus eam posse subicere, quæ in dubio est. Cum igitur illa incerta incomprehensibilisque sit , à certis potius & exploratis petendum esse præsidium ; id est, his , quæ experientia in ipsis curationibus docuerit , sicut in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem aut gubernatorem disputatione , sed usu fieri. Ac , nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere , eo quoque disci , quod , qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse , quia non ab obscuris causis , neque à naturalibus actionibus , quæ apud eos diversæ erant ; sed ab experimentis , prout cuique responderant , medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinam , sed ab experimentis. Ægrorum enim , qui sine medicis erant , alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium abstinuisse, levatumque magis eorum morbum fuisse , qui abstine-

rant.

A 5

rant. Itemque alios in ipsa febre aliquid
 edisse, alios paulo ante eam, alios post re-
 missionem ejus: optime deinde his cessis-
 se, qui post finem febris id fecerant. Ea-
 demque ratione alios inter principia pro-
 tinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo;
 gravioresque eos factos, qui se implerant.
 Hæc similiaque cum quotidie inciderent,
 diligentes homines notasse, quæ plerunque
 melius responderent: deinde ægrotantibus
 ea præcipere cœpisse. Sic medicinam or-
 tam, subinde aliorum salute, aliorum inte-
 ritu, perniciofa discernentem à salutaribus.
 Repertis deinde medicinæ remediis,
 homines de rationibus eorum differere
 cœpisse: nec post rationem, medicinam es-
 se inventam; sed post inventam medici-
 nam, rationem esse quæsitam. Requiere
 etiam, ratio idem doceat, quod experien-
 tia, an aliud. Si idem, supervacuam esse: si
 aliud, etiam contrariam. Primo tamen re-
 media exploranda summa cura fuisse, nunc
 vero illa explorata esse: neque ulla aut
 nova genera morborum reperiri, aut no-
 vam desiderari medicinam. Quod si jam
 incidat mali genus aliquod ignotum, non
 ideo tamen fore medico de rebus cogitan-
 dum obscuris: sed eum protinus visurum,
 cui morbo id proximum sit; tentaturum-
 que remedia similia illis, quæ vicino malo
 sæpe succurrerint; & per ejus similitudi-
 nem opem reperturum. Neque enim se di-
 cere,

cere, consilio medicum non egere, & irrationabile animal hanc artem posse præstare; sed has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere, quia non interfit, quid morbum faciat, sed quid tollat. Neque ad rem pertinere, quomodo, sed quid optime digeratur: sive hac de causa concoctio intercidat, sive de illa; & sive concoctio
 10 sit illa, sive tantum digestio. Neque quærendum esse, quomodo spiremus; sed, quid gravem tardumque spiritum expediat: neque, quid venas moveat; sed, quid quæque motus genera significant. Hæc autem cog-
 15 nosci experimentis. Et in omnibus, ejusmodi cogitationibus in utramque partem disferi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere: morbos autem, non eloquentia, sed remediis curari. Quæ si quis elinguis usu
 20 discretæ bene norit, hunc aliquanto majorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo. Id vero, quod restat, etiam
 25 crudele; vivorum hominum alvum atque præcordia incidi; & salutis humanæ præfidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præsertim ex his, quæ tanta violentia quæran-
 30 tur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, lævorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non esse talia, inciso cor-

pore, qualia integro fuerint. Tum quia, corporibus inviolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, & mille aliis mediocribus affectibus sæpe mutantur. Unde multo magis verisimile, interiora, quibus major mollities & lux ipsa nova est, sub gravissimis vulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo jam mortuo. Nam ne utrum quidem, ut nihilominus aerem contineat, spirante homine posse diduci: simulatque vero ferrum ad præcordia accessit, & discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (*διάφραγμα* Græci vocant) hominem protinus animam amittere: itaque demum mortui præcordia & viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit, non quale vivi fuit. Itaque consequi medicum, ut hominem crudeliter jugulet; non ut sciat, qualia vivi viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subjiciatur, id sæpe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem à latronibus exceptum sic vulnerari, ut ejus interior aliqua pars, & in alio alia, aperiatur; atque ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque cognoscere pr-

pru-

prudentem medicum , non eadem , sed sanitatem molientem; idque per misericordiam discere , quod alii dira crudelitate cognoverint. Ob hæc, ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse. Quæ, etsi non crudelis , tamen fœda sit, cum aliter pleraque in mortuis se habeant : quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa curatione ostendat.

Cum hæc per multa volumina, perque magnæ contentionis disputationes à medicis sæpe tractata sint atque tractentur : subijciendum est , quæ proxima vero videri possint, neque addicta alterutri opinioni , neque ab utraque nimium abhorrentia , sed media quodammodo inter diversas sententias. quod in plurimis contentionibus deprehendere licet , sine ambitione verum scrutantibus, perinde ut in hac ipsa re. Nam quæ demum causæ , vel secundam valetudinem præstent , vel morbos excitent; quomodo spiritus, aut cibus , vel deferatur , vel digeratur , ne sapientiæ quidem professores scientia comprehendunt, sed conjectura prosequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre , quam experientiam. Quanquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie non pertinentia , tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Itaque
ista

ista quoque naturæ rerum contemplatio,
 quamvis non faciat medicum, aptiorem
 tamen medicinæ reddit. Profecto verifi-
 mile est, & Hippocratem & Erasistratum 5
 & quicumque alii, non contenti febres &
 ulcera agitare, rerum quoque naturam ex
 aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem
 medicos fuisse, verum ideo quoque mayo-
 res medicos extitisse. Ratione vero opus 10
 est ipsi medicinæ, si non semper inter ob-
 scuras causas, neque inter naturales actio-
 nes, tamen sæpe. Est enim hæc ars con-
 jecturalis, neque respondet ei plerumque
 non solum conjectura, sed etiam experien- 15
 tia. Et interdum non febris, non cibus,
 non somnus subsequitur, sicut assuevit.
 Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse
 novus est: quem non incidere, manifeste
 falsum est; cum ætate nostra quædam, ex 20
 naturalibus partibus carne prolapsa & a-
 rente, intra paucas horas expiraverit; sic ut
 nobilissimi medici neque genus mali, ne-
 que remedium invenerint. Quos ideo nihil
 tentasse judico, quia nemo in splendida 25
 persona periclitari conjectura sua voluerit;
 ne occidisse, nisi servasset, videretur. Veri
 tamen simile est, potuisse aliquid excogi-
 tare, detracta tali verecundia, & fortasse
 responsurum fuisse id, quod aliquis esset 30
 expertus. Ad quod medicinæ genus, ne-
 que semper similitudo aliquid confert; &
 si quando confert, tamen id ipsum rationa-
 bile

bile est, inter multa similia genera, & morborum & remediorum, cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inveniat, quod non ubique fortasse, sed sæpius tamen etiam respondeat. Petet autem novum quoque consilium, non ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ & incertæ sunt) sed ab his, quæ explorari possunt; id est, evidentibus causis. Inter est enim, fatigatio morbum, an sitis; an frigus, an calor; an vigilia, an fames fecerit; an cibi vinique abundantia, an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quæ sit ægri natura: humidum magis, an magis siccum corpus ejus sit: validi nervi, an infirmi: frequens adversa valetudo, an rara: eaque, cum est, vehemens esse soleat, an levis; brevis, an longa: quod is vitæ genus sit secutus; laboriosum, an quietum; cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibusque, sæpe curandi nova ratio ducenda est. Quamvis ne hæc quidem sic præteriri debent, quasi nullam controversiam recipiant. Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos dixit; quoniam & alii, & iidem alias post ista non fabricarent.

Et quidam Methodici seculi nostri, sub authore (ut ipsi videri volunt) Themisone contendunt, nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse, quædam

quædam communia morborum intueri. Et quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa; & modo incrementum, modo consistere, modo minui consuevisse. Cognito igitur eo, quod ex his 10 est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat continendum: si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis: aliter 15 incrementibus, aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse. quam ita finiunt, ut quasi viam quandam, quam *μίσθοι* Græci nominant, eorumque, quæ in 20 morbis communia sunt, contemplatricem esse contendunt. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt: cum ab illis eo nomine dissentiant, quod in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam: ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum, ipsa evidentia ejus opinioni repugnat; quia raro, nisi post horum 30 aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eidem

dem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concitent morbum; tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturæ (quam non temere Medici sibi vendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime moveret. Accedit ad hæc, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus æque repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit; quod quotidie fieri apparet. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri; sed cum horum aliquid accesserit.

Themisonis vero æmuli, si perpetua, quæ promittunt, habent, magis etiam, quam illi rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, protinus alio novo nomine artis indiget; si modo, quod primum est, non memoriæ soli, sed rationi quoque insistit. Sin, quod vero propius est, vix ulla perpetua

tua præcepta medicinalis ars recipit, iidem sunt, quod ii, quos experimenta sola sustinent: eo magis, quoniam, si compresserit aliquem morbus, aut fuderit, quilibet etiam imperitissimus videt. Quid autem compressum corpus resolvat, quid solutum teneat, si à ratione tractum est, Rationalis est medicus: sin ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est, ab experientia, 10 Empiricus. Et ita apud eum morbi cognitio extra artem, medicina intra usum est. Neque adjectum quicquam Empiricorum professioni, sed demtum est; quoniam illi multa circumspiciunt, hi tantum facillima, & non plus, quam vulgaria. Nam & hi, qui pecoribus ac jumentis medentur, cum propria cujusq; ex mutis animalibus nosse non possint, communibus tantummodo insistent. Et exteræ gentes, cum subtilem 20 medicinæ rationem non noverint, communia tantum vident. Et qui ample valetudinarios nutriunt, quia singulis summa cura consulere non sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque, hercules, 25 istud antiqui medici nescierunt, sed his contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustissimus author Hippocrates dixit, mederi oportere, & communia, & propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam 30 professionem consistere ullo modo possunt. Siquidem & compressorum & fluentium morborum genera diversa sunt; faciliusque

que id in his, quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud dejectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digerere, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut oculos, auresque. quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut
10 aliud curatur. Ita protinus in his à communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulantur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut astringunt, aut resolvunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in cæteris, idem eveniat.
20 In his ergo communium inspectio contraria est, priorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuidam & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus
30 opportune providit, non ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat, sed ex causa, quæ ante præcesserat. Estque etiam pro-

proprium aliquid & loci & temporis, istis quoque authoribus. Qui cum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, æstus, satietas, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem aut locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit, ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quæ vera quidem sunt; à communibus, tamen ad quædam propria descendunt. Nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit: ægris vero non esse. Quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. Plurimaque in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius fert adolescens, quam puer: facilius in denso cælo, quam in tenui: facilius hieme, quam æstate: facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus: facilius inexercitatus, quam exercitatus homo. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quæ conjicio, cum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere: eumque, qui nosse propria potest, illa quidem non oportet.

opor-

oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, cum par scientia sit, utilio-
 tamen medicum esse amicum, quam extra-
 5 neum. Igitur, ut ad propositum meum re-
 deam, rationalem quidem puto medicinam
 esse debere: instrui vero ab evidentibus
 causis; obscuris omnibus, non à cogitatio-
 ne artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Inci-
 10 dere autem vivorum corpora, & crudele,
 & supervacuum est: mortuorum vero, di-
 scuntibus necessarium. Nam positum &
 ordinem nosse debent. Quæ cadavera me-
 lius, quam vivus & vulneratus homo, re-
 15 præsentant. Sed & cætera, quæ in vivis
 cognosci modo possunt, in ipsis curationi-
 bus vulneratorum paulo tardius, sed ali-
 quanto mitius usus ipse monstrabit. His
 propositis, primum dicam, quemadmodum
 20 Sanos agere conveniat: tum ad ea transibo,
 quæ ad Morbos & curationes eorum per-
 tinebunt.

C A P U T I.

25 *Quemadmodum sanos agere conveniat.*

SA N U S homo, qui & bene valet, &
 suæ spontis est, nullis obligare se legi-
 bus debet; ac neque medico, neque ia-
 troalipta egere. Hunc oportet varium ha-
 30 bere vitæ genus: modo ruri esse, modo in
 urbe, sæpiusque in agro: navigare, venari,
 quiescere interdum, sed frequenter se exer-
 cere. Siquidem ignavia corpus hebetat, la-
 bor

bor firmat. illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modo ungi, modo id ipsum negligere: nullum cibi genus fugere, quo populus utatur: interdum in convictu esse, interdum ab eo se retrahere: modo plus iusto, modo non amplius assumere: bis die potius, quam semel cibum capere: & semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut hujus generis exercitationes cibique necessarii sunt; sic athletici supervacui. Nam & intermissus propter aliquas civiles necessitates ordo exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime & senescunt, & ægrotant.

De Concubitu.

20

Concubitus vero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimiscendus est. Rarus, corpus excitat; frequens, solvit. Cum autem frequens, non numero, fit, sed natura, ratione ætatis, & corporis, scire licet, cum non inutilem esse, quem corporis neque languor: neque dolor sequitur. Idem interdiu peior est, tutior noctu: ita tamen, si neque illum cibis, neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Hæc firmis servanda sunt: cavendumque, ne in secunda valetudine adversæ præidia consumantur.

CAP.

CAP. II.

Quæ imbecillis servanda sūt.

5 **A**T imbecillis (quo in numero magna pars urbanorum, omnesque pene cupidi literarum sunt) observatio major necessaria est: ut, quod vel corporis, vel loci, vel studii ratio detrahit, cura re-
10 stituat. Ex his igitur, qui bene concoxit, mane tuto surget: qui parum, quiescere debet; &, si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non concoxit, ex toto con-
15 quiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotio credere. Qui crudum sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquam frigidam bibere, & se nihilominus continere. Habitare vero ædificio lucido, perflatum æstivum, hibernum
20 solem habente: cavere meridianum solem, matutinum & vespertinum frigus; itemque auras fluminum atque stagnorum; minimeque nubilo cælo, soli aperienti se committere, ne modo frigus, modo calor
25 moveat: quæ res maxime gravedines destillationesque concitat. Magis vero gravibus locis ista servanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum corpus esse, cum quotidie
30 mane urina alba, dein rufa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Ubi expectrectus est aliquis, paulum intermittere: deinde, nisi hiems est, fovere os multa aqua

aqua frigida debet. Longis diebus meridiari potius ante cibum; sin minis, post eum. Per hiemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdium vel domestica, vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis sui est. Prima autem ejus curatio exercitatio 10 est, quæ semper antecedere cibum debet: in eo, qui minus laboravit, & bene concoxit, remissior: in eo, qui assuetus est, & minus concoxit, amplior. Commode vero exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, 15 ambulatio. atque hæc non utique plana, commodior est: siquidem melius ascensus quoque & descensus, cum quadam varietate corpns moveat, nisi tamen id perquam imbecillum est. Melior autem est sub divo, 20 quam in porticu: melior, si caput patitur, in sole, quam in umbra: melior in umbra, quam parietes aut viridaria efficiunt, quam quæ recto subest: melior recta, quam flexuosa. Exercitationis autem plerumque 25 nis esse debet sudor, aut certe lassitudo, quæ citra fatigationem sit: idque ipsum, modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem, athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel immodicus esse la- 30 bor debet. Exercitationem recte sequitur, modo unctio, vel in sole, vel ad ignem, modo balneum, sed in conclavi quam maxime &

& alto & lucido & spacioſo. Ex his vero neutrum ſemper fieri oportet ; ſed ſæpius alterutrum, pro corporis natura. Poſt hæc 5 paulum conquieſcere opus eſt. Ubi ad cibum ventum eſt, nunquam utilis eſt nimia ſatietas : ſæpe inutilis nimia abſtinentia : ſæpe, ſi qua intemperantia ſubeſt, tutior eſt in porione, quam in eſca. Cibus à ſalfamen- 10 tis, oleribus, ſimilibuſque rebus melius incipit. Tum caro aſſumenda eſt, quæ aſſa optima, aut elixa eſt. Condita omnia duabus de cauſis inutilia ſunt, quoniam & plus propter dulcedinem aſſumitur, & quod 15 modo par eſt, tamen ægrius concoquitur. Secunda menſa bono ſtomacho nihil nocet, in imbecillo coaceſcit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, & ſimilia melius primo cibo aſſumit. Poſt 20 multas potiones, quæ aliquantum ſitim exceſſerunt, nihil edendum eſt : poſt ſatietatem, nihil agendum. Ubi expletus eſt aliquis, facilius concoquit, ſi, quicquid aſſumpſit, porione aquæ frigidæ includit, 25 tum pauliſper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdium ſe implevit, poſt cibum neque frigori, neque æſtui, neque labori ſe debet committere. Neque enim tam facile hæc inani corpore, quam reple- 30 to nocent. Si quibus de cauſis futura inedia eſt, labor omnis vitandus eſt.

C A P. III.

*Observationes quadam, prout res nova in-
cidunt, & corporum genera, & sexus, &
ætates, & tempora anni sunt.*

ATQUE hæc quidem pene perpetua
sunt : quasdam tamen observationes
desiderant & novæ res, & corporum
genera, & sexus, & ætates, & tempora an- 10
ni. Nam neque ex salubri loco in gravem,
neque ex gravi in salubrem transitus satis
tutus est. Ex salubri in gravem, prima hie-
me : ex gravi in eum, qui salubris est, pri-
ma æstate transire melius est. Neque vero 15
ex multa fame nimia satietas : neque ex ni-
mia satietate fames idonea est. Periclita-
turque, & qui semel, & qui bis die cibum
incontinenter, contra consuetudinem,
assumit. Item, neque ex nimio labore su- 20
bitum ocium, neque ex nimio ocio subi-
tus labor, sine gravi noxa est. Ergo, cum
quis mutare aliquid volet, paulatim debe-
bit assuescere. Omnem etiam laborem fa-
cilius vel puer vel senex, quam insuetus 25
homo sustinet. Atque ideo quoque nimis
ociosa vita utilis non est ; quia potest inci-
dere laboris necessitas. Si quando tamen in-
suetus aliquis laboravit, aut multo plus,
quam solet, etiam is qui assuevit, huic jeju- 30
no dormiendum est : multo magis, si etiam
os amarum est, vel oculi caligant, aut ven-
ter perturbatur. Tum enim non dormien-
dum

dum tantummodo jejuno est, sed etiam in posterum diem ita permanendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquantum eodem modo debet.

Communia deinde omnibus sunt post
10 fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario residere: deinde, ubi paulum conquieverunt, intrare & descendere in solium; tum multo oleo ungi, leniterque perfricari; iterum in solium descendere: post hæc, os aqua calida fovere, deinde frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si
20 nimium alicui fatigato pene febris est, huic abunde est, loco tepido demittere se in gubibus tenus in aquam calidam, cui paulum olei adjectum sit: deinde totum quidem corpus, maxime tamen eas partes, quæ in
25 aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum & paulum contriti salis sit adjectum. Post hæc, omnibus fatigatis aptum est, cibum sumere, eoque humido uti; aqua, vel certe diluta potione esse contentos; maximeque ea, quæ moveat urinam.
30 Illud quoque nosse oportet, quod ex labore sudanti frigida potio perniciosissima est: atque etiam, cum sudor se remisit, itinere
-403102 B 2 fati-

fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam judicavit. Quod in his verum est, quibus alvus facile, nec tuto, resolvitur, quique facile inhorrescunt : perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit, portione æstuantem stomachum refrigerari, frigentem calefieri. Quod ita præcipio, ut tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc 10 frigidam bibendam esse. Solet etiam prodesset, post varium cibum, frequentesque dilutas portiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua oscitatio urget, invicem modo 15 aqua, modo vinum bibendum est, raroque balneo utendum. Levatque lassitudinem etiam laboris mutatio: cumque, quem novum genus cujusdam laboris pressit, id, quod in consuetudine est, reficit. Fatigato 20 quotidianum cubile tutissimum est: insolitum contra, lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.

Proprie, quædam ad eum pertinent, qui 25 ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio: post iter, primum sedile, deinde unctio; tum calida aqua aut balneo magis inferiores partes, quam superiores foveat. Si quis vero ex- 30 stus in sole est, huic in balneum protinus eundum est, perfundendumque oleo corpus & caput: deinde in solium bene calidum descen-

descendendum est, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida est. At ei, qui perfrixit, opus est in laconico primum involuto sedere, donec infuset; tum ungi; deinde lavari: cibum modicum, portiones meracas assumere.

Is vero, qui navigavit, & nausea pressus est, si multam bilem evomit, vel abstinere
10 cibo debet, vel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, utique sumere cibum, sed assueto leviolem: si sine vomitu nauseavit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui vero toto die, vel in vehicu-
15 lo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currendum, sed lente ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora, dein coena exigua prodesse consueverunt. Si quis in balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum, &
20 in eo retentum acetum: si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem scire convenit naturam corporis: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii calidi, alii frigidiores; alii humidi, alii sic-
25 ciores; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens siccare, siccus madefacere.
30 itemque alvum firmare is, cui fusa: solvere is, cui adstricta est. Succurrendumque semper parti maxime laboranti est.

De causis quæ implent corpus.

Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, unctio, & si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, somnus plenus & non multum nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & positiones maxime dulcia & pingua, frequentior cibus, & quantum plenissime potest 10 digerere.

De his, quæ extenuant corpus.

Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si salsa est: in jejuno balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis vel longus: lectus, per æstatem, terra; hieme, durum cubile: cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, dejectio, acidæ res & austæræ, & 20 semel in die assumptæ epulæ, & vini non perfrigidi potio jejuno in consuetudinem adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum & dejectionem, de his quoque 25 propria quædam dicenda sunt. Rejectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod de tuenda sanitate composuit, video: neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine; qui quotidie ejiciendo 30 vorandi facultatem moliantur. Paulo etiam longius processit. Idem purgationes quoque eodem volumine expulit. Et sunt hæ

hæ perniciosæ, si nimis valentibus medicamentis fiunt. Sed hæc tamen submovenda esse, non est perpetuum; quia corporum & temporumque ratio potest ea facere necessaria, dum & modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid jam corruptum esset, expelli debere confessus est. Ita non ex toto res
10 condemnanda est. Sed esse ejus etiam plures causæ possunt: estque in ea quædam paulo subtilior observatio adhibenda.

De Vomitu.

Vomitus utilior est hieme, quam æstate.
15 nam tum & pituitæ plus, & capitis gravitas major subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus: utilis vero plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxe-
20 runt. Nam, si plus est, quam quod concoqui possit, periclitari, ne corrumpatur, non oportet: si jam corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua via primum expelli potest, ejicere. Itaque, ubi amari
25 ructus cum dolore & gravitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Idem prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliva, vel nausea est, aut sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum
30 est. Similiterque ei, qui vel cælum, vel locum mutat; hisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor præcordia infestat. Neque ignoro, inter hæc præcipi
B 4 quic-

quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor: interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum ad-
10
dicere. At, qui mane vomiturus est, ante bibere mulsum, vel hyssopum esse, aut radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed huius idonei, gustandum; & aquæ frigidæ cyathi
20
tres bibendi sunt, siquidem vomitus fauces exasperavit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde cœnare: si post cœnam, postero die lavari, & in balneo sudare. Huic proximus cibus medicocris utilior est: isque esse debet cum pane hesterno vino austero meraco, & carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulat, si biduo continuarit, quam
30
si post quintumdecimum diem vomuerit; nisi hæc mora gravitatem pectori faciet.

De Dejectionibus.

Dejectio autem à medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increseunt. Quid enim inter hæc adjuvare possunt quies & inedia, per quæ illa maxime eveniunt? Qui deicere volet, primum
10 cibis vinisque utatur his, quæ hoc præstant. Dehinc, si parum illa proficiunt, aloen sumat. Sed purgationes quoque, ut interdum necessariae sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit
15 enim non ali. corpus; & ob hoc infirmum erit; cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

De his, quæ calefaciunt & refrigerant corpus.

Calefaciunt unctio, aqua salsa, magisque si calida est; omnia salsa, vinum aust-
20 rum. Contra refrigerant, in jejuno, amara, carnosæ; si post cibum est, balneum, & somnus, nisi nimis longus est; & omnia acida; aqua quam frigidissima; oleum, si
25 aqua miscetur; & lotus.

De his, quæ humidant & siccant.

Humidant autem corpus labor minor, quam ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio; post hanc, am-
30 bulatio, & vigilia. Per se quoque ambulatio multa & vehemens, & matutinæ exercitationi non protinus cibus adjectus; ea genera escæ, quæ veniunt ex locis frigidis,

& pluviis, & riguis. Contra siccant immodica exercitatio, fames, unctio, sine aqua calor, sal immodicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subiectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens.

De his, quæ alvum adstringunt & solvunt.

Alvum adstringit labor, sedile, creta singularis corpori illita, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra solvit aucta ambulatio atque esca, motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit. Itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde supervenit.

De ætatum varietate.

Quod ad ætates vero pertinet, in ediam facillime sustinent mediæ ætates, minus juvenes, minime pueri & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sapientius debet cibum assumere, maximeque eo eget, qui inerescit. Calida lavatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri ætati, quæ inflationes movent. Juvenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus, plerunque in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia

scientia fuit adstricta, sæpe in senectute solvitur. Melior est autem in juvene fusior, in sene adstrictior.

De varietate temporum.

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse convenit; minus, sed meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem moventibus. Venus tum non æque perniciofa est. At vere paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus, transcundum paulatim ab elixis ad assa. Venus eo tempore anni tutissima est.

De diæta ciborum potientumque.

Æstate vero & potione & cibo sæpius corpus eget; ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro & olus: potio quam dilutissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: frigida lavatio, caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut sæpius autem cibo utendum, sic exiguo est.

Autumnalis diæta.

Per autumnum vero, propter cæli varietatem, periculum maximum est. Itaque neque

neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus, neque sub divo noctu dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo pleniore uti licet; minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodice toto die plerunque sic assumuntur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxa est. Sed his uti non sæpius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque æstate vero, neque autumnio utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum, æstate in totum, si fieri potest, abstinendum est.

C A P. IV.

De his, quibus Caput infirmum est.

PROXIMUM est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is si bene concoxit, leniter perfricare id mane manibus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutem tondere: utileque lunam vitare, maximeque ante ipsum lunæ solisque concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere: multum ambulare; sed, si licet, neque sub tecto, neque in sole: utique autem vitare solis ardorem, maxi-

maximeque post cibum & vinum : potius ungi, quam lavari ; nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium : ubi sudarit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere, tum tepida, dein frigida ; diutiusque ea caput, quam cæteras partes perfundere ; deinde id aliquandiu perfricare ; novissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atque aqua frigida. Itaque is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subjicere. Semper autem, etiamsi sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerari sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum cæteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat ; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat : isque, si jejuno caput læditur, assumendus etiam medio die est : si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum lene, quam aquam magis expedit ; ut, cum caput gravius esse cœperit, sit, quo confugiat : eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt : medicamentum utrumque est, cum invicem assumitur. Scribere, legere,

VOC

voce contendere, huic opus non est, utique post cœnam: post quam nec cogitatio quidem ei satis tuta est; maxime tamen vomitus alienus est.

C A P. V.

De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione, tonsillisque laborant.

NEQUE vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigidaë prodest; sed iis etiam, quos assiduæ lippitudines, gravedines, destillationes, tonsillæque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum; sed os quoque multa frigida aqua fovendum est: præcipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius cœlum Austri reddiderunt. Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut fatigatio animi; tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam minime is, qui his opportunus est, aerem vel loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus dimoveat: si post concoctionem jejunos caput radit: si post cibum neque legit, neque scribit.

CAP. VI.

Ad solutam Alvum remedia.

QUEM vero frequenter citā alvus exercet, huic opus est pila similibusque superiores partes exercere; dum jejūnus est ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua balnea; ungi citra sudorem; non uti cibis variis, minimeque jurulentis aut leguminibus, oleribusve his, quæ cæleriter descendunt; omnia denique sumere, quæ tarde concoquuntur. Venatio, durique pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maxime juvant. Nunquam vinum falsum bibere expedit, ne tenue quidem; aut dulce; sed austerum, & plenius, neque id ipsum pervetus. Si mulso uti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigida potiones ventrem ejus non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensæ in cœna sensit, vomere debet; idque postero quoque die facere: tertio, modici ponderis panem ex vino esse, aut ova fricta ex oleo, vel ex defruto, similibusque aliis: deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione quamvis le-
30 ni dimoveri.

C A P. VII.

Remedia ad Coli dolorem.

AT si laxius intestinum dolere consuevit, quod *κόλιν* nominant, cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, ut concoquat aliquis; ut lectione, & aliis generibus exerceatur, utatur balneo calido, cibis quoque & potionibus calidis; denique omnimodo frigus evitet, item dulcia omnia, leguminaque, & quicquid inflare consuevit.

C A P. VIII.

Quæ agenda sint Stomacho laborantibus.

SI quis vero stomacho laborat, legere scire debet; post lectionem ambulare, tum pila, vel armis, aliove quo genere, quo superior pars movetur, exerceri. Non aquam, sed vinum calidum bibere jejunos. Cibus bis die assumere; sic tamen, ut facile concoquat. Uti vino tenui & austero; & post cibum, frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in jejuno dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est, qui cum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent.

At

At, qui tarde concoquunt, & quorum ideo præcordia inflantur, quive propter ardorem aliquem noctu fitire consueverunt, 5 ante quam conquiescant, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum vel ungi vel lavari; assidue vinum frigidum bibere; & post cibum, magnam potionem, sed, 10 ut supra dixi, per siphonem; deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui vero cibus accescit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, & vomere. At si cui ex 15 hoc frequens dejectio incidit, quotiens alvus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

CAP. IX.

20 *Quid observandum sit dolore Nervorum laborantibus.*

SI cui vero dolere nervi solent, quod in podagra chiragra esse consuevit, huic, quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obji- 25 cendumque labori & frigori: nisi cum dolor increvit; sub quo quies optima est. Venus semper inimica est Concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria. 30 Cruditas enim id maxime lædit, & quotiens offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis

aliis calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vulneri, præcordiis, intestinis, vesicæ, auribus, cõxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus., nervis, vulvæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores tremoresque nascuntur. At prodest juvenibus, & omnibus plenis. Erectiorque 10 mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur. Aqua vero frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis doloribusque, qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adjuvat omnia, quæ frigus infestat: item lippientes, si nec dolor, nec lachrymæ sunt: nervos quoque, qui contrahuntur; prætipueque ea ulcera, quæ ex frigore 20 sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam movet. Si nimis est, corpus effœminat, nervos emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt ubi subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat. Calor concoctionem prohibet; somnum aufert, sudore digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

C A P. X.

Observatio in Pestilentia.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Ubi id non licet, gestari, ambulare
10 sub divo, ante æstum, leniter; eodemque modo ungi: & ut supra comprehensum est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem; multoque magis se continere. Si qua gravitas in corpore est,
15 tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum: neque jejuno, neque cœnato vomendum est: neque movenda alvus; atque etiam, si per se mota est,
20 comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus; utique si cibus quoque antecessit; qui tamen semel die tunc commodius assumitur; in-
25 super etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo aqua, modo vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero hæc
30 in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maxime, quam Austri excitant. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt

ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, utique abstinere debet: atque ita à vino ad aquam, ab hac ad vinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.

LIBER SECUNDUS.

Præfatio.

10

INSTANTIS autem valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum virorum uti, maximeque Hippocratis; cum recentiores quoque medici, quamvis in curationibus mutarint, tamen hæc illum optime præfagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus morborum timor subsit; non alienum videtur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maxime tuta vel periculis opportuna sint, quod genus adversæ valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non quod non omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus homines per omnia genera morborum & ægrotent & moriantur; sed quod frequentius tamen quædam eveniant. Ideo utile est scire unumquemque, quid, & quando maxime caveat.

CAP.

CAP. I.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel iuta vel morbis opportuna sint, & quod valetudinis genus in quoque timeri possit.

- I**GITUR saluberrimum ver est: proxime
10 **I**ndeinde ab hoc, hiems: periculosior æstas,
autumnus longe periculosissimus. Ex
tempestatibus vero optimæ æquales sunt,
sive frigida, sive calida: pessimæ, quæ
maxime variant. Quo fit, ut autumnus
15 plurimos opprimat. Nam fere meridianis
temporibus calor: nocturnis atque matu-
tinis, simulque etiam vespertinis, frigus
est. Corpus ergo, & æstate, & subinde me-
ridianis caloribus relaxatum, subito frigo-
20 re excipitur. Sed ut eo tempore id maxime
fit, sic quandocunque evenit, noxium est.
Ubi æqualitas autem est, saluberrimi sunt
sereni dies: meliores pluvii, quam tantum
nebulosi, nubilive: optimeque hieme, qui
25 omni vento vacant: æstate, quibus Favonii
perflant. Si genus aliud ventorum est, salu-
briores Septentrionales, quam Subsolani,
vel Austri sunt. Sic tamen hæc, ut inter-
dum regionum sorte mutantur. Nam fere
30 ventus ubique à mediterraneis regionibus
veniens, salubris; à mari, grauis est. Ne-
que solum in bono tempestatum habitu
certior valetudo est; sed peiores morbi
quo-

quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, & promptius finiuntur. Pessimū ægro est cælum, quod ægrum fecit. adeo ut in id quoque genus, quod naturā pejus est, in hoc statu salubris mutatio sit. Ætas media tutissima est: quia neque juventa calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum quadratum 10 est, neque gracile, neque obesum. Nam longa statura, ut in juventa decora est, sic matura senectute conficitur. Gracile corpus infirmum: obesum hebes est. Vere tamen maxime, quæcunque humoris mo- 15 tu novantur, in metu esse consueverunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀπερήματα Græci nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitialis, an- 20 gina, gravedines, destillationes oriri solent. Hi quoque morbi, qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt, tum maxime & inchoantur & repetunt. At æstas non quidem vacat plerisque his mor- 25 bis; sed adjicit febres, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alvi dejectiones, auricularum dolores, ulcera oris, caneros, cum in cæteris quidem partibus, tum maxime obsecænis; & quicquid sudore hominem resol- 30 vit. Vix quicquam ex his in autumnum non incidit: sed oriuntur eo quoque tempore febres incertæ, lienis dolor, aqua inter cutem, tabes,

tabes, quam Græci *φθίσις* nominant; urinæ difficultas, *σπογυσγία* quam appellant; tenuiores intestini morbus, quem *ἄλσις* nominant. Fit item lævitas intestinorum, quæ *ἀστυγία* vocatur; coxæ dolores, morbi comitiales. Idemque tempus & diuturnis malis fatigatos, & ab æstate, etiam proxima pressos interimit; & alios novis morbis conficit; & quosdam longissimis implicat, maximeque quartanis, quæ per hiemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentia patet, cujuscumque ea generis est; quamvis variis rationibus nocet. Hiems autem capitis dolores, tussim, & quicquid in faucibus, in lateribus, in visceribus mali contrahitur, irritat.

Ex tempestatibus, Aquilo tussim movet, fauces exasperat, ventrem astringit, urinam suppressit, horrores excitat, item dolorem lateris & pectoris. Sanum tamen corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolorem movet, alvum solvit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Cæteri venti, quo huic vel illi propiores sunt, eo magis vicinos his illisve affectus faciunt. Calor omnis & jecur & lienem inflamat, mentem hebetat, & ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud *σπασμός*, hoc *τίπαι* Græce nominatur: nigro-

nigrorem in ulceribus, & horrorem in febribus excitat. In siccitatibus, acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres, & longæ febres, alvi dejectiones, angina, canceri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam *παράλυσις* Græci nominant. Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante præcesserint. Si 10 hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluvias exhibet, fere subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, præcipue in muliebribus. Si vero, Austri 15 pluvixque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, gravidæ quidem foeminæ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. 20 Cæteros lippitudo arida & si seniores sunt, gravedines atque destillationes male habent. At si à prima hieme Austri ad ultimum ver continuarint, laterum dolores, & insania febricitantium, quam *φρενίτις* ap- 25 pellant, quam celerrime rapiunt. Ubi vero calor à primo vere orsus æstatem quoque similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas Aquilones habuit, autumno vero imbres 30 Austrique sunt, tota hieme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes oritur. Sin autem autumnus quo-

quoque æque fæccus iisdem Aquilonibus
perflatur, omnibus quidem mollioribus
corporibus, inter quæ muliebria esse pro-
posui, secunda valetudo contingit: durio-
ribus vero instare possunt, & aridæ lippitu-
dines, & febres partim acutæ, partim lon-
gæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur.

Quod ad ætates vero pertinet, pueri pro-
ximique his vere optime valent, & æstate
prima tutissimi sunt: senes æstate & autum-
ni prima parte: juvenes hieme, quique inter
juventam senectutemque sunt. Inimicior
senibus hiems, æstas adolescentibus est:
Tum si qua imbecillitas oritur, proximum
est, ut infantes, tenerosque adhuc pueros
serpentina ulcera oris, quæ ἀφθας Græci no-
minant, vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium
humor, circa umbilicum inflammationes
exerceant. Propria etiam denticulorum,
gingivarum exulcerationes, distentiones
nervorum, febriculæ, alvi dejectiones, ma-
ximeque caninis dentibus orientibus male
habent. Quæ pericula plenissimi cujusque
sunt, & cui maxime venter adstrictus est.
At ubi ætas paulum processit, glandulæ, &
vertebrarum, quæ in spina sunt, aliquæ in-
clinationes, strumæ, verrucarum quædam
genera dolentia, ἀνεργος δόνας Græci ap-
pellant, & plura alia tubercula oriuntur.
Incipiente vero jam pube, ex iisdem mul-
ta, & longæ febres, & sanguinis ex naribus
cursus. Maximeque omnis pueritia, pri-
mum

mum circa quadragesimum diem, deinde
 septimo mense, tum septimo anno, postea
 circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam
 genera morborum in infantem inciderunt, 5
 ac neque pubertate, neque primis coitibus,
 neque in foemina primis menstruis finita
 sunt, fere longa sunt: sæpius tamen his
 morbi pueriles, qui diutius manserunt, ter-
 minantur. Adolescentia morbis acutis, 10
 item comitialibus, tabique maxime obje-
 cta est: fereque juvenes sunt, qui sangui-
 nem exspuunt. Post hanc ætatem laterunt
 & pulmonis dolores, lethargus, cholera,
 infania, sanguinis per quædam etiam velut 15
 ora venarum, *αιμορροϊδης* Græci appellant,
 profusio. In senectute, spiritus & urinæ
 difficultas, gravedo, articulorum & renum
 dolores, nervorum resolutiones, malus
 corporis habitus, *κακὴσία* Græci appel- 20
 lant, nocturnæ vigiliæ, vitia longiora au-
 rium, oculorum, etiam narium, præcipue-
 que soluta alvus, &, quæ sequuntur hanc,
 tormina, vel lævitas intestinorum, cætera-
 que fusi ventris mala. Præter hæc graciles, 25
 tabes, dejectiones, destillationes, item vi-
 scerum & laterum dolores fatigant. Obesi
 plerunque acutis morbis, & difficultate spi-
 randi strangulantur, subitoque sæpe mo-
 riuntur. quod in corpore tenuiore vix 30
 evenit.

CAP. II.

De signis adversæ valetudinis futuræ.

5 **A**NTE adversam autem valetudinem; ut supra dixi, quædam notæ oriuntur; quarum omnium commune est, aliter se corpus habere atque consuevit; neque in pejus tantum, sed etiam in melius.

10 Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam,

15 revolvuntur. Pejus tamen signum est, ubi aliquis contra consuetudinem emacuit, & colorem decoremque amisit: quoniam in his, quæ superant, est quod morbus demat; in his quæ defunt, non est quod ipsum mor-

20 bum ferat. Præter hæc, protinus timeri debet, si graviora membra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetudinem incaluit; si gravior somnus pressit; si tumultuosa somnia fuerunt; si sæpius ex-

25 pergiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem insudat, maximeque si circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas.

30 Item, si marcet animus; si loqui & moveri piget; si corpus torpet; si dolor præcordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in plurimis evenit, capitis; si salivæ plenum

est os; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora adstricta sunt; si membra inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intentæ venæ moventur; si frequentes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sentit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua febrem antecedunt. In primis tamen illud considerandum est, num cui sæpius horum aliquid eveniat, neq; ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest. Facile itaque securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet, cui hæc nova sunt; aut qui ista nunquam sine custodia sui tuto habuit.

C A P. III.

20

Quæ bona in ægrotantibus signa sint.

UBI vero febris aliquem occupat, scire licet, non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi in usu est, cubat, cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque jacentis habitus est: si facile convertitur; si noctu dormit, si interdum vigilat; si ex facili spirat; si non conficitatur; si circa umbilicum & pubem cutis plana est; si præcordia ejus sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraque parte sunt: quod si paulo tumidiora sunt, tamen digitis cedunt & non dolent. Hæc valetudo,

do,

do, ut spacium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque, quod æqualiter molle & calidum est, quodque æqualiter totum insudat, & cujus febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur. Quando jam ad sanitatem venit corpus, sternutamentum etiam inter bona indicia est, & cupiditas cibi vel à principio servata, vel etiam
10 post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidem, quæ, quamvis longiore tempore tenuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic, ut corpus integrum,
15 quod *εὐλαχένης* Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet: & in urina subsidere album, læve, æquale; sic ut etiam, si quæ quasi nubeculæ innatarint, in imum defe-
20 rantur. Ac venter ei, qui à periculo tutus est, reddit mollia, figurata, atque eodem fere tempore, quod secunda valetudine assuevit, modoque convenientia his, quæ assumuntur. Pejor cita alvus est sed ne hæc
25 quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & rufa est, neque fœditate odoris similem alvum sani hominis excedit. Ac lum-
30 bricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflatio sine inflammatione in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est

sonitus ventris inde ad inferiores partes devolutus ; magisque etiam , si sine difficultate , cum stercore excessit.

CAP. IV.

5

Mala signa agrotantium.

CONTRA gravis morbi periculum est, ubi supinus æger jacet , porrectis manibus , & cruribus : ubi residere vult in ipso acuti morbi impetu, præcipue- 10 que pulmonibus laborantibus:ubi nocturna vigilia premitur , etiam si interdiu somnus accedit. ex quo tamen peior est , qui inter quartam horam & noctem,quam qui à matutino tempore ad quartam. Pessimum 15 tamen est , si somnus neque noctu , neque interdiu accedit : id enim fere sine continuo delirio esse non potest. Neque vero signum bonum est , somno ultra debitum urgeri : pejorque , quo magis sopor inter- 20 diu, noctuque continuat. Mali etiam morbi testimonium est , vehementer & crebro spirare , à sexto die cœpisse inhorrescere : pus expuere : vix excreare : dolorem habere continuum : difficulter ferre morbum : ja- 25 ctare brachia & crura : sine voluntate lachrymare : habere humorem glutinosum dentibus inhærentem ; cutem circa umbilicum & pubem macram ; præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta; 30 magisque, si hæc dextra parte quam sinistra sunt : periculosissimum tamen est , si venæ quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam

etiam morbi signum est, nimis celeriter
emacrescere: caput & pedes manusque fri-
gidas habere, ventre & lateribus calenti-
bus: aut frigidas extremas partes acuto
morbo urgente; aut post sudorem inhor-
rescere; aut post vomitum singultum esse,
vel rubere oculos; aut post cupiditatem
cibi, postve longas febres hunc fastidire;
10 aut multum sudare, maximeque frigido
sudore; aut habere sudores non per totum
corpus æquales, quique febrem non finiant.
Malæ etiam febres, quæ quotidie tempore
eodem revertantur; quæve semper pares
15 accessiones habeant, neq; tertio quoque die
levantur; quæve sic continent, ut per ac-
cessiones increcant, per decessiones tan-
tum molliantur, nec unquam integrum
corpus dimittant. Pessimum est, si ne leva-
20 tur quidem febris, sed æque concitata con-
tinuat. Periculosum est etiam, post arqua-
tum morbum febrem oriri; utique si præ-
cordia dextra parte dura manserunt, aut
dolentibus iis læva. Nulla acuta febris le-
25 viter terrere nos debet. Neque unquam in
acuta febre, aut à somno non est terribilis
nervorum distentio. Timere etiam ex som-
no, mali morbi est. Itemque in prima fe-
bre protinus mentem esse turbatam, mem-
30 brumve aliquod esse resolutum. Ex quo
casu quamvis vita redditur, tamen id fere
membrum debilitatur. Vomitum etiam pe-
riculosum est sinceræ pituitæ vel bilis; pe-

jorque, si viridis, aut niger est. At mala
 urina est, in qua subsidunt subrubra aut
 livida: deterior, in qua quasi fila quædam
 tenuia atque alba: pessima ex his, si tan- 5
 quam ex furfuribus factas nubeculas re-
 præsentat. Diluta quoque, atque alba, vi-
 tiosa est, sed in phreniticis maxime. Alvus
 autem mala est, ex toto suppressa. Pericu-
 losa etiam, quæ inter febres fluens con- 10
 quiescere hominem in cubili non patitur;
 utique, si quod descendit, est perliquidum,
 aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
 Præter hæc periculum ostendit id, quod
 excernitur, si est exiguum, glutinosum, 15
 læve, album, idemque subpallidum: vel si
 est aut lividum, aut biliosum, aut cruen-
 tum, aut peioris odoris, quam ex consue-
 tudine. Malum est etiam, quod post fe-
 bres longas sincerum est. 20

C A P. V.

De signis longæ valetudinis.

POST hæc indicia, notum est longum
 morbum fieri: sic enim necesse est, ni- 25
 si occidit. Neque ulla alia spes in ma-
 gnis est, quam ut impetum morbi trahen-
 do aliquis effugiat, porrigaturque in id
 tempus, quod curationi locum præstet.
 Protinus tamen signa quædam sunt, ex 30
 quibus colligere possumus, morbum, etsi
 non interemerit, longius tamen tempus
 habiturum. Ubi frigidus sudor inter febres
 non

non acutas circa caput tantum, & cervices
 oritur; aut ubi, febre non quiescente, cor-
 pus insudat; aut ubi corpus modo frigi-
 dum, modo calidum est, & calor alius ex
 alio fit; aut ubi, quod inter febres aliqua
 parte abscessit, ad sanitatem non pervenit;
 aut ubi æger pro spacio parum emacrescit.
 Item, si urina modo liquida & pura est,
 10 modo habet quædam subsidientia; si lævia
 atque alba rubrave sunt, quæ in ea subsi-
 dunt; aut si quasdam quasi miculas repræ-
 sentat; aut si bullulas excitat.

CAP. VI.

15

De indicis mortis.

SED inter hæc quidem, proposito me-
 tu, spes tamen superest. Ad ultima vero
 jam ventum esse testantur, nares acu-
 20 tæ, collapsa tempora, oculi concavi, frigi-
 dæ languidæque aures & imis partibus le-
 niter versæ, cutis circa frontem dura & in-
 tenta, color aut niger aut perpallidus; mul-
 toque magis, si ita hæc sunt, ut neque vi-
 25 gilia præcefferit, neque ventris resolutio,
 neque inedia. Ex quibus causis interdum
 hæc species oritur, sed uno die finitur. Ita-
 que diutius durans, mortis index est. Si
 vero in morbo vetere jam triduo talis est,
 30 in propinquo mors est: magisque, si præ-
 ter hæc oculi quoque lumen refugiunt, &
 illachrymant; quæque in iis alba esse de-
 bent, rubescunt; atque in iisdem venulæ
 pallent;

pallent ; pituitaque in iis innatans, novissime angulis inhærescit ; alterque ex his minor est ; iique aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt ; perque somnum 5 palpebræ non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet ; neque id fluens alvus expressit : eademque palpebræ pallent , & idem pallor labra & nares decolorat : eademque labra, & nares, oculi- 10 lique, & palpebræ, & supercilia, aliquavex ex his pervertuntur ; isque propter imbecillitatem jam non audit, aut non videt.

Eadem mors denunciatur, ubi æger supinus cubat, eique genua contracta sunt : 15 ubi deorsum ad pedes subinde delabitur : ubi brachia & crura nudat, & inæqualiter dispergit, neque iis calor subest : ubi hiat : ubi assidue dormit : ubi is, qui mentis suæ non est, neque id facere sanus solet, den- 20 tibus stridet : ubi ulcus, quod aut ante, aut in ipso morbo natum est, aridum, & aut pallidum, aut lividum factum est. Illa quoque mortis indicia sunt, ungues, digitique pallidi ; frigidus spiritus : aut si mani- 25 bus quis in febre, & acuto morbo vel infania, pulmonisve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriasve diducit, vel in adjuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Dolores etiam circa coxas & 30 inferiores partes orti, si ad viscera transierunt, subitoque desierunt, mortem subesse testantur ; magisque, si alia quoque signa accesser-

accesserunt. Neque is servari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito strangulatur, aut devorare salivam suam non potest: cuive in eodem febris corporisque habitu cervix invertitur, sic ut devorare æque nihil possit: aut cui simul & continua febris & ultima corporis infirmitas est: aut cui, febre non quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat: aut qui, febre æque non quiescente, simul & delirio & spirandi difficultate vexatur: aut qui, epoto veratro, exceptus distentione nervorum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim fere nervorum distentione consumitur, nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi debet, loqui cœpit. Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur: & is, cui somnus dolorem auget: & cui protinus, in recenti morbo, bilis atra vel infra vel supra se ostendit: cuive alterutro modo se promissit, cum jam longo morbo corpus ejus esset extenuatum & confectum. Sputum etiam biliosum, & purulentum, sive separatim ista, sive mixta proveniunt, interitus periculum ostendunt. Ac, si circa septimum diem tale esse cœpit, proximum est, ut is circa quartumdecimum diem decedat, nisi alia signa mitiora pejorave accesserint. quæ quo leviora graviorave subsequuta sunt, eo vel seriores mortem, vel maturiorem denunciant. Sudor quoque frigi-

frigidus in acuta febre pestiferus est: atque in omni morbo vomitus, qui varius, & multorum colorum est præcipueque, si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre vomuisse, pestiferum est. Urina vero fulva & tenuis in magna cruditate esse consuevit; & sæpe, antequam spacio maturascatur, hominem rapit. Itaque si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. 10 Pessima tamen est, præcipueque mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris vero, quæ tenuis & diluta est. Alvus quoque varia, pestifera est; & quæ strigmentum, sanguinem, bilem, viride aliquid, modo diversis temporibus, modo simul, & in mistura quadam, discreta tamen repræsentat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti vero jam esse 20 denunciat, quæ liquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est; utique, si magna foeditas odoris accessit.

Illud interrogari me posse ab aliquo scio: si certa futuræ mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis convalescant, quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse? Quinetiam vir jure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse, proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent. Adversus quod ne illud qui-

quidem dicam, quod in vicino sæpe quædam notæ positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. (quod Asclepiades sciens, funeri obuius inclamavit, cum vivere, qui efferebatur:) nec protinus crimen artis esse, si quod professoris sit. Illa tamen moderatius subijciam. Conjecturalem artem esse medicinam, rationemque
10 conjecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando responderit, interdum tamen fallat. Non itaque, si quid vix millesimo in corpore aliquem decipit, id fidem non habet, cum per innumerabiles homines re-
15 spondeat. Idque non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoque, quæ salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit. Quæque medendi
20 causa reperta sunt, nonnunquam in pejus aliquibus vertunt. Neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perque multo plures
25 res ægros prodest. Neque tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis & mortis.

CAP. VII.

30 *De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.*

SED cum proposuerim signa, quæ in omni aduersa valetudine communia esse

esse consueverunt ; ad ea quoque trans-
ibo, ut, quas aliquis in singulis morborum
generibus habere possit notas, indicem.
Quædam autem sunt, quæ ante febres, 5
quædam quæ inter eas, quid aut intus sit,
aut venturum sit, ostendunt. Ante febres,
si caput grave est, aut ex somno oculi ca-
ligant, aut frequentia sternutamenta sunt,
circa caput aliquis pituitæ impetus timeri 10
potest. Si sanguis, aut calor abundat, pro-
ximum est, ut aliqua parte profluvium
sanguinis fiat. Si sine causa quis emacres-
cit, ne in malum habitum corpus ejus de-
cidat, metus est. Si præcordia dolent, aut 15
inflatio gravis est, aut toto die non con-
cocta fertur urina, cruditatem esse manife-
stum est. Quibus diu color sine morbo re-
gio malus est, hi vel capitis doloribus con-
flictantur, vel terram edunt. Qui diu ha- 20
bent faciem pallidam & tumidam, aut ca-
pite, aut visceribus, aut alvo laborant. Si in
continua febre puero venter nihil reddit,
mutaturque ei color, nec somnus accedit,
ploratque is assidue, metuenda nervorum 25
distentio est. Frequens autem destillatio
in corpore tenui longoque, tabem timen-
dam esse testatur. Vbi pluribus diebus non
descendit alvus, docet, aut subitam deje-
ctionem, aut febriculam instare. Vbi pe- 30
des tument, & longæ dejectiones sunt, aut
dolor in imo ventre & coxis est, aqua inter-
cutem instat. sed hoc morbi genus ab ili-
bus

- bus oriri solet. Idem propositum periculum est his, quibus, cum voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi & ægre & durum. Cum tumor in pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte ventris, invicem oritur atque finitur, à jocinore id malum proficisci videtur. Ejusdem morbi nota est, ubi circa umbilicum
10 intestina torquentur (*σπόφον* Græci nominant) coxæque dolores manent, qui neque tempore, neque remediis solvuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est,
15 ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum, ex levi causa fatigatum, æque frigido, calidoque offenditur, *ποδάγραν* *χεῖρ᾽ ἔγραννε*, vel ejus articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denunciat.
20 Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, hi vel capitis doloribus conficentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habent, vel aliquo morbo etiam debilitentur.
25 Quibus scæminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, ut dolores, tumoresque,
30 sine podagra similibusque morbis, oriuntur, & desinunt. Vtique si sæpe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si
mulier

mulier à partu vehementes dolores habet, neque præterea signa mala sunt, circa vigesimum diem aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus aliquid abscedet. Quicumque etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, ei alterutra ratione finiet: magisque, si juvenis erit, per sanguinis profusionem; si senior, per suppurationem. Febris autem, quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè revertitur. Cui fauces sanguine & interdium & noctu replentur, sic, ut neque capitis dolores, neque præcordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque febricula præcesserit, hujus aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri inguen & febricula orta est, neque causa apparet, ulcus in vulva est. Vrina autem crassa, ex qua quod defidit, album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse. Eadem viridis, aut viscerum dolorem, tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut corpus certe integrum non esse, testatur. At si sanguis aut pus in urina est, vel vesica vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa, carunculas quasdam exiguas aut quasi capillos habet, aut si bullat, aut male olet, aut interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ, quæque inter has superque pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum vomiti-

vomitibus bilioſus, extremæque partes frigefcunt, urinæ crebra cupiditas, ſed magna difficultas eſt, & quod inde excretum eſt, aquæ ſimile, vel ruſum, vel pallidum eſt, paulum tamen in eo levamenti eſt, alvus vero cum multo ſpiritu redditur, utique in renibus vitium eſt. At ſi paulatim deſtillat, vel ſi ſanguis per hanc editur, & 10 in eo quædam cruenta concreta ſunt, idque ipſum cum difficultate redditur, & circa pubem interiores partes dolent, in eadem veſica vitium eſt. Calculoſi vero his indi- ciis cognoscuntur. Difficulter urina red- ditur; paulatimque, interdum etiam ſine vo- 15 luntate, deſtillat. Eadem arenosa eſt. nonnunquam aut ſanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam 20 reſupinati, maximeque hi qui grandes caſculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem levant. Gravitatis quoque cujuſdam in ea parte ſenſus eſt; atque ea curſu, omnique 25 motu augetur. Quidam etiam, cum torquentur, pedes inter ſe, ſubinde mutatis vicibus, implicant. Fœminæ vero oras naturalium ſuorum manibus admotis ſcabere crebro coguntur. Nonnunquam, ſi 30 digitorum admovent, ubi veſicæ cervicem iſ urget, calculum ſentiunt. At, qui ſpu- mantem ſanguinem excreant, his in pulmone vitium eſt. Muliere gravidæ ſine modo

modo fusa alvus elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est, quod intus gerit. Duræ mammæ, sanum illud esse, testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, jecur inflammatum esse, significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque à tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest: at, si à priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel infania expectanda est. Interdum etiam hujusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alvi sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio intra quadraginta dies purgari non potuit. At, si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lien tumet, aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obversentur. At, quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigræ cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus ejus est, his mens laborat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neque

que ullum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo, cum rubore & calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quæ in homine parum sanæ liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denunciat.

Hæc vero, cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, ubi expeditior alicujus, quam sani fuit, sermo est, subitaque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut ubi raro quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordiis duris & tumentibus. Oculorum quoque frequens motus; & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: vel, nullo dolore subitante, somnus creptus, continuataque nocte & die vigilia; vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alvi dolor id non coegerit; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, insanix signa sunt. Si quid etiam abscessit, &, ante quam spiritum prodiret, manente adhuc in corpore solita febre, subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua vehementique, sæpe mentem turbat: & ex eo casu juniores interdum

dum intra septimum diem moriuntur ; seniores tardius : quoniam neque æque magnas febres experiuntur , neque æque infaniunt. ita sustinent , dum is affectus in pus vertatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammæ , furorem venturum esse , testantur. Quibus autem longæ febres sunt , his aut abscessus aliqui , aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre 10 illiditur spiritus , instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est , in pulmonem id malum transit ; idque sæpe intra septimum diem occidit : quod nisi incidat , sequitur , ut aliqua parte suppuret. 15 Denique , post alvi longam resolutionem , tormina : post hæc , intestinorum lævitas oritur. Post nimias destillationes , tabes. Post lateris dolorem , vitia pulmonum : post hæc , insania. Post magnos fervores 20 corporis , nervorum rigor , aut distentio. Ubi caput vulneratum est , delirium : ubi vigilia torset , nervorum distentio : ubi vehementer venæ supra ulcera moventur , sanguinis profluvium erit. 25

Suppuratio vero pluribus modis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore , sine manifesta causa remanent , in aliquam partem id malum incumbit , sed in junioribus tantum : nam in senioribus ex ejusmodi 30 morbo quartana fere nascitur. Eadem suppuratio fit , si præcordia dura & dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt ,

lerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus; utique, si inter principia aut oculorum caligo, aut
5 capitis dolores fuerunt: sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habenti, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretque per omne id tempus febris, tum
10 in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa initia sanguis è naribus non fluit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor ad suppurationem ferespectet, magis eo tendit is, qui in præcordiis, 15 quam is, qui in ventre est: & is qui supra umbilicum, quam is qui infra. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis & cruda sic
20 diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exque eo casu plerumque infra transversum septum (quod *διάφραγμα* Græci vocant) fit abscessus. Dolor pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque
25 per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas interdum excitat, aut circa vigesimum diem, aut circa tricesimum, aut circa quadagesimum, nonnunquam etiam circa
30 sexagesimum. Numerabimus autem ab eodie, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hæ vomicæ modo à pulmone, modo

do à costarum parte nascuntur. Quod suppurat, ea parte, quam afficit, dolorem inflammationemque concitat, ipsumque calidius est: &, si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest, si febris non dimittit, eaque interdum levior est, noctu increscit; multus sudor oritur; cupiditas tussendi est, & pene nihil in tussi excreatur; oculi cavi sunt; maxillæ rubent; venæ sub lingua inalbescunt; in manibus fiunt adunci ungues; digiti, maximeque summi calent; in pedibus tumores sunt; spiritus difficiliter trahitur; cibi fastidium est; pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista coeperint, necesse est quidem iucrescant, sed quo minus cito adfuerint, eo tardius solventur. Solent etiam in gravi morbo pedes cum digitis unguibusque nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus convaluit, pedes tamen decidunt.

C A P. VIII.

*Quæ nota in quoque morbi genere vel
spem vel pericula ostendant.* 30

Sequitur, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem, quæ vel
spem,

spem, vel periculum ostendant. Ex vesica dolenti, si purulenta urina processit, inque eo læve & album subsedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipso levatur dolor, quamvis id purulentum est, tamen, si æger facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non difficulter fert, potest ei secunda valetudo contingere. Neque inter initia terreri convenit, si protinus sputum mistum est rufo quodam sanguine, dummodo statim sedetur. Laterum dolores, suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur. Si in jecinore vomica est, & ex ea fertur pus purum & album, salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus vero hæ tolerabiles sunt, quæ in exteriorem partem feruntur, & acuantur. At ex his, quæ intus procedunt, hæ leviores, quæ conclusæ cutem non afficiunt, eamque & sine dolore & ejusdem coloris, cujus reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque, quacumque parte erumpit, si est læve, album & unius modi, sine ullo metu est; &, quo effuso, febris protinus conquievit, desieruntque urgere cibi fastidium & potionis desiderium. Si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque ejusdem factum pro rufo purulentum est, periculi minus est. At in tabe ejus, qui salvus futurus est, sputum esse, debet album, æquale, totum, ejusdemque

que coloris, sine pituita: eique etiam simile esse oportet, si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est, febrem omnino non esse: secundum est, tantillam esse, ut neque tantulum cibum impediatur, neque crebram sitim faciat. Alvus in hac valetudine ea tuta est, quæ quotidie coacta, eaque convenientia his, quæ assumuntur, reddit. Corpus id, quod minime tenue, 10 maximeque lati pectoris atque setosi est, cuiusque cartilago exigua, & carnosæ est. Super tabem si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt, & circa pectus atque scapulas dolor mansit, subitoque sanguis 15 erupit, levare morbus solet. nam & tussis minuitur, & sitis atque febriculæ desinunt. Sed iisdem fere, nisi redit sanguis, vomica erumpit: quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribilis 20 est, quæ nullo antecedente morbo coepit: deinde, quæ longo morbo supervenit; utique, si firma viscera sunt; si spiritus facilis; si nullus dolor; si sine calore corpus est; æqualiterque in extremis partibus macrum 25 est; si venter mollis; si nulla tussis; si nulla sitis; si lingua, ne per somnum quidem, inarescit; si cibi cupiditas est; si venter medicamentis movetur; si per se excernit mollia & figurata; si non extenuatur; si 30 urina, & vini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur; si corpus sine lassitudine est, & motum facile sustinet: si qui-

liquidem in quo omnia hæc sunt , is ex toto tutus est : in quo plura ex his sunt , is in bona spe est. Articulorum vero vitia , ut podagræ chiragræque, si juvenes tentarunt, neque callum induxerunt , solvi possunt : maximeque torminibus leniuntur , & si quocumque modo venter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus, non
10 ægre finitur. Et , in quo ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est à manibus pedibusve initium fieri : deinde , à lateribus : pessimum inter hæc, à capite. Atque in his quoque ea
15 maximeque prosunt , quæ per dejectiones excernuntur. Ipsa autem dejectio sine ulla noxa est , quæ sine febre est ; si celeriter desinit ; si contrectato ventre nullus motus ejus sentitur ; si extremam alvum spiritus
20 sequitur. Ac ne tormina quidem periculosa sunt , si sanguis & strigmenta descendunt , dum febris cæteræque accessiones hujus morbi absint : adeo ut etiam gravida mulier , non solum conservari possit , sed
25 etiam partum reservare. Prodestque in hoc morbo, si jam ætate aliquis processit. Contra , intestinorum lævitas facilius à teneris ætatibus depellitur : utique , si ferri urina , & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas pro-
30 dest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa , si sine torpore est , si leviter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen &
D facile

facile & mature sanatur : resolutumque
membrum, si nihilo minus alitur, fieri sa-
num potest. Oris resolutio etiam, alvo cita
finitur. Omnisque dejectio lippienti pro-
dest. At varix ortus, vel per ora vena-
rum subita profusio sanguinis, vel tormi-
na, insaniam tollunt. Humerorum dolo-
res, qui ad scapulas vel manus tendunt,
vomitu atræ bilis solvuntur. Et quisquis 10
dolor deorsum tendit, sanabilior est. Sin-
gultus sternutamento finitur. Longas de-
jectiones supprimit vomitus. Mulier san-
guinem vomens, profusis menstruis, li-
beratur. Quæ menstruis non purgatur, si 15
sanguinem ex naribus fudit, omni pericu-
lo vacat. Quæ locis laborat, aut difficul-
ter partum edit, sternutamento levatur.
Cui calor & tremor est, saluti delirium est.
Lienosis bono tormina sunt. Denique, ipsa 20
febris, quod maxime mirum videri potest,
sæpe præsidio est. Nam & præcordiorum
dolores, si sine inflammatione sunt, finit; &
in jocinoris dolore succurrit; & nervorum
distentionem rigoremque, si postea cœpit, 25
ex toto tollit; & ex difficultate urinæ mor-
bum tenuioris intestini ortum, si urinam
per calorem movet, levat. At dolores ca-
pitis, quibus oculorum caligo, & rubor
cum quadam frontis prurigine accedunt, 30
sanguinis profusione, vel fortuita, vel
etiam petita, summoventur. Si capitis,
ac frontis dolores ex vento, vel frigore, -
aut

aut æstu sunt, gravedine & sternutamentis
 finiuntur. Febrem autem ardentem, quam
 Græci *ναυσώδη* vocant, subitus horror exol-
 5 vit. Si in febre aures obtusæ sunt, si san-
 guis è narribus fluxit, aut venter resolutus
 est, illud malum desinit ex toto. Nihil
 plus adversus surditatem, quam biliosa al-
 vus potest. Quibus in fistula urinæ minuti
 10 abscessus, quos *φύμαξα* Græci vocant, esse
 cœperunt; iis, ubi pus ea parte profluxit,
 sanitas redditur. Ex quibus cum pleraque
 per se proveniant, scire licet, inter ea, quæ
 ars adhibet, naturam plurimum posse.
 15 Contra, si caput in febre continenti dolet,
 neque quicquam remittit, malum atque
 mortiferum est: maximeque id periculum
 est pueris, à septimo anno ad quartumdec-
 20 imum. In pulmonis morbo, si sputum
 primis diebus non fuit, deinde à septimo
 die cœpit, & ultra septimum mansit, pe-
 riculosum est: quantoque magis mixtos,
 neque inter se diductus colores habet, tan-
 to deterius. Et tamen nihil pejus est, quam
 25 sincerum id edi, sive rufum est, sive cruen-
 tum, sive album, sive glutinosum, sive pal-
 lidum, sive spumans: nigrum tamen pes-
 simum est. In eodem morbo periculosa
 sunt, tussis, destillatio; etiam, quod alias
 30 salutare habetur, sternutamentum. Pericu-
 losissimumque est, si hæc secuta subita de-
 jectio est. Fere vero, quæ in pulmonis, ea-
 dem in lateris doloribus, & mitiora signa,

& asperiora esse consueverunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt, quæ intus tendunt, sicut exteriorem quoque scutem decolorent: ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpit, tum quæ maximæ, quæque planissimæ sunt. Quod si, nerupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio, febris quievit, aut quamvis 10 quieverit, tamen repetit; item, si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est lividum & pallidum, si nihil æger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex his quidem suppura- 15 tionibus, quas pulmonum morbi concitant, fere senes moriuntur: ex cæteris juniores. At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt; ubi urina quædam araneis similia supersi- 20 dentia ostendit; atque in sputis odor fædus est; maximeque, ubi post hæc orta dejectio est, protinus moritur: utique, si tempus autumnus est. quo fere, qui cætera parte anni traxerunt, resolvuntur. Item, pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desuisse, mortiferum est. Solet etiam 30 in adolescentibus is morbus, ex vomica, fistulave oriri. qui non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsequa

cuta

cuta sunt. Ex reliquis vero minime facile sanantur virgines, aut eæ mulieres, quibus supervenit tabes, quod menstrua suppressa sint. Cui vero sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut sterat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est: magis si, cum alvus cita non antecesserit, palpebræ dormientis non coeunt, sed album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo cœpit, ad sanitatem raro perducitur: utique, si contraria his, quæ supra posita sunt, subsequuntur. Æque in ea quoque tussis spem tollit: item, si sanguis sursum deorsumve eripit, & aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attendunt: sed fere fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud jure aliquis mirabitur, quomodo quædam simul & affligant nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam, sive aqua inter cutem quem implevit, sive in magno abscessu multum puris coit, simul id omne effudisse, æque mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli vero cui sic dolent, ut super eos ex callo quædam tubercula innata sint, nunquam liberantur: quæque

eorum vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectutem ab adolescentia pervenerunt, ut aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque 5 comitialis post annum quintum & vigesimum ortus ægre curatur: multoque ægrius is, qui post quadragesimum annum cœpit; adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, vix quidquam in medicina sit. In eo- 10 dem morbo, si simul totum corpus afficitur, neque ante in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improvise concidit, cujuscunque is ætatis est, vix sanescit: si vero aut mens læsa, aut nervorum facta resolutio, medicinæ locus non 15 est. Dejectionibus quoque si febris accessit; si inflammatio jecinoris, aut præcordiorum, aut ventris; si immodica sitis; si longius tempus; si alvus varia; si cum dolore 20 est, etiam mortis periculum subest: maximeque, si inter hæc tormina vetera esse cœperunt. Isque morbus maxime pueros absorbit usque ad annum decimum: cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque 25 gravida ejusmodi casu rapi potest: atque, etiam si ipsa convaluit, partum tamen perdit. Quin etiam tormina ab atra bile orta mortifera sunt: aut si sub his, extenuato jam corpore, subito nigra alvus profluxit. 30 At intestinorum lævitas periculosior est, si frequens dejectio est; si venter omnibus horis & cum sono & sine hoc profluit; si similiter

- militer noctu & interdiu; si, quod excernitur, aut crudum est, aut nigrum, &, præter id, etiam læve, & mali odoris; si fitis urget; si post potionem urina non redditur (quod evenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit;) si os exulceratur; si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur;
- 10 si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus; si & cibi cupiditas non est. Inter quæ cum evidens mors sit, multo evidentior est, si jam in longinquum quoque id vitium est: maxime etiam, si in corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato, durum fieri jecur, perniciosissimum est. Quos lienes male habent,
- 20 si tormina prehenderunt, deinde conversæ sunt vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum lævitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris ex urinæ difficultate, nisi febre resolutus est, intra septimum diem occidit. Mulier ex partu, si cum febre vehementibus etiam & assiduis capitis doloribus premittitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare, signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in cervices ac scapulas transit rursusque in caput revertitur, aut à

capite ad cervices scapulasque pervenit ,
perniciōsus est : nisi vomicam aliquam ex-
citāt, sic, ut extussiat; aut nisi sanguis ex
aliqua parte prorumpit ; aut nisi in capite
multa porrigo , totove corpore pustulæ
ortæ sunt. Æque magnum malum est, ubi
torpor atque prurigo pervagantur , modo
per totum caput , modo in parte ; aut sen-
sus alicujus ibi quasi frigoris est , eaque ad
summam quoque linguam perveniunt. Et,
cum in iisdem ex abscessibus auxilium sit,
eo tamen difficilior sanitas est , quo minus
sæpe sub his malis illi subsequuntur. In
coxæ vero doloribus , si vehemens torpor
est, frigescitque crus & coxa , alvusque nisi
coacta non reddit, idque, quod excernitur,
mucosum est , jamque ætas ejus hominis
quadragesimum annum excessit, is morbus
erit longissimus, minimumque annuus; ne-
que finiri poterit, nisi aut vere, aut autum-
no. Difficilis æque curatio est, in eadem æ-
tate , ubi humerorum dolor vel ad manus
pervenit, vel ad scapulas tendit, torporem-
que & dolorem creat , neque bilis vomitu
levata est. Quacunque vero parte corporis
membrum aliquod resolutum est, si neque
moveretur, & emacrescit, in pristinum habi-
tum non revertitur; eoque minus, quo ve-
rustius id vitium est, & quo magis in corpo-
re senili est. Omniq; resolutioni nervorum
ad medicinam non idonea tempora sunt
hiems & autumnus : aliquid sperari potest
vere

vere & æstate. Isque morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ paret, qui
 5 sursum procedit. Mulieri gravidæ si subito mammæ emarcuerunt, abortus periculum, est. Quæ neque peperit, neque gravida est si lac habet, à menstruâ defecta est. Quartana æstiva, brevis: autumnalis fere
 10 longa est; maximeque, quæ cœpit hieme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemque, si medicamentis purgatum, & adhuc in-
 15 nem, nervorum distentio oppressit: aut si in magno dolore, extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvus nigra, sanguini atro similis, repentina, five cum
 20 febre, five etiam sine hac est, perniciofa est.

C A P. IX.

De Morborum curationibus.

25 **C**OGNITIS indiciis, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis.
 30 Ante de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent, quædam in adversa tantum valetudine adhibentur.

D §.

Omne

Omne vero auxilium corporis , aut demit aliquam materiam , aut adjicit , aut evocat , aut reprimat , aut refrigerat , aut calefacit , simulque aut durat , aut mollit. 5
 Quædam non uno modo tantum , sed etiam duobus inter se non contrariis adjuvant. Demitur materia , sanguinis detractiōe , cucurbitula , dejectione , vomitu , frictione , gestatione , omnique exercitatione corporis , abstinence , sudore. De quibus protinus dicam. 10

C A P. X.

De Sanguinis detractiōe per venas. 15

SANGUINEM , incisa vena , mitti novum non est : sed nullum pene morbum esse , in quo non mittatur , novum est. Item , mitti junioribus , & fœminis uterum non gerentibus , vetus est. In pueris vero idem 20 experiri , & in senioribus , & in gravidis quoque mulieribus , vetus non est. Siquidem antiqui , primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant ; persuaserantque sibi , mulierem 25 gravidam , quæ ita curata esset , abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit , nihil ex his esse perpetuum , aliasque potius observationes adhibendas esse , ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest 30 enim , non quæ ætas sit , neque quid in corpore intus geratur , sed quæ vires sint. Ergo , si juvenis imbecillus est ; aut si mulier , quæ
 gravi-

gravida non est, parum valet, male sanguis
mittitur. emoritur enim vis, si quæ supe-
rerat, hoc modo erepta. At firmus puer, &
robustus senex, & gravida mulier valens,
tuto sic curantur. Maxime tamen in his
medicus imperitus falli potest: quia fere
minus roboris illis ætatibus subest. Mulie-
rique prægnanti post curationem quoque
10 viribus opus est, non tantum ad se, sed
etiam ad partum sustinendum. Non, quic-
quid aut intentionem animi, aut pruden-
tiam exigit, protinus ejiciendum est: cum
præcipua in hoc ars sit, quæ non annos nu-
15 meret, neque conceptionem solam videat,
sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit
necne superesse, quod vel puerum, vel se-
nem, vel in una muliere duo corpora simul
sustineat. Interest etiam inter valens cor-
20 pus, & obesum; inter tenue, & infirmum.
Tenuioribus magis sanguis, plenioribus
magis caro abundat. Facilius itaque illi de-
tractionem ejusmodi sustinent: celeriusque
eâ, qui nimium est pinguis, affligitur. Ideo-
25 que vis corporis melius ex venis, quam ex
ipsa specie æstimatur.

Neque solum hæc considerata sunt, sed
etiam morbi genus quod sit: utrum supe-
rans, an deficiens materia læserit: corru-
30 ptum corpus sit, an integrum. Nam si ma-
teria vel deest, vel integra est, istud alic-
num est. At si vel copia sui male habet, vel
corrupta est, nullo modo melius succurri-

zur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque venæ tument, sanguinis detractionem requirit: item viscerum morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distentio: quidquid denique fauces difficultate spiritus strangulat; quicquid subito supprimit vocem; quisquis intolerabilis dolor est; & quacumque de causa ruptum aliquid intus atque collisum est: item malus corporis habitus; omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent.

Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur: sed, si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit, qui laborat, nisi temeraria quoque via fuerit adjutus, in hoc statu boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit; faterique quantus in hac ipsa re metus sit, & tum demum, si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitare in ejusmodi re non oportet. satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt; ubi subito aliquis obmutuit; ubi angina strangulatur; ubi prioris febris accessio pene confecit, paremque subsequi verisimile est, neque eam videntur sustinere ægri vires posse.

Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est.

est. neque enim semper concoctionem res
exspectat. Ergo, si ex superiore parte ali-
quis decidit, si contusus est, si ex aliquo su-
bito casu sanguinem vomit, quamvis paulo
ante sumpsit cibum, tamen protinus ei de-
menda materia est, ne, si subsederit, corpus
affligat. Idemque etiam in aliis casibus re-
pentinis, qui strangulabunt, dictum erit.
10 At, si morbi ratio patiatur, tum demum
nulla cruditatis suspitione remanente id
fiet. Ideoque ei rei videtur aptissimus ad-
versæ valetudinis dies secundus, aut tertius.
Sed ut aliquando etiam primo die sangui-
nem mittere necesse est, sic nunquam utile
15 post diem quartum est, cum jam spatio ipso
materia vel exhausta est, vel corpus cor-
ruptum; ut detractio imbecillum id facere
possit, non possit integrum. Quod si vehe-
20 mens febris urget, in ipso impetu ejus san-
guinem mittere, hominem jugulare est.
expectanda ergo intermissio est: si non de-
cedit, cum crescere desit: si neque re-
missio speratur, tunc quoque, quamvis pe-
25 jor, sola tamen occasio non omittenda est.
Fere etiam ista medicina, ubi necessaria
est, in biduum dividenda est. Satius est
enim, primum levare ægrum, deinde per-
purgare, quam simul omni vi effusa for-
30 tasse præcipitare. Quod si in cura quoque
aquæ, quæ inter cutem est, ita respondet;
quanto magis necesse est in sanguine re-
spondeat?

Mitti

Mitti vero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio: si partis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima; quia non ubique mitti potest, sed in temporibus 5 in brachiis, juxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum; sic enim averti materiæ cursum; at illo modo in idipsum, quod gravatur, evocari. 10 Sed idipsum falsum est. proximum enim locum primo exhaurit; ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur: ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen usus 15 ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse: si quod in humero vitium est, ex altero brachio. credo, quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes injuriæ sunt, quam 20 quæ jam male habent. Avertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorum pens, alia emittitur. desinit enim fluere qua nolumus, inde objectis quæ prohibeant, alio dato itinere. • 25

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti; tamen ignaro difficillimum est. Juncta enim est vena arteriis, his nervi. Ita; si nervum scalpellus attigit, sequetur nervorum distentio, ea- 30 que hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit: interdum etiam, ut sanguis vehementer
crum-

erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide
5 scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multæ res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est.

- 10 Incidenda ad medium vena est. Ex qua cum sanguis erumpit, colorem ejus habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est; ideoque utiliter effunditur: si rubet & pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo non
15 prodest, ut etiam noceat, protinusque is suppressendus est. Sed id evenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri
20 solet, ut æque niger assidue primo die profluat. quod quamvis ita est, tamen si jam satis fluxit, suppressendus est: semperque ante finis faciendus est, quam anima deficiat.

- Deligandumque brachium superimposito
25 expresso ex aqua frigida penicillo; & postero die adverso medio digito vena fricanda, ut recens coitus ejus resolvatur, iterumque sanguinem fundat. Sive autem primo, sive secundo die sanguis, qui crassus
30 & niger initio fluxerat, & rubere, & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est, atq; quod superest, sincerum est: ideoque protinus brachium deligandum, habenda

bendumq; ita est, donec valens cicatricula fit; quæ celerrime in vena confirmatur.

C A P. XI.

De Sanguinis detractione per Cucurbitulas. 5

CUCURBITULARUM vero duo genera sunt: æneum, & corneum. Ænea, altera parte patet; altera, clausa est. Cornea, altera parte æque patens, altera 10 foramen habet exiguum. In æneum linamentum ardens conjicitur, ac sic os ejus corpori aptatur, imprimiturque, donec inhæreat. Cornea, per se corpori imponitur; deinde, ubi ea parte, qua exiguum 15 foramen est; ore spiritus adductus est, superque cera cavum id clausum est, æque inhærescit. Utraque non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit. At si cætera defecerunt, cali- 20 culus quoque aut pultarius, oris compressioris, ei rei commode aptatur. Ubi inhæsit, si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quæ intus est, lædit, 25 illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.

Ufus autem cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum 30 testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quæ jam læsa est, esse mittendum:

dum: quod nemo cucurbitulam diversæ parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eo avertit; sed ei ipsi, quæ dolet, 5 quæque liberanda est.

Opus esse cucurbitula potest in morbis longis (quamvis & iis jam spacium aliquod accessit) sive corrupta materia, sive spiritu male habente. In acutis quoque quibusdam, si & levare corpus debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idque auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum; neque unquam periculosum est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in 15 cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps periculum est, aut nobili in parte corporis vitium est, etiam huc potius confugiendum est. cum eo tamen, ut sciamus, 20 hic ut nullum periculum, ita levius præsidium esse; nec posse vehementi malo, nisi, æque vehemens auxilium succurrere.

C A P. XII.

De Dejectione.

25

DEJECTIONEM autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi dejectione in omnibus fere morbis moliebantur: dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, 30 quam λιπίδα χαλκοῦ Græci vocant; aut lactiæ marinæ lac, cujus gutta pani adjecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel

vel bubulum, caprinum, eique salis paulum adjiciebant, dequoquebantque id, & sublati his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. 5

Sed medicamenta stomachum fere laudunt. Ideoque omnibus catharticiis aloë miscenda est. Alvus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in adversa valetudine medicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi morbus sine febre est. Vt cum veratrum nigrum, aut atrabile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At, 10 ubi febres sunt, satius est ejus rei causa cibos portionesque assumere, qui simul & alāt, & ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit

2. De Alvi ductione

20

Plerunque vero alvus lotionibus ducenda est. quod, ab Asclepiade quoque sic vituperatum, ut tamem servatum sit, video plerunque seculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, 25 aptissima, ut neque sæpe medicina tentetur, & tamen semel, vel summum bis, non omittatur, si caput grave est; si oculi caligant; si morbus majoris intestini est, quod Græci κόλον nominant, si in imo ventre, 30 aut in coxa dolores sunt; si in stomachum quædam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eo se, humorve aliquis aquæ similis

lis confert; si spiritus difficilius redditur; si nihil per se venter excernit; utique, si iuxta quoque stercus est, & intus remanet; aut si
 5 stercoreis odorem nihil dejiciens æger ex spiritu suo sentit, aut si corruptum est, quod excernitur; aut si prima inedia febrem non sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus sit, vires non patiuntur, tempusve ejus rei
 10 præterit, aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui sæpe, vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet alvum suppressam. Servanda vero illa sunt, ne ante diem tertium ducatur: ne ulla crudi-
 15 tate substante: ne in corpore infirmo, diuque in adversa valetudine exhausto: neve in eo, cui satis alvus reddit quoridie, quive eam liquidam habet: neve in ipso accessionis impetu. quia, quod tum infusum est,
 20 alvo continetur, regeſtumque in caput, multo gravius periculum efficit. Pridie vero abstinere debet æger, ut aptus tali curationi sit. Eodem die ante, aliquod horis, aquam calidam bibere, ut superiores ejus
 25 partes madescant: tum immittenda in alvum est, si levi medicina contenti sumus, pura aqua; si paulo valentiori, mulsæ; si leni, aqua, in qua fœnum græcum, vel priſana, vel malva decocta sit: si reprimendi
 30 causa, ex verbenis. Acris autem marina aqua, vel alia sale adjecto: at utraque decocta commodior est. Acrior fit, adjecto vel oleo vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est,
 co

eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neque calidum; ne alterutro modo lædat. Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet æger, nec primæ cupiditati dejectionis protinus cedere: ubi necesse est, tum demum desidere. Fereque eo modo dempra materia, superioribus partibus levatis, morbum ipsum mollit. Cum vero, quotiens res coegit, desidendo aliquis se exhaust, paulisper debet conquiescere; &, ne vires deficient, utique eo die cibum assumere. qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ratione ejus accessionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

C A P. XIII.

De Vomitu.

20

AT vomitus, ut in secunda quoque valetudine sæpe necessarius biliosis est, sic etiam in his morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore & tremore vexantur: omnibus, qui cholera laborant: omnibus etiam cum quadam hilaritate insanientibus; & comitiali quoque morbo oppressis necessarius est. Sed, si acutus morbus est, sicut in cholera; si febris est, inter rigores, asperioribus medicamentis opus non est; sicut in dejectionibus quoque supra dictum est. Satisque est, ea vomitus causa sumi, quæ sanis quo-

quoque sumenda esse proposui. At ubi longi valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis aut insania, veratro quoque albo
5 utendum est. Id neque hieme, neque æstate recte datur: optime, vere: tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet, omne ejusmodi me-
10 dicamentum, quod potui datur, non semper ægris prodesse, semper sanis nocere.

C A P. X I V.

De Frictione.

15 **D**E frictione vero & gestatione adeo multa Asclepiades, tanquam inventor ejus, posuit in eo volumine, quod Communium auxiliorum inscripsit, ut cum trium tantum faceret mentionem
20 hujus & vini & gestationis, tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquio-
25 res aliquos posita sunt, authoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit; nihil tamen reperit, quod non à ve-
30 rustissimo authore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit: qui dixit, Frictione, si vehemens sit, durari corpus: si lenis moliri: si multa, minui: si modica, impleri. Sequi-

quitur ergo , ut tum utendum sit , cum aut adstringendum corpus sit , quod fluens est : aut molliendum , quod induruit : aut digerendum in eo , cui copia nocet : aut alendum id , quod tenue & infirmum est.

Quas tamen species , si quis curiosius æstimet (quod jam ad medicum non pertinet) facile intelliget , omnes ex una causa pendere , quæ demit. Nam & adstringitur 10 aliquid , eo dempto , quod interpositum , ut id laxaretur , effecerat : & mollitur , eo detracto , quod duritiem creabat ; & impletur non ipsa frictione , sed eo cibo , qui postea usque ad cutem , digestionem quadam rela- 15 xatam , penetrat. Diverfarum vero rerum in modo causa est.

Inter unctionem autem & frictionem multum interest. Vngi enim , leniterque pertractari corpus , etiam in acutis & recen- 20 tibus morbis oportet ; in remissione tamen & ante cibum. Longa vero frictione uti , neque in acutis morbis , neque incrementibus convenit ; præterquam cum phreneticis somnus ea quæritur. Amat autem hoc au- 25 xilium valetudo longa , & jam à primo impetu inclinata. Neque ignoro , quosdam dicere , omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis , non cum jam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest 30 enim morbus , etiam qui per se finem habiturus est , citius tamen adhibito auxilio tolli , quod duabus de causis necessarium est :

est: & ut quam primum bona valetudo contingat; & ne morbus, qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gravis esse, 5 quam fuerit; neque ideo tamen solvi; sed reliquiis quibusdam inhærere, quas admodum aliquod auxilium discutiat.

Sed ut, levata quoque aduersa valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam 10 adhibenda est febre crescente: verum, si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe cum ea remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus: 15 modo in partibus; aut quia ipsa ejus membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores ipsius frictio levat; non in impetu tamen doloris: & membrum aliquod resolutum ipsius fri- 20 ctione confirmatur. Longe tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet: maximeque cum à summis, aut à mediis partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. 25 Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Ut si quis per infirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse 30 faciendum. inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus sæpe in muliere, quam in viro: minus sæpe in pucro,

puero, vel sene, quam in juvene, manus dimovendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique fricatione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quam plurimum materiæ digerî, sive ipsum membrum, sive per id aliud levamus. At, ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet & lenior; ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo novæ materiæ fiat. In malis jam ægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoque unicum in frictione præsidium est. quæ si calorem evocavit, potest alicui medicinæ locum facere.

20

C A P. XV.

De Gestatione.

GESTATIO quoque longis & jam inclinatis morbis aptissima est. utilisque est & his corporibus, quæ jam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; & his, quibus lentæ morborum reliquiæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementique, præcipueque ardente febre, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum. Sed id periculose fit; meliusque in quiete ejusmodi imperus sustinetur. Si quis

quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. At ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est; nisi tamen solis nervis dolentibus; neque unquam in crescente febre, sed in remissione ejus.

10 Genera autem gestationis plura sunt: quæ adhibenda sunt & pro viribus cujusque, & pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili defint. Gestationum lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vel lectica, aut scamno: acrior, vehiculo: vehementior, in alto mari navi. Atque hæ ipsæ & intendi & leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moveri. Si ne id quidem

20 est, at certe uni pedi lecti fulcrum subiiciendum est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et levia quidem genera exercitationis infirmis conveniunt: valentiora vero his, qui jam pluribus

25 diebus febre liberati sunt; aut his, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent (quod & in tabe, & in stomachi vitiis, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit) aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre quamvis diu, manent. In quibus affectibus ea quoque genera

30 exercitationum necessaria sunt, quæ com-

E

prehendunt.

prehendimus eo loco, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gerere debent, præcepimus.

CAP. XVI.

De Abſtinentia.

ABSTINENTIÆ vero duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger: alterum, ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur. neque enim convenit juxta inediam protinus satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quanto inutilius est infirmo, nedum ægro? Neque ulla res magis adjuvat laborantem, quam tempeſtiva abſtinentia. Intemperantes homines apud nos, sibi cibi tempora, modum curantibus dant. Rursus alii, tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum arbitrio relinquunt; in genere cibi liberi sunt, quasi quærat, quid medico liceat, non quid ægro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

CAP. XVII.

De Sudore.

SUDOR duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arenæ calidæ, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationum, ubi a terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super Bajas in murtetis habemus. Præter hæc, sole quoque, & exercitatione is movetur. Utiliaque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optime curantur. Et cætera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus; qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam non gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in cruditate tentetur.

At balnei duplex usus est. Nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris, vinique firmioris, valetudini facit; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur: Asclepiades audacius. Neque terere autem ea res, si tempestiva est, debet: at ante tempus, nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo, qui proximus est post tempus accessio-

cessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die revertatur, quodcumque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, lienæque jamdiu male habent, recte medicina ista tentatur: cum eo tamen, ne præcordia dura sint, neve eæ tumeant, neve lingua aspera sit, neve gut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum febris increseat. Et in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante horrorem; alterum, febre finita. In his vero, qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio; aut si id non solet, certe lenita est, jamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet. 10

Imbecillus homo, iturus in balneum, vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur: ubi in balneum venit, paulisper resistere, experiri que, num tempora adstringantur, & an sudor aliquis oriatur: illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneum est: & perungendus est is leniter, & referendus, vitandumque omnimodo frigus, & abstinencia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua calida; tum in solio desidendum est: atque ibi quoque videndum, num sub primo contactu 25 30

tactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora recte accesserunt. certum autem id signum
 5 inutilis balnei est.

Ante vero, quam in aquam calidam se demittat, an postea aliquis perungi debeat, ex ratione valetudinis suæ cognoscat. Fere tamen (nisi ubi nominatim, ut postea fiat,
 10 id præcipietur) moto sudore leniter corpus perungendum; deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est: neque commit-
 tendum, ut per æstum anima deficiat; sed
 15 maturius is auferendus, curiosæque vesti-
 mentis involvendus est, ut ne ad eum frigus aspiret: & ibi quoque, antequam aliquid assumat, insudet.

Fomenta quoque calida sunt, milium,
 20 sal, arena. quodlibet eorum calefactum, & in linteum coniectum; etiam solum linteum, si minore vi opus est: at si maiore, extincti titiones, involutiq; panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido oleo re-
 25 plentur utriculi: & in vasa fictilia (quas à similitudine lenticulas vocant) aqua con-
 jicitur, & sal sacco lineo excipitur, demittiturque in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fovendum est, colloca-
 30 tur. Juxtaque ignem, ferramenta duo ignita sunt, capitibus paulo latioribus: alterum ex his demittitur in siccum salem, & aqua super leviter aspergitur; ubi frigere
 E 3 cœpit,

cœpit, ad ignem refertur: idem & in altero fit; deinde invicem in utroque: intereaque descendit salsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est, digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsius morborum generibus dicetur.

10

CAP. XVIIII.

Qui cibi potionesve, aut valentis, aut medie, aut imbecillæ materiae sint.

Cum de his dictum sit, quæ detrahendo juvant: ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum, & potionem.

Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut sani sciant, quomodo his utantur: deinde, ut exsequentibus nobis morborum curationes, liceat species rerum, quæ assumendæ necessario erunt, subicere: neque necesse sit subinde singulas eas nominare.

Scire igitur oportet, omnia legumina, quæque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse (valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est:) item omne animal quadrupes domi natum; omnem grandem feram, quales sunt capræ, cervus, aper, onager; omnem grandem avem, quales

les

les sunt anser, & pavo, & grus; omnes bel-
luas marinas, ex quibus cetus est, quæque
his pares sunt: item mel, & caseum. Quo
5 minus mirum est, opus pistorium valentis-
simum esse, quod ex frumento, adipe, mel-
le, caseo constat. In media vero materia,
numerari ex oleribus debere ea, quorum
radices, vel bulbos assumimus: ex quadru-
10 pedibus, leporem: aves omnes à minimis
ad phœnicopterum: item pisces omnes,
qui salem non patiuntur, solidive saliu-
tur. Imbecillissimam vero materiam esse,
omne olus, & quicquid in cauliculo nasci-
15 tur, qualis est cucurbita, & cucumis, &
capparis: omnia poma, oleas, cochlear,
itemque conchylia.

Sed quamvis hæc ita discreta sint, tamen
etiam, quæ sub eadem specie sunt, magna
20 discrimina recipiunt; aliaque res alia vel
valentior est, vel infirmior. Siquidem plus
alimenti est in pane, quam in ullo alio. Fir-
mius est triticum, quam millum: id ipsum,
quam hordeum: & ex tritico firmissima fi-
25 ligo; deinde simila; deinde cui nihil adem-
ptum est, quod *ἀντίπυρον* Græci vocant:
infirmior est, ex polline: infirmissimus, ci-
barius panis. Ex leguminibus vero valen-
tior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex
30 oleribus valentior rapa, napique, & omnes
bulbi (in quibus cepam quoque, & allium
numero) quam pastinaca, vel quæ speciali-
ter radícula appellatur. Item firmior bras-

fica, & beta, & porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus furculorum valentiores uvæ, ficus, nuces, palmulæ, quæque poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmiora, quæ succosa, quam quæ fragilia sunt. Item ex his avibus, quæ in media specie sunt, valentiores eæ, quæ pedibus, quam quæ volatu magis nituntur: & ex his, quæ volatu fidunt, firmiores sunt grandiores aves, quam minutzæ, ut ficedula & turdus. Atque eæ quoque, quæ in aqua degunt, leviorẽ cibum præstant, quam quæ natandi scientiam non habent. Inter domesticas vero quadrupedes, levissima suilla est; gravissima, bubula. Itemque ex feris, quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumque eorum, qui ex media materia sunt, quamvis maxime utimur, tamen gravissimi sunt: tum ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde hi, qui, quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, corvus, sparus, oculata; tum plani: post quos etiam leviores sunt, lupi, mullicque; & post hos, omnes saxatiles.

Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis: quod & ætate fit, & membro, & solo, & cœlo, & habitu. Nam quadrupes vel omne animal si lactens est, minus alimenti præstat: itemque quo tenerior pullus cohortalis est. In
pisci-

piscibus quoque media ætas, quæque nondum summam magnitudinem implevit. Deinde ex eodem sue, ungulæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædove, cum petiolis totum caput aliquanto, quam cætera membra, leviora sunt; adeo ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla, alæ recte infirmissimis annumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quam eampestre. Levior piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo. Quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera graviora sint. Leviorque, qui in alto, quam qui in vado vivit. Omne etiam ferum animal domestico levius; & quodcumque humido cælo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra; recentia, quam salsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit jurulenta, quam assa; magis assa, quam frixa. Ovum durum valentissimæ materiæ est: molle, vel forbile, imbecillissimæ. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, oryza, ptisana, vel ex iisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quæque madens panis, imbecillissimis annumerari potest.

Ex potionibus vero, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defru-

tum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis, valentissimi generis est. At acetum, & id vinum quod paucorum annorum, vel austerrum, vel pingue est, in media materia est. ideoq; infirmis nunquam ejus generis dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Firmiorque ex frumento potio est, quo firmius fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato cœlo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum, quo plus mellis habet; defrutum, quo magis decoctum; passum, quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua levissima pluvialis est; deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo; posthæc ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex palude. Facilis etiam, & necessaria cognitio est naturam ejus requirentibus. Nam levis, pondere apparet; & ex his, quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est, quo celerius & calefit & frigescit; quoque celerius ex ea legumina percoquantur. 5

Fere vero sequitur, ut, quo valentior quæque materia est, eo minus facile concoquatur; sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materiæ genere pro viribus; modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmis opus est: mediocriter firmos: media

media materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex levioribus potest: in his magis; & quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

C A P. XIX.

Quæ natura ac proprietas cujusque rei sit, qua vescimur.

10 **N**EQUE hæc sola discrimina sunt; sed etiam aliæ res boni succi, aliæ mali sunt; quæ *ἄχυμα*, & *κακόχυμα* Græci vocant: aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassiores pituitam in nobis faciunt, aliæ
15 tenuiorem: aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ alienæ: Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt: aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho acescunt, aliæ non facile intus corrumpuntur: aliæ mo-
20 vent alvum, aliæ supprimunt: aliæ citant urinam, aliæ tardant: quædam somnum movent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii, vel corpori, vel valetudini, convenit.

25 C A P. XX.

De his, quæ boni succi sunt.

30 **B**ONI succi sunt, triticum, filigo, alica; oryza, amyllum, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aves, quæ ex media materia sunt: ex majoribus quoque hæ, quas supra nominavimus: medii inter teneros durosque pisces,

ut nullus, & lupus: olera, lactuca, urtica, malva, cucumis, cucurbita, portulaca, cochleæ, palmulæ: ex pomis quodcumque neque acerbum, neque acidum est: vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleæ, quæve ex his duobus in alterutro servatæ sunt: vulvæ, rostra, trunculique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne jecur, ovum sorbile.

10

CAP. XXI.

De his, quæ mali succi sunt.

MALI vero succi sunt, milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacræ, omnisque caro falsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, fiser, radícula, rapa; napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma ejus, asparagus, beta, cucumis, porrum, crucea, nasturtium, thymum, nepeta, satireia, hyssopum, ruta, anethum, feniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerbæ, oleum, pisces quodque saxatiles, omnesque, qui ex tenerrimo genere sunt, aut hi, qui rursus nimium duri virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosive rivi ferunt, quive in nimiam magnitudinem excesserunt.

CAP.

C A P. XXII.

Quæ res lenes, quæue acres sint.

5 **L**ENES autem sunt, sorbitio, pultricia, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcunq; glutinosa est. quod fere quidem in omni, quæ domestica, fit, præcipue tamen in ungulis, trunculisque
 10 suum, in petiolis capitulisque hœdorum & vitulorum & agnorum, omnibusque cerebellis. Item lac, & quæ proprie dulcia nominantur, defrutum, passum; nuclei pinei. Acria sunt, omnia nimis austera, omnia
 15 acida, omnia salsa; & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, crucea, ruta, nasturtium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocimum, lactuca, maximaque olerum pars.

20

C A P. XXIII.

De his, quæ crassiorem, quæue tenuiorem pituitam faciunt.

25 **C**RASSIOREM autem pituitam faciunt, ova sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem, omnia salsa, atque acria, & acida.

C A P. XXIV.

30

De his, quæ stomacho idonea sunt.

STOMACHO autem apta sunt, quæcunque austera sunt, & quæ acida, quæque
 con-

contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel pri-
 sana; omnis avis, omnis venatio; atque
 utraque vel assa, vel elixa: ex domesticis
 animalibus bubula: si quid ex cæteris sumi-
 tur, macrum potius, quam pingue: ex sue,
 ungulæ, rostra, aures, vulvæque steriles:
 ex oleribus, intuba, lactuca, pastinaca, cu-
 curbita elixa, sifer: ex pomis, cerasum, 10
 morum, sorbum, pirum fragile, quale cru-
 stuminum vel nævianum est: item pira,
 quæ ponuntur, tarentina, atque signina;
 malum orbiculatum, aut scandianum, vel
 amerinum, vel cotoneum, vel punicum, 15
 apsinthium, murices, purpuræ, cochleæ,
 uvæ ex olla, molle ovum, palmulæ, nuclei
 pinci, oleæ albæ ex dura muria, eadem ace-
 to intinctæ, vel nigræ, quæ in arbore bene
 permaturuerunt, vel quæ in passlo, defruto- 20
 ve servatæ sunt: vinum austerum, licet
 jam asperum sit, item resinatum: duri ex
 media materia pisces, ostrea, pectines, mu-
 rices, purpuræ, cochleæ: cibi, potionisque
 frigidæ, vel fervidæ. 25

C A P. XXV.

Quæ res alienæ stomacho sint.

ALIENA vero stomacho sunt, omnia
 tepida, omnia salsa, omnia jurulen- 30
 ta, omnia prædulcia, omnia pingua,
 sorbitio, panis fermentatus, idemque vel
 ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices
 olerum,

olerum, & quodcunque olus ex oleo garove estur, mel, mulsu, defrutu, passu, lac, omnis caseus, uva recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quæque inflare consueverunt: item thymu, nepeta, satureia, hyssopu, nasturtiu, lapathu, lampšana, juglandes. Ex his autem intelligi potest, non, quicquid boni succi est, 10 protinus stomacho convenire: neque quicquid stomacho convenit, protinus boni succi esse.

CAP. XXVI.

15 *De his, quæ inflant.*

INFLANT autem, omnia fere legumina, omnia pingua, omnia prædulcia, omnia jurulenta, mustu, atque etiam id vinu, cui nihil adhuc ætatis accessit: ex 20 oleribus, alliu, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam aridæ, sed magis virides, uvæ recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisque caseus, quicquid denique subcrudu aliquis assumpfit. 25

De his, quæ minime inflant.

Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchiliis, ovis vel mollibus vel sorbilibus, vino vetere. 30 Feniculum vero, & anethu, inflationes etiam levant.

C A P. XXVII.

De his, quæ calefaciunt, aut refrigerant.

AT calefaciunt, piper, sal, caro omnis & jurulenta, allium, cepa, ficus arida, balsamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis.

Refrigerant, olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca: item- 10 que coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueque acetum, si- ve cibus ex eo, si- ve potio assumitur.

C A P. XXVIII.

15

De his, quæ intus facile corrumpuntur.

FACILE autem intus corrumpuntur, panis fermentatus & quisquis alius quam ex tritico est, & omne pistorium opus, 20 lac, mel; itemque lactentia atque teneri pisces, ostrea, olera, caseus & recens & vetus, crassa vel tenera caro; vinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quicquid denique vel jurulentum est, vel nimis dulce, vel 25 nimis tenue.

De his, quæ intus minime vitiantur.

At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aves, & ex potius duriores, durii pisces, neque solum aurata puta, aut sca- 30 rus, sed etiam lolligo, locusta, polypus: item bubula, omnisque dura caro; eademque aptior est, si macra, si salsa est; omnia- que

que falfamenta : cochleæ, murices, purpuræ : vinum austerum , vel refinatum.

C A P. XXIX.

De his , quæ alvum movent.

AT alvum movent , panis fermentatus, magisque si cibarius vel hordeaceus est ; brassica , si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocimum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malva, lapathum , beta, asparagus, cucurbita, cerasa, mora , poma omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viridis, uvæ
 10 recentes pingues , minutæ aves, cochleæ ; garum , falfamentum , ostrea, pelorides, echini, musculi , & omnes fere conchulæ, maximeque jus earum : saxatiles, & omnes teneri pisces , sepiarum atramentum ; si
 20 qua caro assumitur pinguis, eadem vel jurulenta , vel elixa ; aves , quæ natant ; mel crudum, lac, lactentia omnia, mulsum, vinum dulce vel falsum, aqua, omnia tenera, tepida , dulcia , pingua , elixa , jurulenta,
 25 falsa , diluta.

C A P. XXX.

De his , quæ alvum adstringunt.

CONTRA adstringunt , panis ex siligine, vel ex simili; magis, si sine fermento est ; magis etiam si tostus est ; intenditurque vis ejus etiam , si bis coquitur: pulticula vel ex alica, vel ex panico, vel
 30
 ex

ex milio; itemque ex iisdem sorbitio; & magis, si hæc ante fricta sunt: lenricula, cui vel beta, vel intubus, vel ambubeia, vel plantago adjecta est; magisque etiam, si illa ante fricta est: per se etiam intubus, vel ex plantagine, vel ambubeia fricta; minuta olera, brassica bis decocta; dura ova; magisque, si assa sunt: minutæ aves, merula, palumbes; magisque, si in posca decocta est: 10 grus, omnesque aves, quæ magis currunt, quam volant; lepus, caprea; jecur ex his, quæ sebum habent, maximeque bubulum, ac sebum ipsum: caseus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione, quam in eo 15 transmarino videmus; aut si recens est, ex melle, mulsove decoctus: item mel coctum, pira immatura, sorba, magisque ea, quæ torminalia vocantur, mala cotonea, & punica, oleæ vel albæ vel præmaturæ, 20 myrta, palmulæ, purpuræ, murices, vinum refinatum vel asperum, item meracum; acetum, mulsum quod inferbuit, asperum item defrutum, passum, aqua vel tepida vel præfrigida, dura, id est, ea quæ tarde pu- 25 trescit, ideoque pluviatilis potissimum, omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne, assa potius, quam elixa.

CAP. XXXI.

30

De his, quæ urinam movent.

URINAM autem movent, quæcunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut

ut apium , ruta , anethum , ocimum ,
mentha, hyssopum , anisum, coriandrum ,
nasturtium, eruca, feniculum, præter hæc,
asparagus, capparis, nepeta, thymum, satu-
reia , lampfana, pastinaca , magisque agre-
stis , radícula , sifer , cepa. Ex venatione ,
maxime lepus , vinum tenue , piper & ro-
tundum & longum , sinapi , apsinthium ,
conuclei pinci.

C A P. XXXII.

De his , quæ ad somnum apta sunt.

15 **S**OMNO vero aptum est papaver , lactu-
sca, maximeque æstiva, cujus caulicu-
lus jam lacte repletus est, morum, por-
rum.

De his , quæ sensum excitant.

Sensus vero excitant, nepeta, thymum ,
20 osatureia , hyssopum , præcipueque pule-
gium , ruta , & cepa.

C A P. XXXIII.

De his , quæ materiam evocant.

25 **E**VOCARE vero materiam multa ad-
modum possunt : sed ea, cum ex pere-
grinis medicamentis maxime con-
sistent ; aliisque magis, quam quibus ratione
victus succurritur, opitulentur, in præsentia
30 differam: ponam vero ea, quæ prompta, &
his morbis , de quibus protinus dicturus
sum, apta, corpus erodunt, & sic ex eo,
quidquid mali est , extrahunt. Habent
autem

autem hanc facultatem, semina crucæ, nasturtii, radiculæ; præcipue tamen omnium, sinapis. Salis quoque & fici eadem vis est.

De his, quæ reprimunt.

Leniter vero simul & reprimunt & molliunt, lana succida, ex aceto vel vino, cui oleum adjectum est; contritæ palmulæ; furfures in salsa aqua vel aceto decocti.

At simul reprimunt & refrigerant, herba muralis (parthenium vel perdicium appellant) serpillum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis (quam Græci *παλὺς* vocant) portulaca, papaveris folia, capreo-
lique vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus, fiser, apium, solanum (quam Græci *σφύγγιον* vocant) brassicæ folia; intubus, plantago, feniculi semen, contrita pira vel mala, præcipueque cotonea, lentis-
cula, aqua frigida, maximeque pluvialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo madens vel panis, vel farina, vel sponsia, vel lacinia, vel lana succida, vel etiam linteolum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia; cujus generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamarix, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum.

Sine frigore autem reprimunt, cocta cotonea, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pul-

vis

vis vel ex fece vini, vel ex myrti foliis, amaræ nuces.

De his, quæ calefaciunt.

5 Calefacit vero, ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farris, siue hordei, siue ervi, vel lolii, vel milii, vel panici, vel lenticulæ, vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel sceni græci, ubi ea deferbuit,
10 calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex fele juncta oleo, magisque, si vetus est, sal, nitrum, git, piper,
15 quinquefolium.

De his, quæ durant, aut emolliunt.

Fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant, durant: quæ autem calefaciunt & digerunt, ea emolliunt: præcipue-
20 que ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel sceni græci semine.

His autem omnibus, & simplicibus, & permixtis, varie medici utuntur; ut magis, quid quisque persuaserit sibi, appareat,
25 quam quid evidenter compererit.

LIBER TERTIUS.

C A P. I.

30 *De morborum generibus.*



RAVISIS omnibus, quæ pertinent ad universa genera morborum, ad singulorum curationes veniam.

veniam. Hos autem in duas species Græci
diviserunt ; aliosque ex his acutos, alios
longos esse dixerunt. Ideoque, quoniam
non semper eodem modo respondebant, 5
eosdem alii inter acutos, alii inter longos
retulerunt. Ex quo, plura eorum genera
esse, manifestum est. Quidam enim bre-
ves acutique sunt, qui cito vel tollunt ho-
minem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam 10
longi, sub quibus neque sanitas in pro-
pinquo, neque exitium est. Tertiumque
genus eorum est, qui modo acuti, modo
longi sunt. idque non in febribus tantum-
modo, in quibus frequentissimum est ; sed 15
in aliis quoque fit. Atque etiam, præter hos,
quartum est ; quod neque acutum dici po-
test, quia non perimit ; neque utique lon-
gum, quia, si occurritur, facile sanatur.
Ego, cum de singulis dicam, cujus quisque 20
generis sit, indicabo.

Dividam autem omnes in eos, qui in to-
tis corporibus consistere videntur, & eos,
qui oriuntur in partibus. Incipiam à prio-
ribus, pauca de omnibus præfatus. In nul- 25
lo quidem morbo plus fortuna sibi vendi-
care quam ars : ars, quam natura, potest :
utpote cum, repugnante natura, nihil me-
dicina proficiat. Magis tamen ignoscen-
dum medico est parum proficienti in acu- 30
tis morbis, quam in longis. Hic enim bre-
ve spacium est, intra quod, si quod auxi-
lium non profuit, æger extinguitur : ibi &
delibe-

deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur.

- 10 Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi authores, quasi sola, venditaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondit, non
15 tanti putare authorem, quanti ægrum, & experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus, ut facit, sic
20 etiam solvit, non statim condemnetur, si quid non statim profuit: minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur.

25 C A P. I I.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an minuantur; & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

- 30 **P**ROTINUS autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solum, in quibus semper ita se habet; sed in his quoque, in quibus

quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graves urgent, acutus morbus est. Ubi lenti dolores, lentæve febres sunt, & spatia inter accessiones porriguntur, acceduntque ea signa, quæ in priore volumine exposita sunt, longa hunc futurum esse, manifestum est.

Videndum etiam est, morbus an increseat, an consistat, an minuat: quia quædam remedia incrementibus morbis, plura inclinatis conveniunt. Eaque, quæ crescentibus apta sunt, ubi acutus incrementum urget, in remissionibus potius experienda sunt. Incrementum autem morbus, dum graviores dolores, accessionesque veniunt; hæque & ante, quam proximæ, revertuntur, & postea desinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habentibus, scire licet, incrementum, si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foetidiores dejectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si id magis paller. Ea vero, quæ contraria his sunt, decedentis ejus notæ sunt.

Præter hæc, in acutis morbis serius æger alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut incidia, dempta materia, impetum frangat. In longis maturius, ut sustinere spatium affecturi mali possit. At, si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, quam partis; cum per eam partes ægræ sanen-

sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam: quia curatio minus his prodest, in quibus
5 assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris viribus vivit, admota curatione momento restituitur.

Sed cum ab his cœperim, quæ notas quasdam futuræ adversæ valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab
10 animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur, si quid ex his, quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, quies & abstinencia: si quid bibendum, aqua; idque
15 interdum uno die fieri satis est; interdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postero die etiam vinum, deinde invicem alternis diebus, modo
20 aqua, modo vinum, donec omnis causæ metus finiatur. per hæc enim sæpe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublatur
25 balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. non quod non interdum id incidat, aut non decipiat, sed quod sæpius fallat; solaque abstinentia sine ullo periculo medea-
30 tur. Cum præsertim etiam pro modo terroris moderari liceat: &, si leviora indicia fuerunt, satis sit à vino tantum abstinere; quod subtractum plus, quam si cibo ali-

F

quid

quid dematur, adjuvat: si paulo graviora, satis sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere: interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, & olere potissimum. Satisque sit, tum ex toto à cibo, à vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehementes notæ terruerunt. Neque dubium est, quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per hæc mature morbo occurrit, ægrotet.

C A P. I I I.

De Februm generibus.

15

ATQUE hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus, sequitur vero curatio februm; quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro evenit. In prioribus, & morbi sunt, & medicina.

Ac quartanæ quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum est. ita quarto die revertitur.

Tertianarum vero duo genera sunt. Alterum eodem modo, quo quartana, & incipiens, & desinens; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum; tertio redit. Alterum longe perni-

perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem & quadraginta horis fere sex & triginta per accessionem occupat (interdum etiam vel minus, vel plus) neque ex toto in remissione desistit; sed tantum levius est. Id genus plerique medici *intermittens* appellant.

Quotidianæ vero variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, ubi extremæ partes membrorum inalgescunt: horrorem, ubi totum corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat: ac sæpe aliæ vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut cœpere, continuant. Deinde, aliæ fervorem ingentem habent, aliæ tolerabilem: aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores: aliæ tempore eodem postridie revertuntur, aliæ vel serius vel celerius: aliæ diem noctemque accessione & decessione implent, aliæ minus, aliæ plus: aliæ, cum decedunt, sudorem movent, aliæ non movent; atque alias per sudorem ad integritatem venit, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modo singulæ singulis diebus sunt, modo binæ pluresve concurrunt.

Ex quo sæpe evenit , ut quotidie plures accessiones remissionesque sint ; sic tamen , ut unaquæque alicui priori respondeat.

Interdum vero accessiones quoque confunduntur , sic ut notari neque tempora earum , neque spatia possint. Neque verum est , quod dicitur à quibusdam , nullam febrem inordinatam esse , nisi aut ex vomica , aut ex inflammatione , aut ex ulcere. Faci- 10
lior enim semper curatio foret , si hoc verum esset. nam , quod evidentes causæ faciunt , facere etiam abditæ possunt. Neque de re , sed de verbo controversiam movent , qui , cum aliter aliterque in eodem morbo 15
febres accedunt , non easdem inordinate redire , sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret , etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo li- 20
beralia , modo vix ulla sunt.

C A P. I V.

De Curationum diversis generibus.

Et febrium quidem ratio maxime ta- 25
lis est. Curationum vero diversa genera sunt , prout authores aliquos habent. Asclepiades officium esse medici dicit , ut tuto , ut celeriter , ut jucunde curet. Id votum est : sed fere periculosa esse ni- 30
mia & festinatio & voluptas solet. Quæ vero moderatione utendum sit , ut quantum fieri potest , omnia ista contingant ,
prima

prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit.

Et ante omnia quæritur, primis diebus
5 æger qua ratione continendus sit. Antiqui,
medicamentis quibusdam datis, conco-
ctionem moliebantur; eo quod cruditatem
maxime horrebant: deinde eam materiam,
quæ lædere videbatur, ducendo sæpius al-
10 vum subtrahebant. Asclepiades medica-
menta sustulit; alvum non toties, sed se-
re tamen in omni morbo, subduxit. Febre
vero ipsa præcipue se ad remedium uti pro-
fessus est. Convellendas etiam vires ægri
15 putavit, luce, vigilia, siti ingenti; sic, ut
ne os quidem primis diebus elui sineret.
Quo magis falluntur, qui per omnia ju-
cundam ejus disciplinam esse concipiunt.
Etenim ulterioribus quidem diebus cu-
20 bantis etiam luxuriæ subscripsit, primis
vero tortoris vicem exhibuit.

Ego autem, medicamentorum dari po-
riones, & alvum duci non nisi raro debere,
concedo. Et id non ideo tamen agendum,
25 ut ægri vires convellantur, existimo: quo-
niam ex imbecillitate summum periculum
est. Minui ergo tantum materiam superan-
tem oportet; quæ naturaliter digeritur,
ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus
30 à cibo primis diebus est, & in luce haben-
dus æger (nisi infirmus) interdiu, quo-
niam corpus ista quoque digerit;isque cu-
bare quam maximo conclavi debet.

Quod ad sitim vero somnumque pertinet, moderandum est, ut interdum vigilet; noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi & siccum est, & ipsi foetet. quamvis id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit, sæpe, interiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere; neque 10 ad rem, male haberi ægrum, pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est.

Optimum vero medicamentum est, opportune cibus datus. qui quando primum dari debeat, quæritur. Plerique ex antiquis 15 tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto, & id fortasse vel in Asia, vel in Ægypto, cœliratio patitur. Asclepiades, ubi ægrum tri-duo per omnia fatigaverat, quartum diem cibo destinabat. At Themison nuper, non, 20 quando cœpisset febris, sed quando desisset, aut certe levata esset, considerabat, &, ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea vel desierat; vel, si assidue inhærebat, 25 si certe se inclinaverat, cibum dabat.

Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest 30 post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ
ætas.

ætas, quod tempus anni. Minimeque, in rebus multum inter se differentibus, perpetuum esse præceptum temporis potest.

¶ In morbo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est; itemque eo cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica nullo die æger abstineri recte videtur.

Maturius etiam puero, quam juveni: æsta-

10 re, quam hieme, dari debet. Unum illud, & semper, & ubique servandum est, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, & quamdiu supererunt, abstinencia pugnet; si imbecillitatem vereri cœperit, cibo sub-

15 veniat. Id enim ejus officium est, ut ægrum, neque supervacua materia oneret, neque imbecillio rem fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis parum docuit, quando venter, quando
20 corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, hæc esse videnda, & tum cibum dandum cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse.

25 Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed, qui quæstui serviunt, quoniam is major ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro vident:

ille affideat necesse est, qui, quod solum opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies, quartus aptissimus esse consuevit.

Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de ægris judicaretur, *neivius* nominabant. 10 Hi erant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus & vigesimus; ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutre- 15 bant, ut dierum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus instantibus, darent: adeo ut Hippocrates, si alio die febris desisset; recidivam timere sit solitus. 20

Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit; neque in ullo die, quia par imparve esset, ægris vel majus vel minus periculum esse dixit. Interdum enim pejores dies pares fiunt; & opportunius post febrium acces- 25 siones cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur, fitque gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui 30 cum octavum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octavum, vum,

vum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi potentio- rem: plus enim tribuebant nono, & undecimo.

5 Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo, non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei, quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse
10 gravissimum. Ita, illo quoque authore, in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, ut in utrunque efficacissimum apprehendit; id est, quartum,
15 septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum. in quo ab impari ad paris rationem transit. Et ne in hoc quidem propositum conservavit: cum à septimo die undecimus, non quartus, sed
20 quintus sit. Adeo apparet, quacumque ratione ad numerum respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem authore, reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fellerunt: cum hic quoque medicus non
25 numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; & ex his conjectare, quando dandus cibus sit.

Illud autem magis ad rem pertinet, sci-
30 re, cibumne oporteat dari, cum jam benevenæ conquieverunt, aut etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum

offerebant. Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhærente. In quo vanam rationem secutus est : non quod non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio : sed quod scilicet non nisi quam sanissimo dari debeat. minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus 10 horis integer futurus esset æger, satius esse tunc dare ; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum hoc breve tempus non præstet, satius est, 15 principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus secuturum est, quam integerrimo dandus est : si etiam breve, antequam ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quæ maxime in febre continua potest esse. At hoc quoque quaeritur, utrum tot horæ expectandæ sint, quot febrem habuerunt : an satis sit, primam partem earum præteriri, 25 ut ægris jucundius insidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus præterire : quamvis, ubi longa febris fuit, potest indulgeri ægro maturius, dum tamen ante 30 minimum pars dimidia prætereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

C A P. V.

De febrium speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.

Hæc magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex æstu, aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit, postero die, cum tempus accessionis ita transiit, ut nihil moreretur, cibus dari potest. At, si ex alto calor venit; & gravitas vel capitis vel præcordiorum secuta est; neque apparet, quid corpus confuderit; quamvis unam accessionem secuta integritas est: tamen, quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius; & ubi accessionis tempus præterit, cibus dandus est, sed exiguus; quia quartana quoque timeri potest. At die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est; scire licet, morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque (quarum & certus circuitus, & finis integer, & liberaliter quiesca tempora sunt.) expeditior ratio est. de quibus suo loco dicam.

Nunc vero eas explicabo, quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus

ægro commodissime datur, ut alter febrem minuatur, alter viribus subveniat. Sed is dari debet, si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat, simulatque corpus integrum factum est: sin, quamvis non accessiones, febres tamen junguntur, & quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut major remissio non expectetur: si altero die gravior, altero levior accessio est, post graviolem. Fere vero graviolem accessiolem levior nox sequitur, quo fit, ut graviolem accessiolem nox quoque tristior antecedit.

At, si continuatur febris, neque levior unquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere remissius matutinum tempus ægris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est ægris, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies ægris est, quia hoc ipso pejus id tempus est, quod, cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum, à quo cum omnis æger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali ægro cibum dant. Sed cum eo tempore fere pessimi sint, qui ægrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc alii

alii differunt ad mediam noctem, decurso jam gravissimo tempore, eodemque longissime distante. Securius vero datur antelucanis horis; quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore; quod natura sua levissimum est.

- Si vero febres vagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur; 10 quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At, si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paresne per omnia sint (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia 15 pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vesperem definit. Si impares sunt: considerandum est, quo distent. Nam, si altera gravior, altera levior est, post graviores 20 dari debet: si altera longior, altera brevior, post longiorem: si altera gravior, altera longior est, considerandum est, utra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed plane plurimum interest, 25 quantæ qualesque inter eas remissiones sint. Nam, si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est; integro corpore cibo tempus aptius est.
- 30 Si semper febricula manet; sed alterum tamen longius tempus remissionis est; id potius eligendum est: adeo ut, ubi accessiones continuantur, protinus, inclinata priore

priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest; cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere; & hoc salvo, dare quam integerrimo corpore. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed, cum sit aptissimum, tertio quoque die cibum dare, tamen, si corpus infirmum est, quotidie dandus est: 10 multoque magis, si continentes febres sine remissione sunt quantoque magis corpus affligunt; aut si duæ pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie 15 debeat, si protinus venæ conciderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his servandum est; ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus 20 piceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur; scire licet optimum cibo tempus esse febre finita: deinde, cum de- 25 celsio ejus consistit: tertium, si necesse est, quandocumque decedit: cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget: satius esse, consistente jam incremento febris, aliquid offerre, 30 quam incremente: satius esse instante, quam incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

Noque.

Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interveniunt.

Cum vero semper ægros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue, ubi cibum
 10 sumpserunt. Itaque, si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, ea, dum ægrotant, eorum notitiæ subtrahere: si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum, postque somni tempus,
 15 & cum experfecti sunt, tum exponere.

C A P. V I.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

20 **S**ED de cibo facilior quidem cum ægris ratio est: quoniam sæpe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione vero ingens pugna est; eoque magis, quo major febris est. Hæc enim si
 25 tim accendit, & tum maxime aquam exigit cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieverit; protinus sitim quoque quieturam: longioremque accessionem fore, si quod ei da-
 30 tum fuerit alimentum. ita celerius cum desinere sitire, qui non bibit. Necessè est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis ægris in
 potio-

potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo vero, & cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest.

Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas portiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut, qualia tempora cibo leguntur, talia portioni quoque: ubi sine illo datur, deligantur, cum ægrum dormire cupimus. quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt.

Sed cum tempora cibo portionique febris & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire, quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus, fallacissimæ rei; quia sæpe istæ lentiores celerioresque sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerunque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiam incipiente febre, subeunt & quiescunt: ut imbecillus is videri possit, cui facile

cile laturo gravis instat accessio. Contra sæpe eas concitat & resolvit sol, & balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus. adeo ut, cum primum medicus venit, sollicitudo ægri dubitantis, quomodo illi se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam, periti medici est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium: sed primum residere hilari vultu, percunctarique, quemadmodum se habeat; &, si quis ejus metus est, cum probabili sermone lenire; tum deinde ejus carpo manum admoveere. Quas

15 venas autem conspectus medici movet, quam facile mille res turbant! Altera res est, cui credimus, calor, æque fallax. Nam hic quoque excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine.

20 Igitur intueri quidem etiam ista oportet: sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cujus venæ naturaliter ordinatæ sunt, teporque talis est, qualis esse sanis solet: nec

25 protinus etiam sub calore motuque febrem sese concipere: sed ita, si summa quoque arida inæqualiter cutis est; si calor & in fronte est, & ex intimis præcordiis oritur; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit; si color, aut rubore, aut pallore novo

30 mutatus est; si oculi graves, & aut persicci, aut subhumidi sunt; si sudor, cum sit, inæqualis est; si venæ non æquis interval-

lis

lis moventur. Ob quam causam medicus neque in tenebris, neque à capite ægri debet residere; sed illustri loco adversus eum, ut omnes notas, ex vultu quoque cubantis perspiciat.

Ubi vero febris fuit, atque decrevit, spectare oportet, num tempora, partesve corporis aliæ paulum madescant, quæ sudorem venturum esse testentur. Ac si qua ejus nota est, tunc demum dare potui calidam aquam. cujus salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Hujus autem rei causa, continere æger sub veste satis multa manus debet; eademque crura, pedesque contegere. qua mole plerique ægros in ipso impetu febris, potissimeque ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus cœpit, linteum tepescere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non venit, ubi quam maxime tepuit, & idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter ungendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus.

Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximus: utique ex materia quam levissima; maximeque sorbitio. eaque, si magnæ febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte adjicitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, supervacuum est;

est ; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota ; si firmus est stomachus, & compressa alvus, ex aqua mulsa ; si vel ille languet, vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est ; secundo vero aliquid adjici potest, ex eodem tamen genere materiæ, vel olus, 10 vel conchylium, vel pomum. At, dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima, adjiciendum 15 vero aliquid ex media, ratione habita subinde & virium hominis, & morbi.

Apponendi vero ægro varii cibi (sicut Asclepiades præcepit) tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis vires sufficiunt ; ut paulum ex singulis degustando, 20 famen vitet. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus æger est ; ne plus assumat, quam concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius 25 concoqui cibos varios. eduntur quidem facilius : ad concoctionem autem materiæ genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque increscente morbo, tutum est, ægrum cibo impleri ; sed 30 ubi inclinata jam in melius valetudo est.

Sunt aliæ quoque observationes in febribus necessariae. atque id quidem videntum est, quod quidam solum præcipiunt,

an adstrictum corpus sit, an profluat. Quorum alterum strangulat, alterum digerit. Nam, si adstrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, 10 prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaue aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere; uti cibo rarius & serius, tenui, simplici, molli, calido, ex- 15 guo; maximeque oleribus, qualia sunt, lappathum, urtica, malva; vel jure etiam concharum, muscutorumve, aut locustarum: neque danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, 20 & post hunc, & cum hoc, ultra quam sitis coget. Poteritque à balneo etiam pingue jus, aut dulcius dari vinum: poterit semel, aut bis interponi Græcum salsum.

Contra vero, si corpus profluet, sudor 25 coercendus, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, quodocunque volet; utendum; non nisi levi gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subveniendum. Nam, si venter fluit, aut si stomachus non continet, 30 ubi febris decrevit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere; nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus

latus dolet, aut vetus morbus est.

Si vero sudor exercet, duranda cutis est, vel nitro, vel sale; quæ cum oleo miscentur. At, si levius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adjectum.

Quisquis autem fluore æger est, cum
10 venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum ventum est, dari debet his valens, frigidus, siccus, simplex,
15 qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum austerum, vel certe subausterum; & si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusve sunt, frigidum.

20

C A P. VII.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

25 **D**ESIDERAT etiam propriam animadversionem in febribus pestilentie casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est; præcipueque, si cum ardore
30 febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut levata, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam in aliis morbis, ducere in balneum opus est;

est; vinum calidum, & meracius dare, & omnia glutinosa. inter quæ quoque carnem, generis ejusdem. Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat; neque tantum robur ejus est, ut sanguis mitti possit, cucurbitulis ei utendum est; ducenda alvus vel aqua vel pri-
 10 sanæ cremore; tum demum is levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genera morborum, parcius in his agendum est: non facile sanguinem mitte-
 15 re, non facile ducere alvum, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vomitus post febrem eliciendus est: deinde dandus cibus ex levissimis; tum is dormiat: postero die, si febris manet, 20
 abstineat: tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentioniam cibo opportuno, omissis cæteris, nutriatur.

2. *Curatio ardentis febris.*

25

Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est; sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus est. quæ miscenda manu sunt, donec albescant. Etiam amplo conclavi tenendus, quo mul-
 30 tum & purum aerem trahere possit: neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est.

Pos-

Possunt etiam super stomachum imponi, folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus
5 maturius est, id est à die tertio, & ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata jam accessione, vomere cogendus est; & tunc dandum frigidum olus, aut pomum, ex his, quæ sto-
10 macho conveniunt. Si siccus manet stomachus protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem
15 quartum, magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; &, cum jam venter & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam
20 ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida, tantum ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, & collocandus, ut dormiat. Fereque post
25 longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractam calorem, plenus somnus venit; per quem ingens sudor effunditur, idque præsentissimum auxilium est: sed in his tantum, in quibus præter
30 ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor; nihil prohibens, vel in pulmone, vel in faucibus; non ulcus, non defectio, non profluvium alvi fuit. Si quis
autem

autem in huiusmodi febre leniter tussit, is neque vehementi siti conflictari, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

C A P. VIII.

*Curatio semitertianæ febris, quæ
ἡμικρῖταιον dicitur.*

10

AT, ubi id genus tertianæ est, quod ἡμικρῖταιον Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunque frequentiores accessiones decessionesque, ut aliud morbi genus vide- 15
ri possit; porrigiturque febris in horas viginti quatuor, & triginta sex; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quæ vera est; 20
& ubi ea venit, protinus dari. Plurimique subalterutro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibus, qui neque incitet febre, 25
& tamen longum ejus spatium sustineat.

C A P. IX.

Curatio lentarum febrium.

NONNUNQUAM etiam lentæ fe- 30
bres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse

esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam novi motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quod ex oleo & sale salubris videtur.

At, si diu frigus est, & torpor, & jactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris; & major ortus calor simul & priora mala tollit, & spem remissionis, inque ea curationis ostendit.

Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur, interdum contrariis remediis sanant. Siquidem apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petron quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret. Deinde, ubi paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se ægrum judicabat: si non moverat, plus etiam aquæ frigida ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam as-

sam, & vinum homini dabat. Si non liberaverat, decoquebat aquam sale adjecto, eamque bibere cogebat, ut vomendo ventrem purgaret.

Et intra hæc omnis ejus medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant; quam nunc est his, quos Herophili vel Erastistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina; quia plures, si protinus à principiis excepit, interemit. Sed, cum eadem omnibus convenire non possint, fere, quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis, & novare interdum, & augere morbum, & febres accendere; quia curationem, ubi id, quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

C A P. X.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem lingue.

Considerandum etiam est, febresne solæ sint, an alia his quoque mala accedant; id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & id ingerere: deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis,

tis, longitudinemque æquent: ex his in-
 vicem alterum in aceto & rosa habere, al-
 terum in fronte; aut intinctam iisdem la-
 5 nam succidam imponere. Si acetum of-
 fendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa
 lædit, oleo acerbo. Si ista parum juvant,
 teri potest vel iris arida, vel nuces amaræ,
 vel quælibet herba ex refrigerantibus.
 10 Quorum quidlibet ex aceto impositum,
 dolorem minuit; sed magis aliud in alio.
 Juvat etiam panis cum papavere injectus,
 vel cum rosa, cerusa, spumave argenti. Ol-
 facere quoque vel serpillum, vel anethum,
 15 non alienum est.

At, si in præcordiis inflammatio & do-
 lor est, primo superimponenda sunt cata-
 plasmata reprimentia; ne, si calidiora fue-
 rint, plus eo materiæ concurrat. Deinde,
 20 ubi prima inflammatio se remisit, tunc de-
 mum ad calida & humida veniendum est;
 ut ea, quæ remanserunt, discutiant. Notæ
 vero inflammationis sunt quatuor, rubor,
 & tumor, cum calore, & dolore. Quo ma-
 25 gis erravit Erasistratus, qui febrem nullam
 sine hac esse dixit.

Ergo, si sine inflammatione dolor est,
 nihil imponendum est. hunc enim statim
 ipsa febris solvet. At, si neque inflammatio,
 30 neque febris, sed tantum præcordiorum
 dolor est; protinus calidis & siccis fomen-
 tis uti licet. Si vero lingua sicca est, &
 scabra, detergenda primum penicillo est

ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non finit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa est, ungi rosa debet, cui ceræ sit paulum adjectum.

C A P. XI.

Remedia contra frigus, quod febrem præcedit. 10

SOLET etiam ante febres esse frigus; idque vel molestissimum morbi genus est. Ubi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc enim paulo ante 15 data, multum malo adjicit. Item maturius veste multa tegendus est. Admovenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta: sic, ut ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim in- 20 crescant. Perfricandæ quoque eæ partes manibus unctis ex vetere oleo sunt, eique adjiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum 25 febrium remissionibus nonnulli tres quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum manente febre, dant. deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido & levi. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum 30 cibis, semel & post febrem datus, prodest.

Sed curiose prospiciendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque

quoque genere valetudinis jam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quæ etiam immoratur, & jactationem, fervoremque corporis, quem *ζέσιν* Græci vocant, minuit. Illud satis convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum: si impares, post graviores, cibum; post leviores, aquam nullam.

C A P. XII.

Curatio horroris in febribus.

15 **H**ORROR autem eas fere febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur; ideoq; tutissimæ sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alvi ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim, quando febris ventura sit. Ita fieri potest, ut, si subito venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilii causa fuit inventum. Nihilque aliud fieri
25 potest, quam ut primis diebus bene abstinere æger: deinde, sub decessu febris ejus, quæ gravissima est, cibumumat.

• At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur; quia facilius proponere
30 nobis & accessionum & decessionum vires possumus. In his autem, cum veteraverunt, utilis fames non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est: dein-

de dividenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam 5 subsalsam, & vomere eum cogere. nam fere talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æque accessit. sæpe enim sic discutitur. Jamque, 10 quod genus febris sit, scire licet.

Itaque sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera est, ut per tempus horrores in solio sit. Si ibi 15 quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat: siquidem eo quoque modo sæpe is discutitur. Si nec balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam 20 aquam cum pipere: siquidem ea quoque assumpta calorem movent; qui horrorem non admittit. Deinde eodem modo, quo in frigore præceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur. fomentisque pro- 25 tinus calidioribus totum corpus circumdare convenit, maximeque involutis extinctis testis & titionibus.

Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta per- 30 fundatur; cui æque ex calefacientibus aliquid sit adjectum: adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit, maximeque

in

in manibus & pedibus: & spiritum ipse contineat. Neque desistendum est, etiam si horror redit. sæpe enim pertinacia iuvantis malum corporis vincit.

Si quid evomit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est; utendumque eisdem est, donec horror finiatur. Sed præter hæc ducenda alvus est, si tardius
10 horror quiescet: siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima post hæc auxilia sunt, gestatio & ambulatio. Cibus autem in ejusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum præstet, ac caro glutinosa. Vinum cum dabitur, austerum sit.
15

C A P. XIII.

Curatio quotidiana febris.

Hæc ad omnes circuitus februm pertinent: discernendæ tamen singulæ sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibus, altero quoque die uti. Si res inveteraverit,
20 post febrem experiri balneum, & vinum; magisque, si, horrore sublato, hæc superest.
25

C A P. XIV.

Curatio tertianæ febris.

Si vero tertiana, quæ ex toto intermit-
tit, aut quartana est; mediis diebus, & ambulationibus uti oportet, aliisque
30 exercitationibus, & unctionibus. Quidam

ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod, 5 quamvis pleraque ejus viri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterit. est enim anceps.

Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit alvum duci oportere: 10 quinto, post horrorem vomitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc calidis dare cibum & vinum: sexto die, in lectulo detineri. sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri 15 posse, verisimile est. Tutius tamen est, hoc ipso ordine tria remedia, vomitus, alvi ductio, vini potus, per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare: nec vinum, nisi post accessionem, die se- 20 ptimo bibere.

Si vero primis diebus discussus morbus non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur: tum cibo 25 assumpto, bibat aquam; postero die, quo à cibo vacat, & ab exercitatione unctioneque, aqua tantum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, & post febrem vinum; & 30 medio die paulum cibi debebit assumere.

C A P. XV.

Curatio quartanæ febris.

E ADEM in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur, si cui cum horrore
10 febris accessit, eaque desit, eodem die & postero tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem: quarto
15 die, si cum horrore febris revertitur, vomere; sicut ante præceptum est: deinde post febrem, modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioque die abstinere; aqua tantummodo calida, si sitis est, assumpta. Septimo die balneo frigus prævenire, abstinere, continere se debet,
20 & aqua tantummodo calida, si sitis est, uti: ac tum ita nono die balneo frigus prævenire, & si febris redierit, ducere alvum; ubi ex
25 eo corpus conquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & vino biduo proximo se abstinere; frictione servata. Decimo tertio die rursus balneum experiri; & si postea fe-
30bris accessit, æque perfricari, vinum copiosius bibere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum, & abstinencia cum cæteris, quæ præcipiuntur, febrem tollant.

Si vero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus; idque agendum, ut, quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam alvum, deinde abstinendum in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit; tamen etiam febre liberatus vix refectiōni valebit, adeo, si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur, si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit; nisi interdum jam horrore discusso. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, & vehementer perfricari; cibum & validum, & fortiter assumere; vino uti, quanto libebit: postero die, cum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter; cibum accipere sine vino: tertio die abstinere.

Quo die vero febrem expectabit, ante surgere, & exerceri, dareque operam oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic enim sæpe illa discutitur. At, si in opere occupavit, tum deum se recipere. In ejusmodi valetudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est.

Sed hæc facile validiores faciunt: sin im-
becilli-

becillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. Si hæc quoque vehemens onerat, intra quietem, & unctionem, & cibum consistendum est; dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem jugulat: sed, si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. quod tamen, nisi culpa vel ægri vel curantis, nunquam fit.

C A P. XVY.

Curatio duarum quartanarum.

15 **A**t, si duæ quartanæ sunt, neque, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare, hinc considerare, diligenter involutis pedibus & capite: Quoties febris accessit & desit, cibum modicum sumere, & vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. At, si duæ febres pene junguntur, post utramque cibum sumere: deinde
25 vacuo tempore, & moveri aliquantum, & post unctionem cibo uti. Cum vero vetus quartana raro, nisi vere, solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque
30 in vetere quartana, mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acribus ad lenes transire: esse radicem, deinde

vomere: jureve pulli gallinacei ventrem
 resolvere: oleo ad frictiones adjicere cale-
 facientia: ante accessionem sorbere, vel
 aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum 5
 tribus Græci vini falsi, vel mista paribus
 portionibus; & in aqua diluta, piper, ca-
 storeum, laser, myrrham. Per hæc enim
 familiaque corpus agitandum est, ut mo-
 veatur ex eo statu, quo detinetur. 10

Si febris quievit, diu meminisse ejus
 diei convenit: coque vitare frigus, calo-
 rem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim
 revertitur, nisi à sano quoque aliquandiu
 timetur. 15

CAP. XVII.

*Curatio quotidiana febris, quæ ex
 quartana facta sit.*

AT, si ex quartana, quotidiana facta
 est: cum id initio inciderit, per bi- 20
 duum abstinere oportet, vespere fri-
 ctione uti, & aquam tantummodo potui
 dare. tertio die sæpe fit, ne febris accedat.
 Sed siue fuit, siue non fuit, cibus post ac-
 cessionis tempus est dandus: & si manet, per 25
 biduum abstinencia, quanta maxima im-
 perari corpori potest; & fricatione quoti-
 die utendum est.

CAP. XVIII.

*De tribus insania generibus: & primo de ejus 30
 curatione, quæ à Græcis optima dicitur.*

ET febrium quidem curatio exposita
 est. Supersunt vero alii corporis affe-
 ctus,

ctus, qui huic superveniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari possunt, protinus jungam. Incipiam ab insania. 5 primamque hujus ipsius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre est. Græci *ῥῆτις* appellant.

Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros delipere, & loqui 10 aliena. Quod non quidem leve est; neque incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen æque pestiferum est. nam plerunque breve esse consuevit; levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. 15 Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre præceptum est.

Phrenitis vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit; aut cum 20 æger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus autem plura genera sunt: siquidem ex phreniticis alii hilares, alii tristes sunt: alii 25 facilius continentur, & intra verba desipiunt; alii insurgunt, & violenter quædam manu faciunt: atque ex his ipsis, alii nihil nisi impetu peccant, alii etiam artes adhibent; summamque speciem sanitatis in ca- 30 ptandis malorum operum occasionibus præbent; sed exitu deprehenduntur.

Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu peccant, onerare

onerare asperioribus coercionibus supervacuum est. Eos vero, qui violentius se gerunt, vincire convenit; ne vel sibi vel alteri noceant. Neque credendum est, si vincētus aliquis, dum levare vinculis cupit, sanum jam se fingat; quamvis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est.

Fere vero antiqui tales ægros in tenebris habebant; eo quod illis contrarium esset, exterreri; & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant. At Asclepiades, tanquam ipsis tenebris terrentibus, in lumine habendos eos dixit. Neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est, utrumque experiri; & habere eum, qui tenebras horret, in luce; eum, qui lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger, si vires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est.

Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est. simul enim febris quoque increscit. Tum itaque nihil nisi continendus æger est. Ubi vero res patitur, festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur. hanc rationem secutus, quod neque insania esset, nisi cum febre

febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur. Ipse in his somnum multa frictione quæsiuit. Sed cum
 5 & intentio febris somnum impediat; & frictio non, nisi in remissione ejus, utilis sit: hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt, alias omittenda. Et continua quoque febris habet tempora, quibus, etsi non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, ut non optimum, sic satis tamen secundum remediis tempus. Quod si vires ægri patiuntur, sanguis quoque mit-
 10 ti debet.

Nec minus dubitari potest, an alvus ducenda sit. Tum, interposito die, convenit caput ad cutem tondere: deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint
 20 ex reprimentibus: aut prius fovere, deinde tondere, & iterum fovere: ac novissime rosa caput naresque implere; offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, & movere sternutamenta medicamentis ad id
 25 efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non desunt. Si vero imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madefaciendum est. Utiles etiam in quibuscumque viribus
 30 herbæ duæ sunt, solanum & muralis, si simul ex utraque, succo expresso, caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est: parcius tamen in his, qui nimis

mis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt: sicut in homine prædivite famem timente incidit; cui subinde falsæ hæreditates nunciabantur. Quorundam audacia coercenda est: si-
 10 ent in his fit, in quibus continentis plagæ quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestivus risus objurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes: ad quod sym-
 15 phonix, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quam repugnandum est: paulatimque, & non evidenter, ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens abducenda. Interdum etiam
 20 elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim advertere animum incipiunt. Quin
 25 etiam recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocaverunt.

Omniis vero sic affectis somnus &
 30 difficilis, & præcipue necessarius est. sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam,

dam, crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliuntur potui dando
5 aquam, in qua papaver aut hyoscyamus decocta sint: alii mandragoræ mala pulvino subjiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lachrymiam fronti inducunt. Hoc nomen apud Medicos reperio. Sed cur
10 Græci morum *συνάμεινον* appellant, cum mori nulla lachryma sit? Sic vero significatur lachryma arboris in Ægypto nascentis, quam ibi *συνέμορον* appellant. Plurimi decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua
15 cum spongia os & caput subinde foveant.

Asclepiades ea supervacua esse dixit: quoniam in lethargum sæpe convertunt. Præcepit autem, ut primo die, à cibo, portione, somno abstineretur: vespere ei daretur
20 potui aqua: tum frictio admoveretur lenis, ita ut ne manum quidem, qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio & aqua, rursusque frictio
25 adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut, illo consistente, nimia fricatio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum
30 illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est; ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possimus.

Con-

Confert etiam aliquid ad somnum filanus juxta cadens; vel gestatio post cibum, & noctu; maximeque lecti suspensi motus.

Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam admove. quæ quia levat morbum, potest somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhienda est: nam neque 10 æger est implendus, ne insaniat: neque jejuno utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitione, & potione aquæ mulsæ; cujus ternos 15 cyathos hieme, æstate vero quatuor dedisse satis est.

Alterum genus insanix est, quod spatium longius recipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat: & 20 consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda, per album veratrum vomitumque purgatio: post utrumlibet, 25 adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio; in jejuno vomitus; cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, etiam ex infirmissima dari posse, 30 dum ne ea sola quis utatur: valentissimam tantummodo esse removendam. Præter hæc, servanda alvus est quam tenerrima: remo-

removendi terrores, & potius bona spes
 afferenda: quærenda delectatio ex fabulis,
 ludisque, quibus maxime capi sanus assue-
 5 verat: laudanda, si qua sunt, ipsius opera,
 & ante oculos ejus ponenda: leviter objur-
 ganda vana tristitia: subinde admonendus,
 in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non
 potius lætitiæ, quam sollicitudinis causa sit.
 10 Si febris quoque accessit, sicut aliæ febres
 curanda est.

Tertium insanix genus est ex his lon-
 gissimum; adeo: vitam ipsam non impe-
 diat. quod robusti corporis esse consuevit.
 15 Hujus autem species duæ sunt. Nam qui-
 dam imaginibus, non mente fallunt; qua-
 lem insanientem Ajacem vel Orestem poe-
 tarum fabulæ ferunt: quidam animo desi-
 piunt. Si imagines fallunt, ante omnia vi-
 20 dendum est, tristes, an hilares sint. In tri-
 stitia, nigrum veratrum dejectionis causa;
 in hilaritate, album, ad vomitum excitand-
 um, dari debet. Idque, si in potione non
 accipit, pani adjiciendum est, quo facilius
 25 fallat. Nam, si bene se purgaverit, ex ma-
 gna parte morbum levabit. Ergo etiam, si
 semel datum veratrum parum profecerit,
 interposito tempore iterum dari debet. Ne-
 que ignorare oportet, leviolem esse mor-
 30 bum cum risu, quam serio insanientium.
 Illud quoque perpetuum est in omnibus
 morbis, ubi ab inferiore parte purgandus
 aliquis est, ventrem ejus ante solvendum
 esse:

esse: ubi à superiore, comprimendum.

Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi perperam aliquid dicit, aut facit; fame, & vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare, quid faciat. Subito etiam terreri, & expavescere, in hoc morbo prodest; & fere, quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens, in quo fuerat, abducta est. Interest etiam, si ipse sine causa subinde rideat, an mœstus demissusque sit. Nam dementis hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi, melius curatur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio: item super caput aqua frigida infusa, demissumque corpus in aquam & oleum. 10

Illa communia sunt: insanientes vehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque vinum assumere; cibis uti post purgationem, ex media materia, quam levissimis, non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant; mutare debere regiones, &, si mens redit, annua peregrinatione esse jactandos. 15 30

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium, specie simile, similique victus gene-

re curandum est: præterquam quod in hoc infanxiæ genere solo recte vinum datur.

C A P. X I X.

De Cardiacis

HIS morbis præcipue contrarium est id genus, quod *καρδιακόν* à Græcis nominatur; quamvis sæpe ad eum
10 phrenitici transeunt: siquidem mens in illis laborat, in hoc vero constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis; quod, stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque pro-
15 tinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore, ex toto thorace, & cervicibus, atque etiam ex capite prorumpit, pedibus tantummo-
20 do, & cruribus siccioribus, atque frigidis. Acuti id morbi genus est.

Curatio prima est, supra præcordia imponere, quæ reprimunt, cataplasmata: secunda, sudorem cohibere. Id præstat acer-
25 bum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrteum. Quorum aliquo corpus leniter perungendum: ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est.

Si sudor vincit, delinendus homo est
30 vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel subinde horum pulvere respergendus. Idem præstat pulvis ex contritis aridæ myrti vel rubi foliis, aut ex austeri
&

& boni vini arida fece. Pluraque similia sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via pulvis injectus. Super hæc vero, quo minus corpus insudet, levi veste debet esse contactus, positusque loco non calido, fenestris patentibus, sic ut perflatus quoque aliquis accedat.

Tertium auxilium est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succurrere. Cibus 10 non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est; ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum 15 est, ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde & liberaliter dandum est; adjecta polenta, si modo is ægrum parum cibi assumit. Idque vinum 20 esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte, duas vel tres heminas æger bibet; si vastius corpus est, plus etiam. si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida 25 convenit, & tum dare.

Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum sponte vomere oportet; rursusque post vomitum cibum sumere: Si ne is quidem man- 30 serit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora, sumere iterum. Si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis

bis contritis superillinendum est. qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor venisque vis redeat.

Ultimum auxilium est, in alvum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admoveere, quod reficiat: ut est
 10 rosa & vinum: & si qua in extremis partibus frigent, unctis & calidis manibus fovere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur,
 15 tur, incipit jam tempus ipsum esse præsidio. Ubi esse in tuto videtur, verendum tamen est, ut ne in eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere.
 20 re, donec satis virium corpori redeat.

C A P. XX.

De Lethargicis.

ALTER quoque morbus est, aliter
 25 phrenitico contrarius. In eo difficilior somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: in hoc marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas. *ληθαργία* Græci nominarunt. Id quoque
 30 genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter jugulat.

Proinde ex eo ægros quidam excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta

CVO-

evocantur, & his, quæ odore foedo movent, qualis est pix usta, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut cornu cervinum: si non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odore foedo movent.

Tharrias vero quidam, accessionis esse id malum, dixit, levarique, cum ea decessit. 10 Itaque eos, qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest autem, in decessione expergiscatur æger, an, cum febris levatur, aut, levata quoque ea, somnus urgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei, ut sopito, su- 15 pervacuum est. neque enim vigilando melior fit; sed per se, si melior est, vigilat. Si vero continens ei somnus est, utique excitandus est; sed his temporibus, quibus febris levissima est, ut excernat 20 aliquid, &umat. Excitat autem validissime repente aqua frigida superinfusa. Post remissionem itaque, perunctum oleo multo totum corpus, tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum 25 est. Sed hoc utemur, si æqualis ægro spiritus erit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et, quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. 30

Medendi autem causa, caput radendum; deinde posca fovendum est, in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altera vero die imponendum

nendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccæ, aut hedera cum rosa & aceto. Præcipueque proficit, & ad
 5 excitandum hominem, naribus admotum; & ad morbum ipsum depellendum, capiti frontive impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest: maximeque
 10 oportune cibus datus, id est, in remissione, quanta maxima inveniri poterit. Apertissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat. Si autem quotidie gravis accessio est, hæc quotidie detur: si alternis, post gravio-
 15 rem, multa aqua. Vinum quoque cum tempestivo cibo datum non mediocriter adjuvat.

Quod si post longas febres ejusmodi torpor accessit, cætera eadem servanda
 20 sunt. Ante accessionem autem, tribus quatuorve horis, si venter astrictus est, dandum est castoreum cum scammonia; si non est, per se ipsum castoreum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibus
 25 utendum est plenioribus: si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum; imponendumque præcordiis, quod simul & reprimat & emolliat.

30 CAP. XXI.

De Hydropicis.

SED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos
 H aqua

aqua inter cutem male habet. nisi enim primis diebus succurritur, in ὄδωπα, quam Græci vocant, incidunt. Ejus tres species sunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus, ex motu spiritus, sonus est: modo corpus inæquale est; tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur; & moto corpore, ita movetur, ut impetus ejus conspici possit. Primū, συμπανίτην: secundum, λωκοφλεγματίαν, vel ὑπὸ τῷ σάρκα; tertium, ἀσκήτην Græci nominarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidem in his ægris facile sanescunt. Sæpe vero hoc malum per se incipit: sæpe alteri vetusto morbo, maximeque quartanæ, supervenit.

Facilius in servis, quam in liberis tollitur. quia, cum desideret famem, sitim, & mille alia tædia, longamque patientiam, promptius iis succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chrysipi discipulus, apud Antigonus regem, amicum quendam ejus, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur; respondit, illum ad

ad morbum ægri respicere; se, ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium sese præcipitavit.

Inter initia tamen, non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inveteravit, non sine magna mole discutitur. Metrodorum tamen, Epicuri discipulum, referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque æquo animo necessariam sitim sustineret, ubi diu abstinerat, solitum bibere, deinde evomere. Quod, si redditur, quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. ideoque in quolibet tentandum non est.

Sed si febris quoque est, hæc in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent.

Atque hic quoque, quæcumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquando, & superiores maxime partes sic perfricandæ, ut calorem incutem evocet: inter quæ, spiritum ipse contineat. Evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibus

que aliis: maximeque utiles sunt naturales, & siccæ sudationes; quales super Batas habemus in myrtetis. Balneum, atque omnis humor alienus est. Jejuno recte capotia dantur, facta ex duabus apsinthii, myrrhæ tertia parte.

Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quæ urinam movet. Alvum moliri cibo melius est, quam medicamento. Si tamen res coget, ex his aliquid, quæ id præstant, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cinnamomum, cassia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, ænanthe, panaces, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, quam *supida ægelas* Græci nominant, abrotanum, rosæ folia, acorum, amaræ unces, tragoriganum, styrax, costum, junci quadrati & rotundi flos; illum *κρόττον*, hunc *σχοῖνον* Græci vocant. quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed, quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen, quæ lentissima ex his sunt, id est, rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est austerum, sed quam tenuissimum.

Commodum est etiam, lino quotidie ventrem metiri, &, qua comprehendit alvum,

vum, notam imponere: postero quoque die videre, plenius corpus sit, an extenuetur. id enim, quod extenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est, metiri & portionem ejus, & urinam. nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydro-
10 pa deciderat, se abstinencia bidui, & fricatione usum; tertio die, jam & febre, & aqua liberato, cibum, & vinum dedisse, memoriæ prodidit. Hactenus communiter de omni specie præcipi potest: si ve-
15 hementius malum est, diducenda ratio curandi est.

Ergo, si inflatio, & ex ea dolor creber est, utilis quotidianus, aut altero quoque die post cibum, vomitus est. Fomentis de-
20 inde ficcis calidisque utendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulæ. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his utendum. Ultimum auxilium est,
25 si cucurbitulæ nihil profuerunt, per alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere. Quinetiam quotidie ter quaterve opus est uti fricatione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus.
30 Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum vero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat; ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulce-

randius est, & servanda ulcera diutius. Utiliter etiam scilla cocta deligatur super cutim. Sed diu post has inflationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. 5

At, si id vitium est, cui *λδκςφλεγματία* nomen est, eas partes, quæ tument, subjicere soli oportet; sed non nimium, ne febriculam incendat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumque fricatione, 10 madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adjectum; sic, ut aut pueriles aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem, 15 tota hora; post meridiem, semihora fieri oportet. Utilia sunt etiam cataplasmata, quæ reprimunt; maximeque, si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque super talum, quatuor fere digitis, ex parte in- 20 teriore est; quo per aliquot dies frequens humor feratur: atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet: concutiendumq; corpus est multa gestatione, atque, ubi inductæ vñlneribus cicatrices sunt, adjicien- 25 dum exercitationibus & cibis, donec corpus ad pristinum statum revertatur. Cibus valens esse debet, & glutinosus, maximeque caro. Vinum, si per stomachum licet, dulcius. sed ita, ut invicem biduo tri- 30 duove, modo aqua, modo id bibatur. Prodest etiam lactucæ marinæ, quæ grandis juxta mare nascitur, semen, cum aqua potui

potui datum. Quod si valens est, qui id accipit, ei scilla cocta simul super ventrem deligatur. Authoresque multi sunt, inflatis vesicis pulsandos tumores esse.

Si verò id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modice oportet; malagma, quod digerat, impositum habere; idque ipsum
10 superimposito triplici panno, fascia, non nimium tamen vehementer, astringere. quod à Tharria profectum, servatum esse à pluribus video Si jecur, aut lienem affectum esse, manifestum est, sicum pinguem
15 contusam, adjecto melle, superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed humor nihilominus abundat, celeriori via succurrere, ut is per ventrem ipsum emit-
tatur. Neque ignoro, Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. morbum enim
20 hunc jocineris putavit: ideoque illud esse sanandum; frustra que aquam emitti, quæ vitiato illo, subinde renascatur. Sed primum, non hujus visceris unius hoc vitium
25 est. Nam, & splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit. Deinde, ut inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi substitit, & jocinori, & cæteris interioribus partibus nocet. Conve-
30 nitque, corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor, sed medicinæ locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in contro-

versiam venit, quin non omnes in hoc morbo sic curari possint; sed juvenes robusti, qui vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile huc deciderunt, quique malum corporis habitum habent, idonei huic curationi non sunt. Cibus autem, quo die primum humor emissus est, superva- 10 cuus est, nisi si vires desunt. In sequentibus diebus, & his vinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque revocandus æger est ad exercitationes, fricationes, solem, sudationes, fati- 15 gationes, & idoneos cibos, donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat; & frequentiore in jejuno vomitum. Si æstas est, in mari natare commodum est. Ubi convaluit aliquis, diu tamen alienus ei ve- 20 neris usus sit.

C A P. XXII.

De Tabæ, & ejus speciebus.

DIUTIUS sæpe & periculosius tabes 25 eos male habet, quos invasit. Atque hujus quoque plures species sunt. Una est, qua corpus non alitur, &, naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa 30 macies oritur; &, nisi occurritur, tollit. *ἀρεφία* hanc Græci nominant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. Aut enim
nimio

nimio timore aliquis minus, aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit: ita vel, quod deest, infirmat: vel, quod superat, corrumpitur.

Altera species est, quam Græci *καχexia* appellant: ubi malus corporis habitus est; ideoque omnia alimenta corrumpuntur.

Quod fere fit, cum longo morbo vitiata corpora, etiamsi illo vacant, refectionem tamen non accipiunt; aut cum malis medicamentis corpus affectum est; aut, cum diu necessaria defuerunt; aut, cum inusitados & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve simile incidit. Huic, præter tabem, illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant.

Tertia est, longeque periculosissima species, quam Græci *φθίσις* nominaverunt. Oritur fere à capite: inde in pulmonem distillat. Ex hoc exulceratio accidit, & febricula lenis fit; quæ etiam, cum quievit, tamen repetit. In ea quoque frequens tussis est, & pus excreatur; interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaque, qui de morbo dubitant, hac nota utuntur.

Cum hæc genera tabis sint, animadvertere primū oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantum non ali corpus apparet, causam ejus attendere; &, si cibi minus

assumfit aliquis quam debuit, adjicere oportet: sed paulatim, ne si corpus insuetum subita multitudo oneraverit, stomachus gravetur, & concoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere solitus est, abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perveniat. Præter hæc convenit ambulare locis quam maxime frigidis, sole vitato: per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum, sic ut interdum oleo quædam adjiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque jejuno prehendere per multas partes cutem, & atrahere, ut relaxetur; aut, imposita resina, & abducta, subinde idem facere. Utile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex his, qui facile concoquuntur, maximeque alunt. Ergo vini quoque, sed austeri, necessarius usus est, movendæ urinæ.

At si malus habitus corporis est, primum abstinendum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unctionibus, fricationibus. Utinam his frequens balneum est, sed jejunis; etiam usque ad sudorem. Cibi vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam.

etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo ut cætera quoque eodem modo servantur.

Quod si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est. neque facile enim hic morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cœli mutatione sic, ut densius quam id est, ex quo discedit æger, petatur. Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oriatur, id est ab anno duodevigesimo usque ad annum quintum & trigesium. Si id imbecillitas non finit, nave tamen, sed non longe, vectari commodissimum est. Sin navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus movendum est: tum à negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt: somno indulgendum: cavendæ distillationes, ne, si quid cura levavit, exasperent; & ob id vitanda cruditas, simulque & sol, & frigus: os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remediis finienda: &, quamdiu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinencia, interdum etiam tempestivis cibis medendum: eoque tempore bibenda aqua.

Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia siti, ac, siue præcordia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est; in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis, recte dari potest.

Quod si febris aut nondum incurfat, aut jam remisit, decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes, item lenes fricationes. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, lactuca: i 5
deinde lenis sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adjecto. Oryza quoque, & si nihil aliud est, far idem præstat. Tum invicem modo his cibis, modo illis utendum est: adjiciendaque quædam 20
ex media materia, præcipue vero ex prima, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet leve austerum. 25

Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus aparet, validioribus auxiliis opus est. 30
Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque; item sub imis ossibus scapu-

scapularum, quas ὤμων πλάτας Græci vocant, sic, ne sanescere sinas ulcera, nisi tussis finita fuerit. cui per se quoque mendendum esse, manifestum est Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes perfricandæ sunt: thorax leni manu pertractandus: post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaque. In-
10 terpositis denis diebus, demittendus æger in solium est, in quo sit aqua calida & oleum. Cæteris diebus bibenda aqua: tum vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum: si vero est, egelidum. Utile est
15 etiam in remissionibus quotidie cibos dari: frictiones gestationesq; similiter adhiberi: quarto, aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel
20 plantaginis succus per se, vel marrubii, si cum melle sit incoctus; ita ut illius cyathus sorbeat, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mista, & incocta resinæ terebinthinæ pars dimidia,
25 butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & navis, & sorbitio. Alvus cita utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo frequens, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, adjicere
30 debet exercitationes, fricationes, cibos: deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere a vino, balneo, venere.

CAP. XXIII.

De Comitiali morbo.

INTER notissimos morbos est etiam is, qui comitalis, vel major nominatur.

Homo subito concidit, ex ore spumæ moventur, deinde interpolito tempore ad se redit, & per seipsum confurgit. Id genus sæpius viros, quam fœminas occupat; 10 ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens est, hominem consumit; & sæpe eum, si remedia non sustulerunt, in pueris veneris, in puellis men- 15 struorum initium tollit. Modo cum distentione membrorum aut nervorum prolabitur aliquis; modo sine illa.

Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur. quod admo- 20 dum supervacuum est: & quia ne lethargicus quidem his sanatur; & quia, cum possit ille nunquam expergisci atque ita fame interire, hic ad se utique revertitur.

Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum 25 distentio accessit, utique sanguis mitti debet: si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem est, ducere alvum, vel nigro veratro purgare, vel utrumque facere, si vires 30 patiuntur. tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere; cibum post diem tertium, simul ac transiit hora, qua concidit, dare.

dare. Neq; sorbitiones his aut alioqui molles, & faciles cibi; neque caro, minimeque suilla convenit; sed mediæ materiæ. nam
5 & viribus opus est, & cruditates cavendæ sunt. Cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrentium,
10 vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia. &, ubi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & invicem alterum quemque; eadem hora cibi servata, donec quatuordecim dies transeant. Quos
15 ubi morbus excessit, acuti vim deposuit: at si manet, curandus jam ut longus est.

Quod si non, quo die primum is incidit, medicus accessit; sed is, qui cadere consuevit, post ei traditus est; protinus eo genere
20 victus habito, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolabatur; utendumque tum vel sanguinis missione, vel ductione alvi, vel nigro veratro, sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus,
25 per eos cibos, quos proposui, vitatis omnibus, quæ cavenda dixi, nutriendus est.

Si per hæc morbus finitus non fuerit; confugiendum erit ad album veratrum; ac ter quoque aut quater eo utendum, non ita
30 multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendæ; quibusdam, præter ea, quæ supra
scripta

scripta sunt, adjectis. Ubi mane experrectus est, corpus ejus leniter ex oleo vetere (cum capite, excepto ventre) permulceatur: tum ambulatione quam maxime longa, & recta utatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde super caput multa aqua frigida perfundatur; paulum cibi assumat; conquiescat; rursus ante noctem ambulatione utatur; iterum vehementer perfricetur, sic ut neque venter, neque caput contingatur: post hæc cœnet, interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno aut altero acria assumat.

Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur; ungatur oleo vetere, adjecto aceto & nitro; perfundatur aqua salsa; bibat jejunus ex aqua castoreum; nulla aqua, nisi decocta, potitionis causa utatur. Quidam jugulati gladiatoris calido sanguine potu tali morbose liberarunt. Apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicinam vero pertinet, ultimum est, juxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere, & cucurbitulas admove: ferro candente in occipitio quoque & infra, qua summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor evadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut per-

perpetuum sit. Ad levandum id, tantummodo utendum erit exercitatione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt: præcipueque vitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

C A P. X X I V.

De Regio morbo.

10 **Æ**QUE notus est morbus, quem interdum arquatam, interdum regium nominant. Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante ægro supervenit, tutum esse, mollibus tantummodo præcordiis substantibus. Dio-
15 cles ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse; si post hunc febris, occidere. Color autem cum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus, quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere & sitis,
20 & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities; & ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio: atque,
25 ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit.

Primo die abstinere ægrum oportet: secundo ducere alvum: tum, si febris est, eam victus genere discutere: si non est,
30 scamnoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua malsa nuces amaras, apsinthium, anisum, sic, ut pars hujus minima sit. Asclepiades
aquam

aquam quoque falsam, & quidem per biduum, purgationis causa bibere cogebat, iis, quæ urinam movent, rejectis. Quidam, superioribus omissis, per hæc, & per eos cibos, qui extenuant, idē se consequi dicunt.

Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere Græcum falsum, ut solutio ventris remaneat: tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere; deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satietur; omisso Græco vino bibere nigrum austerum; atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione, &, si hiems est, balneo; si æstas, frigidis natationibus: lecto etiam, & conclavi cultiore, usu, loco, ludis, lascivia, aliis, per quæ mens exilaretur. ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super præcordia datum prodest; vel arida ibi ficus imposita, si jecur aut lienis affectus est.

C A P. X X V.

De Elephantia.

30

IGNOTUS autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus

morbis est, quem *ιλιφαγγιασις* Græci vocant; isque longis annumeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque
5 vitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque,
10 quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur; febricula oritur, quæ facile tot malis
15 obrutum hominem consumit.

Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet; aut nigro veratro venter solvi. Adhibenda triduum, quanta sustinere potest, inedia est: paulum dein-
20 de vires reficiendæ, & ducenda alvus: post hæc, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, præcipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam ficcis sudationibus evocandus: fri-
25 catio adhibenda: moderandumque inter hæc, ut vires conserventur: balneum rarum esse debet: cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine insantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus
30 contrita plantago & illita optime tueri videtur.

A TTONITOS quoque raro videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo, hunc *ἀπώλησις* Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum adhibendæ fricationes; & ex media materia minime pingues cibi; quidam etiam acres: & à vino abstinendum.

A T resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres authores illud *ἀπώλησις*; hoc *παράλυσις* nominaverunt. nunc utrumque *παράλυσις* appellari video. Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi. ac si correpti non sunt, diutius quidem vivunt; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt; & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus vero nonnunquam acutus, sæpe longus, fere insanibilis morbus est.

Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam

quam sanitatem restituit ; sæpe mortem tantum differt ; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem , si non redit & motus & mens , nihil spei superest : si redit , sanitas quoque prospicitur ,

At, ubi pars resoluta est , pro vi & malo corporis , vel sanguis mittendus est , vel alvus ducenda. Cætera eadem in utroque
 10 casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue convenit frigus ; paulatimque ad exercitationes revertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet , vel gestetur ,
 15 vel motu lecti concutiat : tum id membrum, quod deficit, si potest, per se ; sin minus , per alium moveatur , & vi quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, vel urticis cæsam, vel imposito sinapi, sic , ut ubi rubere cœperit corpus , hæc removeantur. Scilla quoque contrita, bul-
 20 bique contriti cum thure recte imponuntur. Neque alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere ; pluribus
 25 etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulas admoveere. Uctioni vero aptissimum est vetus oleum , vel nitrum aceto & oleo admixtum. Quinetiam fovere aqua calida
 30 marina ; vel, si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. Ac , si quo loco vel naturales , vel etiam manufactæ tales natationes sunt , iis potissimum utendum est ;

est; præcipueque in his agitata membra, quæ maxime deficiunt. si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex venatione: potio sine vino, aquæ calidæ. Si tamen vetus morbus est, interponi quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcum falsum potest. Post cœnam utilis vomitus est.

10

2. *De Dolorē nervorum.*

Interdum vero etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non vomere, non medicamentis urinam movere, non exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est: deinde, retento spiritu, in ipsa exercitatione potius superiores partes movendæ: balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus cœlum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est; deinde involvenda, & subjicienda pruna lenis, & sulphur; atque ita id suffumigandum; idque aliquandiu faciendum, sed jejuno, cum bene jam concoxerit. Cucurbitulæ quoque sæpe dolenti parti admovendæ sunt, pulsandusque leniter inflatis vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam sebum miscere cum cumini & urticæ contritis seminibus, sic, ut omnimodum par modus sit, idque imponere: fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi

20

25

30

culi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum. Atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione vehementi est. quod in aliis doloribus pessimum est.

3. *De Tremore nervorum.*

Tremor autem nervorum æque vomitu medicamentisque urinam moventibus in-
10 tenditur. Inimica etiam habet balnea, affas-
que sudationes. Bibenda aqua est: acri am-
bulatione utendum, item unctionibus, fri-
cationibusque, maxime per seipsum: pila,
similibusque superiores partes dimovendæ:
15 cibo quolibet utendum, dummodo con-
coctioni utique studeatur. Secundum ci-
bum, curis abstinendum: rarissima venere
utendum est. Si quando quis in eam pro-
lapsus est, tum oleo leniter diuque in le-
20 ctulo perfricari manibus puerilibus potius,
quam virilibus, debet.

4. *De Suppurationibus internis.*

Suppurationes autem, quæ in aliqua in-
teriori parte oriuntur, ubi ortæ fuerint,
25 primum id agere oportet per ea catapla-
smata, quæ reprimunt, ne coitus inutilis
materiæ fiat. deinde, si hæc victa sunt, ut
per ea malignata, quæ digerunt, dissipe-
tur. Quod si consecuti non sumus: sequi-
30 tur, ut evocetur: deinde, ut maturescat.
omnis tum vomicæ finis est, ut rumpatur.
Indiciumque est, pus vel alvo vel ore red-
ditum. Sed nihil facere oportet, quominus,
quic-

quicquid est puris, exeat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Ubi pus ferre desiit, transeundum, ad faciles quidem, sed tamen validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam; sic ut ab egelidis tamen initium fiat. primoq; cum melle quædam edenda, ut nuclei pinci, vel Græcæ nuces, vel avellanæ. Postea submovendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus vel porri vel marrubii & omni cibo porrum ipsum adjectum. Oportebit autem, uti in his partibus, quæ non afficiuntur, fricationibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo vel alia ratione sanescencia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguinis vomitus est. 20

LIBER QUARTUS.

C A P. I.

De humani corporis interioribus sedibus. 25



ACTENUS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut iis certæ sedes assignari non possint: nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes breviter ostendero. 30

Caput

Caput igitur, eaque, quæ in ore sunt, non lingua tantummodo palatoque terminantur, sed etiam, quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes, quæ *σφαιλινδεις* nominantur; itemque arteriæ (quas *καρτιδεις* vocant) sursum procedentes ultra aures feruntur. Atque in ipsis cervicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum, asperam arteriam nominant; alterum, stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad ventriculum fertur. illa spiritum: hic cibum recipit. Quibus cum diversæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingula est: quæ, cum spiramus, attollitur; cum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura & cartilaginosa, in gutture assurgit; cæteris partibus residit. Constat ex circulis quibusdam, compositis ad imaginem earum vertebrarum, quæ in spina sunt: ita tamen, ut ex parte exteriori aspera; ex interiori, stomachi modo lævis sit. eaque descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax, & à tergo spinæ ipsi iunctus, in duas fibras, ungulæ bubulæ modo, dividitur. Huic cor annexum est, natura musculosum, in pectore sub sinisteriore mamma situm; duosque
I
quasi

quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone, transversum ex valida membrana septum est, quod à præcordiis uterum diducit, æque nervosum; multis etiam venis per id discurrentibus; à superiore parte, non solum intestina, sed jecur quoque lienemque discernit. Hæc viscera proxime, sed infra tamen posita, dextra sinistraque sunt. Jecur à dextra parte sub præcordiis ab ipso septo orsum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibberum est. quod prominens leviter ventriculo insidet, & in quatuor fibras dividitur. Ex inferiore vero parte ei fel inhæret. At lien in sinistra, non eidem septo, sed intestino annexus est, natura mollis & rarus, longitudinis crassitudinisque modicæ; isque paulum à costarum regione in uterum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atque hæc quidem juncta sunt. Renes vero divisi: qui lumbis sub imis coxis inhærent, à parte earum resimi, ab altera rotundi; qui & venosi sunt, & tunicis super conteguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt. Stomachus vero, qui intestinorum principium est, nervosus à septima spinæ vertebra incipit, ac circa præcordia cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus. isque inter lienem & jecur positus est; utroque ex his paulum super eum ingrediente. Suntque etiam

membranulæ tenues , per quas inter sc
 tria ista connectuntur , jungunturque ei
 septo , quod transversum esse , supra posui.
 5 Inde ima ventriculi pars paulum in dex-
 teriorem partem conversa, in summum in-
 testinum coarctatur. Hanc juncturam *πυ-
 λῶδον* Græci vocant , quoniam portæ mo-
 do in inferiores partes ea , quæ excreturi
 10 sumus, emittit. Ab ea jejunum intestinum
 incipit, non ita implicitum. cui tale voca-
 bulum est, quia numquam , quod accepit ,
 continet ; sed protinus in inferiores partes
 transmittit. Inde tenuius intestinum est ,
 15 in sinus vehementer implicitum : orbes
 vero ejus per membranulas singuli cum
 interioribus connectuntur ; qui in dexte-
 riorem partem conversi , & è regione dex-
 terioris coxæ finiti, superiores tamen par-
 20 tes magis complent. Deinde id intestinum
 cum crassiore altero transverso committi-
 tur ; quod à dextra parte incipiens , in si-
 nisteriorem pervium & longum est, in dex-
 teriorem non est; ideoque cæcum nomina-
 25 tur. At id, quod pervium est, late fusum at-
 que sinuatum , minusque quam superiora
 intestina nervosum , ab utraque parte huc
 atque illuc volutum , magis tamen siniste-
 30 ritates inferioresque partes tenens , contin-
 git jecur atque ventriculum : deinde cum
 quibusdam membranulis à sinistro rene
 venientibus jungitur ; atque hinc ad dex-
 tra recurvatum in ima dirigitur , qua ex-
 cer-

cernit; ideoque id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit vero universa hæc omentum, ex inferiore parte læve & adstrictum, ex superiore mollius. Cui adeps quoque innascitur; quæ sensu, sicut cerebrum quoque & medulla, caret. At à renibus singulæ venæ, colore albæ, ad vesicam feruntur; *ὀυκτὴρας* Græci vocant, quod per eas inde descendentem urinam in vesicam distillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa & duplex, cervice plena atque carnosa, jungitur per venas cum intestino, coque osse quod pubi subest: ipsa soluta atque liberior est; aliter in viris 15 atque in fœminis posita. Nam in viris juxta rectum intestinum est, potius in sinistram partem inclinata: in fœminis super genitale earum posita est, & superne lapsa, ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis 20 iter urinæ spatiosius & compressius à cervice hujus descendit ad colem: in fœminis brevius & plenius, super vulvæ cervicem se ostendit. Vulva autem in virginibus quidem admodum exigua est: in mulieribus 25 vero, nisi ubi grævidæ sunt, non multo major, quam ut manu comprehendatur. Ea, recta tenuataque cervice, quam canalem vocant, contra mediam alvum orsa, inde paulum ad dexteriores coxam con- 30 vertitur; deinde super rectum intestinum progressa, iliis fœminæ latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo

ven-

ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad præcordia pervenit; ab exteriori parte, evidenti cute; ab interiori levi membrana inclusum; quæ omento jungitur; *περιτόναι* autem à Græcis nominatur.

C A P I I.

10 *De curationibus morborum, quæ nascuntur à capite.*

His veluti in conspectum quendam, quatenus scire curanti necessarium est, adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillitio tegitur. nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, alias erit explicandus.

20 *2. De Capitis dolore.*

In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quam *κεφαλαία* Græci vocant. Cujus notæ sunt, horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc, dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est. Interdum gravior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui vel vino,

vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hique omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt; modo in toto capite, modo in parte; interdum sic, ut oris quoque proximam partem excrucient. Præter hæc etiam invenitur genus, quod potest longum esse: ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementis digito cedit. ὁ δὲ ἐγκίφαλον Græci appellant.

Ex his id, quod secundo loco positum est, dum leve est, qua sit ratione curandum, dixi, cum persequerer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicujus facere deberent. Quæ vero auxilia sint capitæ, ubi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est. nunc de cæteris dicendum est.

Ex quibus id, quod acutum est, & id, quod supra consuetudinem intenditur, idque, quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet, qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, supervacuum est. Satiisque est, abstinere à cibo; si fieri potest, etiam à potione: si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utique, si ex vino vel cruditate origo est.

Si

Si vero in his auxilii parum est, tondere oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit. Si
5 calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concavam imponere, subinde aqua frigida expressam; ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliave refrigerantia
10 cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina. vel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput vehementer perfricare; deinde calido oleo implere & veste velare.
15 quidam etiam id devinciunt: alii cervicalibus vestimentisque onerant, & sic levantur: alios calida cataplasmata adjuvant. Ergo etiam, ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacien-
20 tia leniant, & his uti, quæ experimentum approbarit.

At si parum causa discernitur, perfundere caput, primum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt: stertutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare his, quæ salivam movent, cucurbitulas temporibus
30 & occipitio admovere, sanguinem ex naribus detrahare, resina subinde tempora pervellere, & imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subjecto,

ne vehementer erodat, cudentibus ferramentis, ubi dolor est, ulcera excitare, cibum semper modicum cum aqua sumere: ubi levatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reverti; sed postea semper, antequam quicquam aliud, aquam bibere. 10

Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est: deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parum profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis potionibusque utatur urinam præcipue moventibus.

C A P. I I I.

De morbo, qui circa faciem nascitur. 20

CIRCA faciem vero morbus innascitur, quem Græci *κωινὸν πρὸς μὲν* nominant. Is cum acuta febre oritur. Os cum rictu quodam pervertitur, ideoque nihil aliud est, quam distortio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio. somnus in promptu est.

In hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere alvum. Si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum movere. Præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum.

vinum. Sed si discussum his non est, utendum est cursu, & fricatione in eo, quod læsum est, leni & multa; in reliquis partibus brevior, sed vehementi. Prodest etiam movere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certe salsa, sic ut ei quoque sulphur adjiciatur: post perfusionem iterum perfricari, 10 sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris item sinapi, donec erodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

15

C A P. I V.

De Resolutione linguae.

At si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non 20 explicetur; oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, & os, & ea, quæ sub mento sunt, & cervicem vehementer perfricare; lasere linguam ipsam 25 linere; manducare, quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam; magna vi luctari, ut verba exprimantur; exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam, 30 deinde vomere.

I 5

C A P.

CAP. V.

De Distillatione ac gravedine.

DISTILLAT autem humor de capite 5
interdum in nares, quod lene est; in-
terdum in fauces, quod peius est; in-
terdum etiam in pulmonem, quod pessi-
mum est. Si in nares distillaverit, tenuis
per has pituita profluit, caput leniter dolet, 10
gravitas in eo sentitur, frequentia sternu-
tamenta sunt. Si in fauces, has exasperat,
tussiculam movet. Si in pulmonem, præ-
ter sternutamenta & tussim, est etiam capi-
tis gravitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa 15
urina.

Aliud autem (quamvis non multum di-
stans) malum, gravedo est. Hæc nares clau-
dit, vocem obtundit, tussim siccam movet.
Sub eadem vero salsa est saliva, sonant au- 20
res, venæ moventur in capite, turbida uri-
na est. Hæc omnia *ὑγρὺς* Hippocrates no-
minat. Nunc video apud Græcos in grave-
dine hoc nomen servari: distillationes,
καταρρέματα appellari. Hæc communia & 25
brevia, sed si neglecta sunt, longa esse
consuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod
pulmonem exulcerat.

Ubi aliquid ejusmodi sentimus, pro-
tinus abstinere à sole, à balneo, à venere 30
debemus. Inter quæ unctio, & assueto
cibo nihilominus uti licet. Ambulatione
tantum non acri, sed recta utendum est,
&

& post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperavimus, id vitium non leverur. Quo levato, si in distillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine, nares magis pallent, balneo utendum est, multaque aqua prius calida, post egelida, fovendum os, caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At, si æque tenuis die quarto pituita est, vel nares æque clausæ videntur, assumendum est vinum aminæum, austerum; deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum, & ad consuetudinem revertendum est.

Neque tamen iplis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tamquam ægros agere: sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem, & vehementius ista sollicitare consuerunt. huic enim quædam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces distillavit, præter ea, quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, levior fricatio adhibenda thoraci erit, levior capiti, demenda assueti cibo pars dimidia, sumenda ova, amyllum, similiaque, quæ pituitam faciunt crassio rem, siti, quanta maxima sustineri potest, pugnandum est. Ubi per hæc idoneus aliquis balneo factus, coque usus est, adji-ciendus est cibo pisciculus, aut caro; sic tamen,

men, ne protinus justus modus cibi sumatur: vino meraco copiosius utendum est.

At, si in pulmonem quoque destillat, multo magis & ambulatione & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibis. Si non satis illi proficiunt, acrioribus utendum est, magis somno indulgendum est, abstinendumque à negotiis omnibus, aliquando, sed serius, balneum tentandum. 10

In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare: postero die surgere, diu abstinere à potione, aut, si res coegerit, non ultra heminam aquæ assumere: tertio 15 die panis non ita multum ex parte interiore cum piscicula, vel levi carne sumere, aquam bibere: si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere: ubi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fovere usque ad sudorem, tum ad vinum redire. Post quæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. sed, si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, levibus, humore quam minime, servatis frictionibus exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariæ sunt. 20 25

CAP. VI.

De Cervicis morbis.

30

A CAPITE transitus ad cervicem est; quæ gravibus admodum morbis obnoxia

noxia est. Neque tamen alius importunior acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore nervorum; modo caput scapulis, modo mentum pectori adnectit, modo rectam & immobilem cervicem intendit. Primum Græci *ὀπισθόθεν*, sequentem *ἐμπροσθόθεν*, ultimum *τίθεν* appellant: quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum diem tollunt: si hunc evaserunt, sine periculo sunt.

Eadem omnia ratione curantur; idque convenit. Asclepiades utique mittendum sanguinem credidit. Id quidam utique vitandum esse dixerunt, eo quod maxime tum corpus calore egeret; isque esset in sanguine venarum. Hoc quidem falsum est. neque enim natura sanguinis est, ut utique caleat; sed ex his, quæ in homine sunt, is celerime vel calefcit, vel refrigerfcit. Mitti vero nec ne debeat, ex his intelligi potest, quæ de sanguinis missione præcepta, sunt. Utrique autem recte datur castoreum, & cum hoc piper, vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaque plerique aqua calida multa cervices subinde perfundunt. id in præsentia allevat; sed opportuniores nervos frigori reddit. quod utique vitandum est.

Utilius igitur est, cerato liquido primum cervicem perungere; deinde admove-
vere vesicas bubulas vel utriculos oleo calido

lido repletos, vel piper cum ficu contusum. Utilissimum tamen est, humido sale fovere. quod quomodo fieri debeat, jam ostendi. Ubi eorum aliquid factum est, admove 5 ad ignem, vel si æstas est, in sole ægrum oportet; maximeque oleo vetere; si id non est, syriaco; si ne id quidem est, adipe quam vetustissima cervicem, & scapulas, & spinam perfricare. 10

Fricatio cum omnibus vertebra hominum utilis sit, tum iis præcipue, quæ in collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio utendum est: dum intermittitur, im- 15 ponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cavendum vero & præcipue frigus. ideoque in eo conclavi, quo curatur æger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore antelucano, quo præcipue frigus 20 intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum habere, idque irino vel cyprino calido madefacere, & super imposito pileo velare: nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam ca- 25 lidam, in qua fœnum græcum decoctum sit, & adjecta olei pars tertia. Alvus quoque ducta sæpe superiores partes resolvit.

Si vero etiam vehementius dolor crevit, admovendæ cervicibus cucurbitulæ sunt, 30 sic ut cutis incidatur Eadem aut ferramentis, aut sinapi adurenda. Ubi levatus est dolor, moverique cervix cœpit, scire licet, cedere

cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum, itemque ovis sorbilibus, aut è pullis mollibusve jus aliquod assumendum. Id si bene processerit, jamque ex toto recte se habere cervices videbuntur, incipiendum erit à pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam
 10 panis mandendus, quam vinum gustandum: siquidem hujus usus præcipue periculosus, ideoque in longius tempus differendus est.

C A P. VII.

15 *De Faucium morbis: & primum de Angina*

UT autem morbi genus circa totam cervicem; sic alterum, æque pestiferum acutumque, in faucibus esse consuevit. Nostri anginam vocant: apud
 20 Græcos nomen, prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet; sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvuntur. id *συνάγχη* vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusque est. *ἀσυνάγχη* vocatur. Illis communia sunt; æger non cibum devorare, non potionem potest; spiritus ejus inter-
 30 cluditur. Levius est, ubi tumor tantummodo & rubor est, cætera non sequuntur. id *παρασυνάγχη* appellant.

Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mitten-

mittendus est, etsi non abundat: secundum
est, ducere alvum. Cucurbitula quoque
recte sub mento, & circa fauces admove-
tur; ut id, quod strangulat, evocet. Opus
est deinde fomentis humidis. nam sicca
spiritum elidunt. Ergo admoveere spon-
gias oportet: quæ melius in calidum o-
leum, quam in calidam aquam subinde di-
mittuntur. Efficacissimumque est hic quo- 10
que, salem calidis cum saccellis superpone-
re. Tum commodum est, hyssopum, vel
nepetam, vel thymum, vel apînthium, vel
etiam fursures, aut ficus aridas, cum mul-
sa decoquere, eaque gargarizare: post hæc 15
palatum ungere vel felle taurino, vel eo
medicamento, quod ex moris est. Polline
etiam piperis recte respergitur.

Si per hæc parum proficitur, ultimum
est, incidere satis altis plagis sub ipsis ma- 20
xillis supra collum, & in palato circa uvam,
vel eas venas, quæ sub lingua sunt; ut per
ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non
fuerit æger adjutus, scire licet, á malo
victum esse. Si vero his morbus levatus est, 25
jamque fauces cibum & potum capiunt,
facilis ad bonam valetudinem recursus est.
Atque interdum natura quoque adjuvat, si
ex angustiore sede vitium transit in latio-
rem. Itaque rubore & tumore in præcor- 30
diis orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid autem eas levarit, incipiendum
est ab humidis, maximeque aqua mulsa:
deinde

deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum revertantur. Vulgo audio, si quis pullum
 5 hirundinum ederit, angina toto anno non periclitari. Servatumque eum ex sale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque ejus contritum in aquam mulsam, quæ potui detur, infriari, & prodesse. Id cum
 10 idoneos authores ex populo habeat, neque habere quicquam periculi possit, quamvis in monumentis medicorum non legerim, tamen inferendum huic operi meo credidi.

2. *De Difficultate spirandi.*

15 Est etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud aliudque nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit: sed hæc dum modica est, neque ex toto strangulat, *δύσπνοια*
 20 appellatur: cum vehementior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, *ἄσπνοια*: cum accessit id quoque, ne nisi recta cervice spiritus trahatur, *ὀρθόπνοια*. Ex quibus id, quod primum est, potest
 25 diu aliquem trahere: quo insequentia acuta esse consuerunt. His communia sunt: quod propter angustias, per quas spiritus evadit, sibilum elidit; dolor in pectore præcordiisque est, interdum etiam in sca-
 30 pulis,isque modo decedit, modo revertitur; adhæc tussicula accedit.

Auxilium vero est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractione. Neque id
 satis

satis est, sed lac caprinum calidum jejuno
 dandum; & si non febrit, venter solvendus
 est. Liquanda alvus, interdum etiam du-
 cenda, quibus extenuatum corpus incipit
 spiritum trahere commodius. Caput au-
 tem etiam in lecto sublime habendum est:
 thorax fomentis, cataplasmatisque calidis,
 aut siccis, aut etiam humidis adjuvandus
 est; & postea malagma superimponendum, 10
 vel ceratum ex cyprino, vel irino unguen-
 to. Sumenda deinde jejuno in potum mul-
 sa, vel aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel
 contrita capparis radix sit. Deligitur etiam
 utiliter, aut nitrum, aut nasturtium, allium- 15
 ve frictum, deinde contritum & cum melle
 mixtum: simulque coquuntur mel, galba-
 num, resina terebinthina: ubi autem co-
 jerunt, ex his, quod fabæ magnitudinem
 habet, quotidie sub lingua liquatur: aut 20
 sulphuris ignem non experti p*. & qua-
 drans, abrotani p*. in vini cyatho teruntur,
 idque tepescitum sorbetur. Est etiam non
 vana opinio, vulpinum jecur, ubi siccum
 & aridum factum est, contundi oportere, 25
 pollinemque ex eo potioni aspergi; vel
 ejusdem pulmonem quam recentissimum
 assum, sed sine ferro coctum, edendum
 esse. Præter hæc, sorbitionibus & lenibus
 cibis utendum est: interdum vino tenui 30
 austero: nonnunquam vomitu. Pro-
 sint etiam, quæcumque urinam movent: sed
 nihil magis, quam ambulatio lenta pene
 usque

usque ad lassitudinem; fricatio multa, præcipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios, usque ad sudorem.

3. *De Fancium exulceratione.*

In interiore vero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis, 10 fomentisque humidis utuntur. Volunt etiam vaporem calidum ore recipi. per quem molliores alii partes eas fieri dicunt, opportunioreque vitio jam hærenti. Sed, si bene sic vitari morbus potest, tuta illa 15 præsidia: si metus ejus est, supervacua sunt.

Utique autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim. Neque utilia sunt, quæ urinæ movendæ sunt apta: quia possunt, dum transcunt, ibi quoque pituitam 20 tam extenuare; quam suppressi melius est.

Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, author bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendum. hoc enim sine ulla noxa comprimere ulcera.

25 Sed id suppressere sanguinem potest, ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est; quod idem quoque æque probat: vel porri, vel marrubii succus, vel nuces Græcæ cum tragacantho contritæ & cum 30 passo mixtæ, vel lini semen contritum & cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique necessaria est. Fricatio à pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi

Cibi vero esse debent, neque nimium acres, neque asperi; mel, lenticula, tragus lac, ptisana; pinguis caro, præcipueque porrum, & quicquid cum hoc mixtum est. 5
 Potionis quam minimum esse convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cotoneum, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. 10

Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum: curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

4. De Tussi.

15

Tussis vero fere propter faucium exulcerationem molesta est: quæ multis modis contrahitur. Itaque, illis restitutis, ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere: & vix, cum vetus facta est, 20
 eliditur, ac modo arida est, modo pituitam facit vel citat.

Oportet autem hyssopum altero quoque die bibere: spiritu retento currere, sed minime in pulvere: ac lectione uti vehementi; quæ primo impeditur à tussi, post eam vincit: tum ambulare: deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu perfricare. Post hæc quam pinguiissimæ ficus uncias tres, super prunam incoctas, esse. 30

Præter hæc, si humida est, profunt frictiones validæ, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque simul vehementer

hementer perfricetur : item cucurbitulæ pectori admotæ ; sinapi ex parte exteriori faucibus impositum , donec leviter exulceret ; potio ex menta , nucibusque Græcis & amylo ; primoque assumptus panis aridus , deinde aliquis cibus lenis.

At , si sicca tussis est , cum ea vehementissime urget , adjuvat vini austeri cyathus assumptus ; dum ne amplius id , interposito tempore aliquo , quam ter aut quater fiat : item laseris quam optimi paululum devorare opus est ; porri vel marrubii succum assumere ; scillam delingere ; acetum ex ea , vel certe acre sorbere , aut cum spica allii contriti duos vini cyathos.

Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio , navigatio longa , loca maritima , nationes. Cibus interdum mollis , ut malva , ut urtica : interdum acer , ut lac cum allio coctum. Sorbitiones , quibus laser sit adjectum , aut in quibus porrum incoctum tabuerit. Ovum quoque sorbile , sulphure adjecto sorbeatur. In potum vero primum aqua calida , deinde invicem aliis diebus hæc , aliis vero vinum.

5. *De Sanguinis spatio.*

Magis terreri potest aliquis , cum sanguinem expuit. sed id modo minus , modo plus periculi habet. Exit enim modo ex gingivis , modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose , sed sine tussi , sine ulcere , sine gingivarum ullo vitio ; ita ut
nihil

nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnumquam autem is à summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venæ alicujus adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex hisque sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque lædit potio aut cibus, neque quicquam, ut ex ulcere, excreatur. Aliquando vero, gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut jocinore feratur. Sæpe fœminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt. Authoresque medici ferunt, vel ex ea parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicujus venæ patefacto. Primam *διάβρωσιν*, secundam *ῥινορροίαν*, tertiam *ἀνατόμωσιν* appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac sæpe quidem evenit, uti sanguinem pus sequatur.

Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum fiunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis, quibus

bus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæve; aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profuvium: idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit: si tamen in ejus urina nihil aliud novabit. Neque vomitum hujus afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto; neque nimius est, neque tussim aut calorem movet. Hæc pertinent ad universum. nunc ad ea loca, quæ proposui, veniam.

Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est. Si ex ore, continuasse eo merum vinum: si id parum proficit, acetum. Si inter hæc quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commodissimum est, impetum ejus, admota occipitio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur, avertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, evenit, eandem cucurbitulam, incisis inguinibus ejus, admove.

At, si ex faucibus, interioribusve partibus processit, & metus major est, & cura major adhibenda. Sanguis mittendus est; &, si nihilominus ex ore processit, iterum tertioque, & quotidie paulum aliquid: pro-

tinus

timus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succum; imponendaque extrinsecus supra id, quod dolet, lana succida ex aceto est, & id spongia subinde refrigerandum. Erastistratus horum crura quoque & femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe com- 10
mode respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed sat est infra inguina, & super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum, si febres urget, danda est sorbitio; & 15
potui aqua, in qua aliquid ex his, quæ alvum adstringunt decoctum sit. At, si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ovum dari potest potui, vel idem, quod supra scriptum est, 20
vel vinum dulce, vel aqua frigida. sed sic bibendum erit, ut sciamus, huic morbo sitim prodesse.

Præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hujus quoque cu- 25
bantis sublime esse debet: recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, venus, in cibo oleum, acriora omnia; item calida fomenta, conclave calidum & inclusum, 30
multa vestimenta corpori injecta, etiam fricationes, nisi ubi bene sanguis conquievit. Tum vero incipiendum est à brachiis, cruri-

cruribusque ; à thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem, locis maritimis ; per æstatem, mediterraneis opus est.

5 C A P. VIII.

De Stomachi morbis.

FAUCIBUS subest stomachus ; in quo
plura longa vitia incidere consuerunt.
10 Nam modo ingens calor, modo infla-
tio hunc, modo inflammatio, modo exul-
ceratio afficit. Interdum pituita, interdum
bilis adoritur. Frequentissimumque est
ejus malum, quo resolvitur : neque ulla re
15 magis aut afficitur, aut corpus afficit.

Ut diversa autem vitia ejus, sic etiam
remedia sunt. Ubi exæstuat, aceto cum rosa
extrinsecus subinde fovendus est ; impo-
nendusque pulvis cum oleo ; & ea cata-
20 plasmata, quæ simul & reprimunt, & mol-
liunt. Potui, nisi quid obstat, gelida aqua
præstanda.

Si inflatio est, prosunt admotæ cucurbi-
tulæ ; neque incidere cutem necesse est :
25 profum sicca & calida fomenta, sed non
vehementissima. Interponenda abstinencia
est. Utilis in jejuno potio est apsinthii, aut
hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primo levis,
deinde major adhibenda est ; maximeque,
30 quæ superiores partes moveat. quod genus
in omnibus stomachi vitiiis aptissimum est.
Post exercitationem opus est unctione, fri-
catione ; balneo quoque nonnunquam, sed
K rarius ;

rarius ; interdum alvi ductione. Cibis deinde calidis , neque inflantibus: eodemque modo calidis potionibus, primo aquæ; post, ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, ut, quo modo se quisque æger refecerit, eodem sanus utatur. nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, quibus reddita est. 10

At si inflammatio aliqua est, quam fere tumor & dolor sequitur, prima sunt quies, & abstinencia; lana sulphurata circumdata; in jejuno apsinthium. Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fovendus 15 est: deinde cibis quidem utendum est modicis; imponenda vero extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde, his detractis, utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant: interdum alvus ducenda: adhibenda exercitatio, & cibus plenior. 20

At, si exulceratio stomachum infestat, eadem fere facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi lenes & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acia atque acida removenda. Vino, si febris non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni utendum: sed neque 30 perfrigido, neque nimis calido.

Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in jejuno, modo post cibum vomitus

vomitur est. Utilis exercitatio, gestatio, navigatio, fricatio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt.

10 Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur: poriones ex apsinthio dantur: necessaria gestatio, navigatio, & si fieri potest, ex nausea vomitus: vitanda cruditas: sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum.

15 Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est, cum cibi non tenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae, item unctiones, fricationesque: hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus ejusdem subicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis id
25 quod contra stomachum est: consistere in frigidis, medicatisque fontibus, quales Cutiliarum Sumbriinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquuntur, quam
30 facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque avem, neque venationem, neque piscem

dari debere, nisi generis durius. Potui-
quidem aptissimum est vinum frigidum,
vel certe bene calidum meracum, potissi-
mum Rheticum, vel Allobrogicum, aliud-
ve, quod & austernum & resina conditum
est: si id non est, quam asperimum, ma-
ximeque Signinum.

Si cibus non continetur, danda aqua, &
eliciendus plenior vomitus est; iterumque 10
dandus cibus, & tum admovendæ duobus
infra stomachum digitis cucurbitulæ, ibi-
que duabus aut tribus horis continendæ
sunt. Si simul & vomitus, & dolor est, im-
ponenda supra stomachum est lana succi- 15
da, vel spongia ex aceto, vel cataplasma,
quod refrigeret. Perfricanda vero non
diu, sed vehementer brachia, & crura, &
calescienda.

Si plus doloris est, infra præcordia qua- 20
tuor digitis cucurbitula utendum est: pro-
tinus dandus panis ex posca frigida. Si non
continuit, post vomitum leve aliquid ex
his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne
id quidem tenuit, singuli cyathi vini, sin- 25
gulis interpositis horis, donec stomachus
consistat. Valens etiam medicamentum
est, radiculæ succus: valentius, acidi puni-
ci mali, cum pari modo succi, qui ex dul-
ci punice malo est, adjecto etiam intubi 30
succo, & mentæ, sed hujus minima parte;
quibus tantundem, quantum ex his omni-
bus est, aquæ frigidæ quam optime misce-
tur.

tur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem vomitus est, qui per se venit, 5 et si nausea est.

Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, ejiciendus est; protinusque, cibus assumptis 10 iisdem, quos proxime posui, stomachus restituentus. Ubi sublatus est præsens metus, ad ea redeundum est, quæ supra præcepta sunt.

CAP. IX.

De Laterum doloribus.

15 **S**TOMACHUS lateribus cingitur; atque in his quoque vehementes dolores esse consueverunt. Eorum initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, 20 vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est: isque modo tarde, modo celeriter solvitur, interdum ad perniciem quoque procedit; oriturque acutus morbus, qui *παλιδιπλός* à Græcis nominatur. Huic dolori lateris, febris & tussis 25 accedit: & per hanc excreatur, si tolerabilis morbus est, pituita; si gravis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil emolitur. idque vitio primo gravius, secundo tolerabilius est. 30

Remedium vero est magni & recentis doloris, sanguis missus. At, si levior, si vetustior casus est, vel supervacuum, vel

serum id auxilium est ; confugiendumque ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque exci-
 5
 tet ; & tum medicamentum , quod humorem illuc citet. Præter hæc , circumdare primum oportet latus hapso lanæ sulphuratae : deinde , cum paululum inflammatio
 se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab 10
 his transitus ad malagmata est.

Si vetustior dolor remanet , novissime resina imposita discutitur. Utendum cibis potionibusque calidis: vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum est extremas
 15
 partes oleo & sulphure perfricare. Si levata tussis est , leni lectione uti : jamque & acres cibos , & vinum meracius assumere. Quæ ita à medicis præcipiuntur. Attamen
 sine his rusticos nostros epota ex aqua tri-
 20
 xago satis adjuvare dicitur.

Hæc in omni lateris dolore communia sunt : plus negotii est , si acutus quoque morbus is factus est. In hoc , præter ea ,
 quæ supra posita sunt , hæc animadverten-
 25
 da sunt : ut cibus sit quam maxime tenuis & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum , aut jus in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit : idque non nisi
 tertio die detur : si tamen per vires licebit : 30
 potui vero aqua mulsa , in qua hisopum , aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint , ex ratione vel adauetæ, vel
 levata

levatæ febris apparebit, sic, ut in remissione
ne quam maxima dentur: cum eo tamen, ut
sciamus, non esse ejus generis tussi aridas
5 fauces committendas. sæpe enim, ubi nihil
est, quod excreetur, continuatur, & stran-
gulat. Ob quam causam dixi etiam pejus
id genus esse tussis, quod nihil, quam quod
puitam moveret. Sed hic vinum sorbe-
10 re, ut supra præcepimus, morbus ipse non
patitur: in vicem ejus, cremor ptisanæ su-
mendus est.

Ut his autem in ipso morbi fervore su-
stinendus æger est, sic, ubi paulum is se re-
15 misit, alimenta pleniora, & vini quoque
aliquid dari potest; dum nihil detur, quod
aut refrigeret corpus, aut fauces asperet.
Si in refectiōe vero manserit tussis, inter-
mittere oportebit uno die; posteroque,
20 cum cibo vini paulo plus assumere. At, in-
valescente quoque tussi, tum non erit alie-
num, ut supra quoque positum est, vini
cyathos sorbere. sed in hoc genere valetu-
dinis, dulce, vel certe lene commodius est.
25 Si malum inveteravit, athletico victu
corpus firmandum est.

C A P. X.

*De Viscerum morbis, & primo, de
Pulmone.*

30

ACOMPAGINE corporis ad viscera
transeundum est; & imprimis ad
pulmonem veniendum. Ex quo ve-

hemens & acutus morbus oritur, quam ~~etiam dixerunt~~ Græci vocant. Ejus hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. hunc casum ejus subsequitur tussis, bilem vel pus trahens; præcordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnæ febres, continua vigilia, tibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi quam doloris habet. 10

Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem mittere: sin minores, cucurbitulas sine ferro præcordiis admove. Quod si satis valet, gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tantum dimovere. In 15
 potionem autem hyssopum dare, cum quo sicus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fricatione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis, & pedibus & cruri- 20
 bus, leniter contra pulmonem; idque bis quotidie facere.

Quod ad cibum vero pertinet, huic nec salis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum astringentibus, sed paulo le- 25
 nioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel orizæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac, sorbile ovum, nuclei pinei: ex melle, panis, vel elota alica ex aqua mulsa. Potui danda de- 30
 inde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida; aut, si æstas est, etiam frigida; nisi quid obstat. Hæc autem altero quoque die,

die, incrementum morbo dare satis est.

Ubi incrementum constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adjuvandæ sunt aqua mulsæ. Profuntque adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest etiam impositus super pectus sal
 10 bene contritus, cum cerato mistus; quia leviter cutem erodit, eoque impetum materiæ, qua pulmo vexatur, evocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neque alienum est, dum
 15 premit morbus, clausis fenestris ægrum continere: ubi paulum levatus est, ter aut quater die, fenestris aliquantum apertis, purum aerem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus à vino abstinere; gestatione, fricatione uti; sorbitionibus, &
 20 prioribus cibis adjicere, ex oleribus porrum; ex carne, ungulas, & summa trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil nisi molle & lene sumatur.

25

C A P. X I.

De Hepaticis.

ALTERIVS quoque visceris morbus, id est jecinoris, æque modo longus, modo acutus esse consuevit. *ἡπατις*
 30 Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis vehemens dolor est: idemque ad latus dextrum, & ad jugulum, humerumque
 K 5 partis

partis ejusdem pervenit: nonnunquam manus quoque dextra torpet: horror validus est. Ubi male est, bilis evomitur: interdum singultus prope strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt. Longioris vero, ubi suppuratio in jecinore est; dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte præcordia dura sunt, & tument; post cibum major spiritus difficultas est: accedit 10 maxillarum quædam resolutio. Ubi inveteravit malum, venter & crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque jugulum utrumque extenuatur.

In initio sanguinem mittere optimum 15 est: tum venter solvendus est; si non potest aliter, per nigrum veratrum. Imponenda extrinsecus cataplasmata; primum quæ reprimant; deinde calida, quæ diducant; quibus recte iris vel apsinthium adjicitur: post 20 hæc, malagma. Dandæ vero sorbitiones sunt omnesque cibi & calidi, & qui non multum alunt, & fere qui pulmonis quoque; dolori conveniunt; præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia 25 in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amaracum, sesamum, laurî baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ jecur recens & crudum. Ex qui- 30 bus quædam per se esse, quædam adjicere vel sorbitioni vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumantur. Neque alienum est, apsin-

aplinthium contritum ex melle & pipere, ejusque catapotium quotidie devorare. Abstinentum utique est ab omnibus frigidis. 5 neque enim res ulla magis jecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus. Vitandus omnis labor, omnis vehementior motus: ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, jactus, 10 cursus, in hoc inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hiems est, calida; si æstas, tepida: itemque liberalis unctio, & in balneo sudor.

Si vero jecur vomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam ultra id scalpello aperiunt, & ipsam vomicam ad- 15 urunt.

C A P. XII.

De Lienosis.

20 **A**t lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra; quæ & dura est, & prementi renititur; 25 venterque inteptus est: aliquis etiam cruribus tumor est. Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt, In intenta ambulatione vel cursu, dolor, & quædam difficultas est. 30 Hoc vitium quies auget, itaque exercitatione & labore opus est: habita tamen ratione, ne febrem ista, si nimium processerit, excitent. Vnctiones, frictionesque, & 35 K 6 sudo-

sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt: item lac & caseus. Acida autem maxime conveniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta, vel oleæ ex muria dura; lactuæ intinctæ in aceto; intubi quoque & betæ ex eodent; & sinapi, armoraciæ, & pastinacæ: de carnibus vero ungulæ; rostra, 10 aves macræ, ejusdemque generis venatio. Potui vero jejuno dari debet apsinthium aquæ incoctum: at post cibum aqua à ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde extinctum sit. hæc enim vel præcipue 15 lienem coerces. quod animadversum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis & potionibus, quæ urinæ movendæ sunt: præcipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cytisus, vel thymum, vel hyssopum, vel satireia. hæc enim inde commodissime videntur humorem educere. 25 re. Lienis quoque bubulus utiliter esui datur: præcipueque eruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ levant. fit ex unguentariis glandulis, quas *μυγβαλάνας* Græci 30 vocant: fit ex lini & nasturtii femine, quo vinum & oleum adjicitur: fit ex cupresso viridi, & arida ficu: fit ex sinapi, cui sevi hircini

hircini à renibus quarta pars ponderis
adjicitur, teriturque in sole, & protinus
imponitur. Multisque modis huic rei cap-
5 pari aptum est. Nam & ipsum cum cibo
assumere, & muriam ejus cum aceto sor-
bere commodum est. Quin etiam extrin-
secus radicem contritam, vel corticem
ejus cum furfuribus, aut ipsum cappari
10 cum melle contritum imponere expedit.
Malagmata quoque huic rei aptantur.

C A P. X I I I.

De Renum morbi.

15 **A**T renes ubi affecti sunt, diu male
habent. Pejus vero est, si frequens
biliosus vomitus accedit. Oportet
conquiescere: cubare molliter: solvere
alvum; si aliter non responder, etiam du-
20 cere: sæpe desidere in aqua calida: neque ci-
bum, neque potionem frigidam assumere:
abstinere ab omnibus salsis, acribus, acidis,
pomis: bibere liberaliter: adjicere modo
cibo, modo potioni piper, porrum, ferulam,
25 album papaver. quæ maxime inde uri-
nam movere consuerunt.

Auxilio quoque his exulceratis sunt, si
adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris se-
mina detractis corticibus sexaginta, nuclei
30 ex pinu silvestri quindecim, anisi quod
tribus digitis sumi possit, croci paulum,
contrita & in duas mulsi portiones divisa.

Si vero dolor tantum levandus est, ejus-
dem

dem cucumeris semina triginta , iidem nuclei viginti, nuces Græcæ quinque, crocipaululum, contrita & cum lacte potui data. Ac insuper quoque recte quædam ; malagmata injiciuntur ; maximeque ea, quæ humori extrahendo sunt.

CAP. XIV.

De Intestinorum morbis: & primo de Cholera. 10

A VISCERIBUS ad intestina veniendum est; quæ sunt & acutis & longis morbis obnoxia. Primoque facienda mentio est cholæræ; quia commune id stomachi atque intestinorum vitium videri potest. Nam simul & dejectio & vomitus est: præterque hæc inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnumquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea vero, quæ supra comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusque contrahuntur, urget sitis, anima deficit. quibus concurrentibus non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur.

Protinus ergo, ubi ista cœperunt, aqua tepida quam plurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam ea sine vomitu sumitur: sed etiamsi non incidit, tamen corruptæ

ptæ miscuisse novam materiam prodest ;
parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ob omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt,
5 oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fovere: vel, si venter dolet, iisdem egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur. Quod si vehementer &
10 vomitus, & dejectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt, quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Admovendumque naribus est pulegium ex
15 aceto, vel polenta vino aspersa, vel mentha, vel quod secundum naturam est.

At cum discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, & cum aqua frigida
20 mixtum, vel polenta adjecta, vel infracto pane; quem ipsum quoque assumere expedit: quotiesque aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hæc vires re-
25 stituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinque aspergendam potionem esse dixit; deinde paulatim merum addiendum. Is, si ab initio vinum dedit, & metus cruditatis secutus est, non sine
30 causa fecit: si vehementem infirmitatem adjuvari posse tribus guttis putavit, erravit.

At si inanis est homo, & crura ejus contrahun-

trahuntur, interponenda potio apsinthii est. Si extremæ partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adjectum; calidisque fomentis nutrienda. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est, aut sinapi superimponendum. Ubi is constitit, dormire oportet: postero die utique à potione abstinerere: die tertio in balneum ire: paulatim se cibo reficere; somnoque, quisquis facile adquiescit; vitetque lassitudinem, & frigora. Si post suppressam choleram febricula manet, alvum duci necessarium est: tum cibis, vinoque utendum est. Sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestinalia stomachumque versatur sic, ut, cujus potissimum partis sit, non facile dici possit.

CAP. XV.

20

De Cæliaco ventriculi morbo.

IN ipso vero ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, & καλῶς à Græcis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorque ejus est: alvus nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit: extremæ partes frigescunt: difficulter spiritus redditur.

Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toti ventri imponere, ut dolorem leniant. Post cibum vomere, atque ita ventrem exinanire. Proximis deinde diebus

diebus cucurbitulas sine ferro ventri & coxis admove. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & vino falso, frigido. Si tempus
5 anni patitur, etiam viridibus ficis; sic tamen, ne quis aut cibus, aut humor universus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos ternosve assumere, & cibum pro portione
10 hujus. commodeque facit cyathos lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibique calentes & acres utiliores sunt: adeo ut lacti quoque recte contritum allium adjiciatur.

15 Procedente vero tempore, opus est gestari; maximeque navigare; perfricari ter aut quater die sic, ut nitrum oleo adjiciatur; perfundi aqua calida post cibum; deinde sinapi imponere per omnia membra, ex
20 cepto capite, donec arrodantur & rubeant; maximeque si corpus durum & virile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrem comprimunt. Assa carodanda, valens, & quæ non facile corrumpatur: in potum vero, pluviatilis aqua decocta; sed quæ per binos ternosve cyathos
25 bibatur.

Si vetus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare: altero quoque die vinum vel aquam
30 bibere; interdum interposito cibo, singulos vini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere aquam pluviatilem egelidam; maxi-

maximeque , si dolor in imis partibus remanet.

C A P. X V I.

De Tenuioris intestini morbo.

INTRA ipsa vero intestina consistunt duo morbi : quorum unus in tenuiore , alter in pleniore est. Prior acutus est : insequens esse longus potest. Diocles Carystius 10 tenuioris intestini morbum *χόρδαψον* , plenioris *εἰλιδόν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εἰλιδόν* , hunc *κρλι-κόν* nominari. Sed prior modo supra umbilicum , modo sub umbilico dolorem mo- 15 vet. Fit in alterutro loco inflammatio : nec alvus , nec spiritus infra transmittitur. Si superior pars affecta est , cibus : si inferior , stercus per os redditur : si utralibet , metus est. Adjicitur periculo , si vomitus biliosus , 20 mali-odoris , aut varius , aut niger est.

Remedium est , sanguinem mittere ; vel cucurbitulas pluribus locis admoveere , non ubique cute incisa : id enim duobus aut tribus locis satis est : ex cæteris spiritum 25 evocare abunde est. Tum animadvertere oportet , quo loco malum sit. solet enim contra id timere. Et si supra umbilicum est , alvi ductio utilis non est. Si infra est , alvum ducere interdum , ut Erasistrato pla- 30 cuit , optimum est ; & sæpe id auxilii in his partibus magnum remedium est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore , cum oleo

oleo & melle sic, ut præterea nihil adjiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere. inveniatur enim mali locus; qui necesse est renitatur: & ex eo demum deliberari poterit, ducenda, nec ne alvus sit.

Illa communia sunt: calida cataplasma-
10 ta admove, eaque imponere à mammis usque ad inguina, & spinam; ac sæpe mutare: brachia, cruraque perfricare: demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in alvum ex
15 parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare. Ubi per hæc consecuti sumus, ut ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum. (nam ante magna cura vi-
20 randum est, ne quid bibat.) si id commodè cessit, adjicere sorbitionem.

Ubi dolor & febricula quierunt, tum demum uti cibo plenior; sed neque inflante, neque valido, ne intestina adhuc im-
25 becilla lædantur. potui vero nihil præterquam puram aquam. Nam si quid vinolentum siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem,
30 cæterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; & cum frigus subit, siue aliqua jactatio, nisi bene jam confirmatis intestinis, revertitur.

De Morbo intestini plenioris.

Is autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quæ cæcum esse proposui. Vehemens sit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte: intestinum verti videtur; quod prope spiritum elidit. In plerisque post frigora cruditatesque oritur, deinde quiescit; & per ætatem sæpe repetens sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat.

Ubi is dolor cepit, admoveere sicca & calida fomenta oportet; sed primo levia, deinde validiora; simulque fricatione ad extremas partes, id est, crura brachiaque materiam evocare. Si discussus non est, quæ dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum ejus rei causa comparatum, quod *καλινδ* nominatur. Id se repperisse Cassius gloriabatur. magis prodest potni datum. sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem levat.

Nisi finito vero tormento, recte neque eibus neque potio assumitur. Quo victu sit utendum iis, qui hoc genere tentantur, jam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *καλινδ* nominatur, ex his constat. Costi, anisi, castorei singulorum p. * iiii. petroselini p. * iv. piperis longi, & rotundi, singulorum p. * v. papaveris

veris lacrymæ, junci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. *vi. quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest, & ex aqua calida sumi.

C A P. XVIII.

De Torminibus.

PROXIMA his inter intestinorum mala tormina esse consueverunt. *δυστερία* Græce vocatur. Intus intestina exulcerantur: ex his cruor manat; isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quali mucosis excernitur; interdum simul quædam carnosæ descendunt. Frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittunt: atque eo quoque tormentum intenditur; idque post tempus aliquod levatur, exiguaque requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoque tempore id malum, cum inveteraverit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat.

Oportet imprimis conquiescere; siquidem omnis agitatio exulcerat: deinde jejunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquæfolii sit adjecta: imponere cataplasmata super ventrem, quæ reprimunt; quod in superioribus ventris morbis non expedit: quotiesque defecit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint: portulacam vel coctam, vel ex dura muria

muria edisse; cibos potionesque eas, quæ adstringunt alvum.

Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere vel ptisanæ, cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam cervinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album erudum ex ovis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit; vel, si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta sint. Levant enim dolorem hæc, & mitiora ulcera efficiunt; maximeque utilia sunt, si cibi quoque secutum fastidium est. Themison muria dura quam asperrima sic utendum memoriæ prodidit.

Cibi vero esse debent, qui leniter ventrem adstringant. At ea, quæ urinam moveant, si id consecuta sunt, in aliam partem humorem avertendo, prosunt: si non sunt consecuta, noxam augent. itaque nisi in quibus prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est, aqua pura calida, vel ea, quæ ipsa quoque adstringat, dari debet: si non est, vinum leve, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia illa juverunt, vetusque jam vitium est, aquæ bene frigida potio assumpta ulcera adstringit, & initium secundæ valetudinis facit. Sed ubi venter suppressus est, proptinus ad calidam potionem revertendum est.

Solet autem interdum etiam putris fa-
nics,

nies, pessimique odoris descendere: solet & interdum purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa delui debet; tum deinde etiam infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum, minii gleba cum salis hemina contrita: sin minus, mista his aqua in alvum datur. At, si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent, quæ adstringant.

C A P. X I X.

De Levitate intestinorum.

15 **E**x torminibus interdum intestinorum lævitas oritur; qua continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, inconfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum præcipitat.

20 In hoc utique adhibere oportet compri-
mentia; quo facilius tenendi aliquid inte-
stinis vis sit. Ergo & super pectus ponatur
sinapi; exulcerataque cute, malagma, quod
humorem evocet: & ex verbenis decocta
25 in aqua desideat; & cibos potionesque assu-
mat, quæ alvum adstringunt; & frigidis
utatur perfusionibus.

Oportet tamen prospicere, ne, simul his
omnibus admotis, vitium contrarium per
30 immodicas inflationes oriatur. Paulatim
ergo firmari intestina debebunt, aliquibus
quotidie adjectis. Et cum in omni fluore
ventris, tum in hoc præcipue necessarium
est,

240 A. CORN. CELSI. Lib. 4.
est, non quoties libet desiderare; sed quoties
necesse est, ut hæc ipsa mora in consuetu-
dinem ferendi oneris intestina deducat.

Alterum quoque, quod æque ad omnes
similes effectus pertinet, in hoc maxime
servandum est; ut, cum pleraque utilia in-
suavia sint; qualis est plantago, & rubi, &
quicquid malicorio mixtum est, ea potissi-
mum ex his dentur, quæ maxime æger vo- 10
let. Deinde, si omnia ista fastidiet, ad ex-
citandam cibi cupiditatem, interponatur
aliquid minùs utile, sed magis gratum.
Exercitationes & fricationes huic quoque
morbo necessariæ sunt: & cum his sol, 15
ignis, balneum, vomitus, ut Hippocrati
visum est; etiam albo veratro, si cætera
parum proficiunt, evocatus.

C A P. X X.

De Lumbricis alvum occupantibus.

20

NONNUNQUAM autem lumbrici quo-
que occupant alvum; hique modo
ex inferioribus partibus; modo,
quod sæpius, ore redduntur. Atque inter- 25
dum latos eos, qui peiores sunt, interdum
teretes videmus.

Si lati sunt, aqua potui dari debet, in
qua lupinum, aut cortex mori decoctus
sit; aut cui adjectum sit contritum vel hys- 30
sopum, vel piperis acetabulum, scammo-
neæ paulum. Vel etiam pridie, cum multum
allium ederit, vomat. Posteroque die mali
punici

punicī tenues radicūlas colligat, quantum manu comprehendet ; easque contusas in aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit; huic adjiciat nitri paulum, & jejunos bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas portiones sumat talis aquæ ; vel muria duræ huic adjectæ ; tum desideat, subjecta calida aqua in pelve.

- 10 Si vero teretes sunt, qui pueros maxime exercent, & eadem dari possunt, & quædam leviora; ut contritum semen urticae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, vel mentha cum eadem, vel apsinthium deco-
- 15 ctum, vel hyssopum ex aqua mulsæ ; vel nasturtii semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium prodest; vel in alvum oleum subter dedisse.

C A P. X X I.

20

De Tenesmo.

- E**ST autem aliud levius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod *πνιγμός* Græci vocant. Id neque acutis neque longis morbis annumerari debet, cum facile tollatur, neque unquam per se jugulet. In hoc æque atque in torminibus frequens desidendi cupiditas est; æque dolor, ubi aliquid excernitur. De-
- 25 scendunt autem pituitæ mucisque similia; interdum etiam leviter subruenta; sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte cocta.

L

De

Desidere oportet in aqua calida; sæpiusque ipsum anum nutrire. cui rei plura medicamenta idonea sunt: butyrum cum rosa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id, quod *πτεροφάρμακον* Græci vocant, rosa liquatum; alumen lanæ circumdatum, & ita appositum. eademque ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt: eadem verbenæ decoctæ, ut inferiores partes foveantur. Alternis vero diebus aqua, alternis leve & austerum vinum bidendum est. Potio esse debet egelida & frigida propior: ratio victus talis, qualem ad tormina supra præcepimus. 15

CAP. XXII.

De Ventris fluxu.

LEVIOR etiam, dum recens, dejectio, ubi & liquida alvus, & sæpius quam ex consuetudine fertur. In qua interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus; idque pejus est. Sed uno die fluere alvum sæpe pro valetudine est: atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem, id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est, interdum enim tormina ac febriculas excitat, viresque consumit. 30

Primo die quiescere satis est; neque impetum ventris prohibere. Si per se desit, balneo uti, paulum cibi capere: si mansit, absti-

abstinere non solum à cibo, sed etiam à portione. Postero die, si nihilominus liquida alvus est, æque conquiescere; paululum adstringentis cibi sumere. Tertio die in balneum ire; vehementer omnia præter ventrem perfricare; ad ignem lumbos, scapulasque admoveere; cibis uti, sed ventrem contrahentibus; vino non multo, meraco.
10 Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam. Ex toto, donec conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur.

15 Alia via est, ubi velis suppressere, cœnare, deinde vomere: postero die lecto conquiescere, vesperi ungi, sed leviter: deinde panis circa selibram ex vino aminæo mero sumere; tum assum aliquid, maxime.
20 que avem; & postea vinum idem bibere aqua pluviali mixtum, idque usque quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores authores Asclepiades affirmavit, & quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quemque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur.

Interdum autem evenit, ut id malum;
30 pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere: deinde postero die vesperi tepido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum

meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis neque ambulatione, neque fricatione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo, prodest. neque enim ulla res magis intestina confirmat.

Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est, quod ex pomis fit. Vin-¹⁰ demixtæ tempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala silvestria. si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhæpia: hisque adjicienda sunt cotonea, & cum¹⁵ ipsis corticibus suis punica, sorba, &, quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant: tum deinde ea musto implenda est; coquendumque id, donec omnia, quæ indita sunt,²⁰ liquata, in unitatem quandam coeant. Id gustui non insuave est: &, quandocunque opus est, assumptum leniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. duo aut tria cochlearia uno die sumpsisse, satis est. Al-²⁵ terum valentius genus: myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque cyathum sorbere. Tertium, quod quandocunque fieri potest, malum punicum excavare,³⁰ exemptisque omnibus seminibus, membranas, quæ inter ea fuerunt, iterum conjicere; tum infundere cruda ova, rudiculaq; misce-

miscere : deinde malum ipsum super prunam imponere ; quod , dum humor intus est , non aduritur : ubi siccum esse cœpit ,
5 remove oportet, extractumque cochleari , quod intus est , edisse. Hoc , aliquibus adjectis , majus momentum habet. Itaque etiam in piperatum conjicitur , misceturque cum sale & pipere , esturque ex his.
10 Edenda est pulcicula etiam , cum quâ paulum ex favo vetere coctum sit, Et lenticula cum malicorio cocta , rubique cacumina in aqua decocta , & ex oleo atque aceto assumpta , efficacia sunt : ut & ea aqua , in
15 quâ vel palmulæ , vel malum cotoneum , vel arida forba , vel rubi decocti sunt , potata. quod genus significo , quoties portionem dandam esse dico, quæ adstringat. Triticum quoque hemina in vino aminæo auster
20 decoquitur ; idque triticeum jejuno ac sitienti datur ; superque id vinum id sorbetur. quod jure valentissimis medicamentis annumerari potest. Atque etiam potui datur vinum signinum , vel resina-
25 tum austerum , vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus , seminibusque suis puniceum malum , vinoque tali miscetur : idque vel merum sorbet aliquis , vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti ,
30 nisi in vehementibus malis , supervacuum est.

CAP. XXXII.

De Vulvæ morbo.

Ex vulva quoque foeminis vehemens & malum nascitur; proximèque ab stomacho, vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimatur, ut tanquam comitiali morbo prostratus. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi 10 vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est. Id vitium quibusdam foeminis crebro revertens perpetuum evadit.

Ubi incidit, si satis virium est, sanguis 15 missus adjuvat: si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut jacet aut alioqui jacere consuevit, admoveere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex 20 his, quæ foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquæ frigidæ perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel quodlibet calidum & humidum catapla- 25 sma, naturalibus pube tenus impositum. Inter hæc etiam perfricare coxas, & poplites oportet.

Deinde, ubi ad se rediit, circumcidendum vinum est in totum annum, etiam si 30 casus idem non revertitur. Fricatione quotidie utendum totius quidem corporis, præcipue vero ventris, & poplitum. Cibus
ex

ex media materia dandus. Sinapi super
 mum ventrem tertio quoque aut quarto
 die imponendum, donec corpus rubeat.

Si durities manet, mollire commode
 videtur solanum in lac demissum, deinde
 contritum, & cera alba atque medulla cer-
 vina cum irino; aut sebum taurinum vel
 caprinum cum rosa mistum. Landum po-
 tui etiam vel castoreum est, vel git, vel
 anethum. Si parum pura est, purgetur
 junco quadrato. Si vero vulva exulcerata
 est, ceratum ex rosa fiat: etiam recens suil-
 la adeps, & ex ovis album misceatur, idque
 15 apponatur; vel album ex ovo cum rosa
 mistum adjecto, quo facilius consistat,
 contritæ rosæ pulvere. Dolens vero vulva
 sulphure suffumigari debet.

At, si purgatio nimia mulieri nocet, re-
 20 medio sunt cucurbitulæ, cute incisa, ingui-
 nibus vel etiam sub mammis admotæ. Si
 maligna purgatio est, subjicienda sunt *
 coercentia. Id faciunt etiam albæ violæ, ni-
 grum papaver cum melle assumptum, &
 25 gummi cum trito semine apii liquatum, &
 cum cyatho passii datum.

Præter hæc, in omnibus vulvæ dolori-
 bus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus
 fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamo-
 30 mo, casia, similibusque. Idemque etiam
 decocta lentiscus præstat. Si tamen into-
 lerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam
 sanguinis detractio apta est; aut certe coxis

admotæ cucurbitulæ cute incisa.

2. *De Urinæ nimia profusione.*

At cum urina super potionum modum mingitur, & jam sine dolore profluens ma-
ciem & periculum facit, si tenuis est, opus
est exercitatione & fricatione, maximeque
in sole, vel ad ignem. Balneum rarium esse
debet, neque longa in eo mora: cibus com-
primens; vinum austerum meracum; per æ-
statem, frigidum; per hiemem, egeli-
dum; sed tantum, quantum minimum sit.
Infima alvus quoque vel ducenda vel lacte
purganda est. Si crassa urina est, vehe-
mentior esse debet & exercitatio, & frica-
tio: longior in balneo mora: cibus opus est
teneris: vinum idem. In utroque morbo
vitanda omnia sunt, quæ urinam movere
consuerunt.

C A P. X X I V.

20

*De Seminis nimia ex naturalibus
profusione.*

EST etiam circa naturalia vitium, ni-
mia profusio seminis. quod sine vene-
re, sine nocturnis imaginibus sic fer-
tur, ut, interposito spatio, tabe hominem
consumat.

In hoc affectu salutare sunt vehemen-
tes fricationes, perfusiones, natationesque
quam frigidissimæ: neque cibi, nec potio,
nisi frigida assumpta. Oportet autem vita-
re cruditates, & omnia instantia: nihilque

cx

ex his assumere, quæ contrahere semen videntur; qualia sunt, filigo, simila, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes aqua, decocta ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare; præcipueque ex aceto.

10 Vitare autem oportet rutam, & ne supinus dormiat.

C A P. X X V.

De Coxarum morbis.

- 15 **S**UPEREST, ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. Initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit: isque hominem sæpe debilitat, & quosdam non
- 20 dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos morbos vi pestifera huc se inclinat: quod ut alias partes liberat, sic hanc ipsam quoque affectamprehendit.
- 25 Fovendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur, aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparidis cortex concisus; vel lolii farina ex vino diluto cocta, & mista cum arida
- 30 fecce. quæ quia refrigerant, imponere noctu malagmata commodius est. Inulæ quoque radix confusa, & postea ex vino austero
- L 5.
- cocta,

cocta, & late super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido & humido utendum est.

Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendæ sunt cucurbitulæ: movenda urina: alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, & in uteri quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus ferramentis exulcerare. Eriatione quoque utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea, quæ coeundo nocuerunt, digerantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis: si est, cæteris partibus adhibenda est. Cum vero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis evoceatur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc opitulamur, conquiescat.

C A P. XXVI.

De Genuum dolore.

COXIS proxima genua sunt. in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In iisdem autem cataplasmatibus cucurbitulisque præsidium est: sicut etiam, cum in humeris, aliisque commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem ejusmodi dolores, ubi invaseraverunt, vix citra unctionem finiuntur.

C A P.

CAP. XXVII.

*De Manuum & pedum articulo-
rumque vitiis.*

IN manibus pedibusque articulorum vitia frequentiora longioraque sunt. Quæ in podagricis chiragricisve esse con-
fuerunt, ea raro vel castratos, vel pueros
10 ante sceminae coitum, vel mulieres, nisi
quibus menstrua suppressa sunt, tentant.
Ubi sentire cœperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam
15 valetudinem bonam præstat. Quidam
etiam, cum asinino lacte poto ex toto se
eluisent, in perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam, cum toto anno à vino, mul-
so, venere sibi temperassent, securitatem
20 totius vitæ consecuti sunt. idque utique
post primum dolorem servandum est,
etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo
ejus facta est, potest quidam aliquis esse se-
curior his temporibus, quibus dolor se re-
25 misit: majorem vero curam adhibere de-
bent hi, quibus id revertitur. quod fere
vere autumnove fieri solet.

Cum verò dolor non urget, mane ge-
stari debet; deinde ferri, aut inambula-
30 tione leni se dimovere &, si podagra est,
interpositis temporibus exiguis, invicem
modo sedere, modo ingredi; tum, antequam
cibum capiat, sine balneo, loco calido le-
niter

niter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam moventibus, quotiesque plenior est, evomere. f

Ubi dolor vehemens urget, interest, sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcaluerit. Nam, si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram ferve- 10
facere oportet, deinde in pelvem conjicere, & cum jam homo pati potest, pedes demittere superque pallam dare, & vestimento tegere; paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infun- 15
dere, ne calor intus destituat; ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci radicem ex vino coctam. Si vero tumor calorque est, utilioraque sunt refrigerantia, recteque in aqua 20
quam frigidissima articuli continentur; sed neque quotidie, neque diu fiat, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea trans- 25
eundem, quæ sic reprimunt, ut emolliant.

Si major est dolor, papaveris cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit: vel ceræ & adipis suillæ tantundem una liquandum, 30
deinde his vinum miscendum, atque ubi, quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde aliud imponendum est.

Si

Si vero tumores etiam obcalluerunt, & dolent, levat spongia imposita, quæ subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus pedibusque malagmata. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod sine tumore est, fovere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortex, vel cucumeris silvestris radix decocta sit; tum inducere articulis crocum cum succo papaveris & ovillo lacte.

- 15 At si tumor est, foveri quidem debet aqua egelida, in quæ lentiscus, aliave ex reprimentibus verbena decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui contritæ herbæ muralis succus sit adjectus. Lapis etiam, qui carnem edit, quem *καπνιφά-
λοι* Græci vocant, excisus sic, ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Aſſo sepulchra faciunt. Et lapidi Aſſo gratia est adjuvandum.

- Ubi dolor & inflammatio se remiserunt, (quod intra dies triginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abſtinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam cum acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equigare podagricis quoque alienum est.

Quibus

Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori superfit: & crebriore vomitu, 5 & , si quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum evidens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri.

C A P. XXVIII.

De Refectione convalescentium à morbo. 15

Ex quocumque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere: circa tertiam horam leniter unctis manibus corpus permulcere. 20 Deinde delectationis causa, quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione. Tum gestari diu: multa fricatione uti: loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Ubi triduo quadriduo ve vinum bibit, uno aut 25 etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut mature vires suas recipiat. Cum vero ex toto convaluerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinate 30 aget. Paulatim ergo debet, omiſſis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo vivat.

LIBER QUINTUS.

P R Æ F A T I O.

DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subvenit. nunc transeundum est ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se *iatridæ* nominaverunt; præcipue amen Herophilus, deductique ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus sine his urarent. Multaque etiam de facultativis medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreæ, vel Apollonii, qui Mus cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte A-
clepiades non sine causa sustulit; &, cum omnia fere medicamenta stomachum læant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire convenit, quod omnes medicinæ partes ita connexas sint, ut ex toto separari non possint; sed ab uno nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quæ præcipue

cipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mista; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & misturas eorum: quo minor ipsam curationem exsequentibus mora sit. 10

C A P. I.

De simplicibus facultatibus quarumcumque rerum, ex quibus medicamenta sunt:

*& primo de his, quæ Sanguinem
supprimunt.* 15

SANGUINEM supprimunt, atramentum sutorium, quod Græci χάλκιον appellat, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama & ferri & æris; atque hujus quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris. 20

C A P. II.

Quæ vulnus glutinent.

GLUTINANT vulnus, myrrha, thus, 30
gummi, præcipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album,

butum, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana uccida, si levis plaga est: etiam aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod *ῥιζὸν* vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum sutorium.

C A P. I I I.

Quæ concoquant, & moveant pus.

5 **C**ONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sebum, adeps, oleum.

C A P. I V.

10 *Quæ aperiant vulnera.*

VULNERA aperiunt tanquam ora in corporibus, quod *ἀνασπῆ* Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, juncus quadratus, pulegium, flos
25 albæ violæ, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

30 C A P. V.

Quæ purgent.

PURGANT, ærugo, auripigmentum, quod *ἀραινὸν* à Græcis nominatur (huic autem
tem

pite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaracha, uva taminia, chrysocolle, ochra, & alumen scissile, ovillum stercus, œnanthe.

CAP. IX.

Quæ crustas ulceribus inducant.

EADEM fere crustas ulceribus tanquam 10
igne adustis inducunt, sed præcipue
chalcitis, utique si cocta est, flos æris,
æruugo, auripigmentum, misy, & id quo-
que magis coctum.

CAP. X.

Quæ crustas ulceribus resolvant.

CRUSTAS vero has resolvit, farina tri-
ticea cum ruta, vel porro, aut lenti-
cula, cui mellis aliquid adjectum est. 20

CAP. XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua par-
te corporis coierunt.*

AD discutienda vero ea, quæ in cor- 25
poris parte aliqua coierunt, ma-
xime possunt, abrotonum, hele-
nium, amaracus, alba viola, mel, lilium,
sampsucus, cyperus, lac, fertula campana,
serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola 30
purpurea, narcissus, rosa, crocum, prasium,
juncus quadratus, nardum, cinnamomum,
cassa, ammoniacum, cera, resina, uva ta-
minia,

minia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur.

C A P. XII.

Quæ evocent, & educant.

- 10 **E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex, 15 farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

C A P. XIII.

Quæ exasperata levent.

- 20 **L**EVANT id, quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

C A P. XIV.

- 25 *Quæ carnem nutriant, & ulcus impleant:*

CARNEM alunt, & ulcus implent, resina pinea, ochra Artice, mel, asteriace, cera, butyrum.

C A P. XV.

- 30 *Quæ molliant.*

MOLLIUNT, æs combustum, terra Eretria, nitrum, papaveris lachry-

cocta, & late super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido & humido utendum est.

Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendæ sunt cucurbitulæ: movenda urina: alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, & in uteri quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus ferramentis exulcerare. Fricatione quoque utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea, quæ coeundo nocuerunt, digerantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis: si est, cæteris partibus adhibenda est. Cum vero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis evoce-
tur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc opitulamur, conquiescat.

C A P. XXVI.

De Genuum dolore.

COXIS proxima genua sunt. in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In iisdem autem cataplasmatibus cucurbitulisque præsidium est: sicut etiam, cum in humeris, aliisque commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix citra unctionem finiuntur.

C A P.

CAP. XXVII.

*De Manuum & pedum articulo-
rumque vitiis.*

IN manibus pedibusque articulorum vitia frequentiora longioraque sunt. Quæ in podagricis chiragricisve esse confuerunt, ea raro vel castratos, vel pueros ante foeminæ coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant.

Ubi sentire cœperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinem bonam præstat. Quidam etiam, cum asinino lacte poto ex toto se eluissent, in perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam, cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitæ consecuti sunt. idque utique post primum dolorem servandum est, etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo ejus facta est, potest quidam aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor remisit: majorem vero curam adhibere debent hi, quibus id revertitur. quod fere vere autumnove fieri solet.

Cum vero dolor non urget, mane gestari debet; deinde ferri, aut inambulatione leni se dimovere &, si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi, tum, antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido le-

niter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam moventibus, quotiesque plenior est, evomere. §

Ubi dolor vehemens urget, interest, sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcaluerit. Nam, si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram ferve- 10
facere oportet, deinde in pelvem conjicere, & cum jam homo pati potest, pedes demittere superque pallam dare, & vestimento tegere; paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infun- 15
dere, ne calor intus destituat; ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci radicem ex vino coctam. Si vero tumor calorque est, utilioraque sunt refrigerantia, recteque in aqua 20
quam frigidissima articuli continentur; sed neque quotidie, neque diu fiat, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea transf- 25
eundem, quæ sic reprimunt, ut emolliant.

Si major est dolor, papaveris cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit: vel ceræ & adipis suillæ tantundem una liquandum, 30
deinde his vinum miscendum, atque ubi, quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde aliud imponendum est.

Si

Si vero tumores etiam obcalluerunt, & dolent, levat spongia imposita, quæ subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus pedibusque malagmata. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod sine tumore est, fovere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortex, vel cucumeris silvestris radix decocta sit; tum inducere articulis crocum cum succo papaveris & ovillo lacte.

At si tumor est, foveri quidem debet aqua egelida, in quæ lentiscus, aliave ex reprimentibus verbena decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui contritæ herbæ muralis succus sit adjectus. Lapis etiam, qui carnem edit, quem *σπερματός* Græci vocant, excisus sic, ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Asso sepulchra faciunt. Et lapidi Asso gratia est ad juvandum.

Ubi dolor & inflammatio se remiserunt, (quod intra dies triginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam cum acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est.

Quibus

Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes repleret: cum evidens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri.

C A P. XXVIII,

De Refectione convalescentium à morbo. 15

Ex quocumque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere: circa tertiam horam leniter unctis manibus corpus permulcere. 20 Deinde delectationis causa, quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione. Tum gestari diu: multa fricatione uti: loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Ubi triduo quatrduove vinum bibit, uno aut 25 etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut mature vires suas recipiat. Cum vero ex toto convaluerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinate 30 ager. Paulatim ergo debet, omissis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo vivat.

LIBER QUINTUS.

PRÆFATIO.

DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subvenit. nunc transeundum est ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se *iatridæ* nominaverunt; præcipue amen Herophilus, deductique ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus sine his urarent. Multaque etiam de facultativis medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andrea, vel Apollonii, qui Mus cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Aclepiades non sine causa sustulit; &, cum omnia fere medicamenta stomachum lænant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire convenit, quod omnes medicinæ partes ita connexas sint, ut ex toto separari non possint; sed ab uno nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quæ præcipue

cipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mista; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & misturas eorum: quo minor ipsam curationem exsequentibus mora sit. 10

C A P. I.

De simplicibus facultatibus quarumcumque rerum, ex quibus medicamenta sunt:

*& primo de his, quæ Sanguinem
supprimunt.* 15

SANGUINEM supprimunt, atramentum sutorium, quod Græci χάλκιον appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama & ferri & æris; atque hujus quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris. 20

C A P. II.

Quæ vulnus glutinent.

GLUTINANT vulnus, myrrha, thus, 30
gummi, præcipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album,

album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana succida, si levis plaga est: etiam aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod *κίρσις* vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum sutorium.

C A P. I I I.

Quæ concoquant, & moveant pus.

15 **C**ONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sebum, adeps, oleum.

C A P. I V.

20 *Quæ aperiant vulnera.*

VULNERA aperiunt tanquam ora in corporibus, quod *ἀνασπῆν* Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, pana-
25 *ciæ*, juncus quadratus, pulegium, flos alba violæ, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

C A P. V.

Quæ purgent.

30 **P**URGANT, ærugo, auripigmentum, quod *ἀραισιζόν* à Græcis nominatur (huic au-
tem

rem & sandarachæ in omnia eadem vis,
 sed validius est) squama æris, pumex, iris;
 balsamum, styrax, thus, thuris cortex, re-
 sina, & pinea, & terebinthina liquida, cenan-
 the, lacerti stercus, sanguis columbæ, &
 palumbi, & hirundinis, ammoniacum,
 bdellium (quod in omnia idem, quod am-
 moniacum, potest; sed hoc valentius est)
 abrotonum, ficus arida, coccum gnidium, 10
 scobis eboris, omphacium, radícula, coa-
 gulum, sed maxime leporinum (cui eadem,
 quæ cæteris coagulis, facultas, sed utique
 validior est) fel taurinum, vitellus crudus,
 cornu cervinum, gluten, mel crudum, 15
 misy, chalcitis, crocum, uva taminia, spu-
 ma argenti, galla, squama æris, lapis hæma-
 tites, minium, costum, sulphur, pix cruda,
 sebum, adeps, oleum, ruta, porrum lenti-
 cula, erum. 20

CAP. VI.

Quæ rodant.

RODUNT, alumen liquidum, sed magis
 rotundum, ærugo, chalcitis, misy, 25
 squama æris, sed magis rubri, æs
 combustum, sandaracha, minium sinopi-
 cum, casia, balsamum, myrrha, thuris cor-
 tex, galbanum, resina terebinthina liquida,
 piper utrunque, sed rotundum magis, car- 30
 damomum, auripigmentum, calx, nitrum,
 & spuma ejus, apii semen, narcissi radix,
 omphacium, alcyonium, oleum ex amaris
 nuci-

nucibus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uva taminia, cinnamomum, styrax, rutæ semen, resina, narcissi semen, sal, nuces amaræ, ut oleum earum, atramentum futorium, chrysocola, concharum cinis.

C A P. V I I.

10 *Quæ exedant corpus.*

EXEDUNT corpus acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chrysocola, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, eruca, sandaracha, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ *πρόβουλον* à Græcis
20 nominatur, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites & phrygius, & asius, & scissilis, mysi, vinum, acetum.

25 C A P. V I I I.

Quæ adurant.

ADURUNT, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama ægris, fex combusta, myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum gnidium, allium, diphryges, lac utrumque (quod proximo ca-
pite

260 A. CORN. CELSI Lib. 5.
pite supra comprehensum est) veratrum &
album & nigrum, cantharides, corallium,
pyrethrum, thus, salamandra, eruca, san-
daracha, uva taminia, chrysocolia, ochra, &
alumen scissile, ovillum stercus, ænanthe.

C A P. IX.

Quæ crustas ulceribus inducant.

EADEM fere crustas ulceribus tanquam 10
igne adustis inducunt, sed præcipue
chalcitis, utique si cocta est, flos æris,
ærugo, auripigmentum, misy, & id quo-
que magis coctum.

C A P. X.

Quæ crustas ulceribus resolvant.

CRUSTAS vero has resolvit, farina tri-
ticea cum ruta, vel porro, aut lenti-
cula, cui mellis aliquid adjectum est. 20

C A P. XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua par-
te corporis coierunt.*

AD discutienda vero ea, quæ in cor- 25
poris parte aliqua coierunt, ma-
xime possunt, abrotonum, hele-
nium, amaracus, alba viola, mel, lilium,
sampsucus, cyperus, lac, fertula campana,
serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola 30
purpurea, narcissus, rosa, crocum, prasium,
juncus quadratus, nardum, cinnamomum,
cassa, ammoniacum, cera, resina, uva ta-
minia,

minia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur.

C A P. XII.

Quæ evocent, & educant.

- 10 **E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex,
15 farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

C A P. XIII.

Quæ exasperata levant.

- 20 **L**EVANT id, quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

C A P. XIV.

- 25 *Quæ carnem nutriant, & ulcus impleant.*

CARNEM alunt, & ulcus implent, resina pinea, ochra Artice, mel, asteriace, cera, butyrum.

C A P. XV.

Quæ molliant.

- 30 **M**OLLIUNT, æs combustum, terra Eretria, nitrum, papaveris lachry-

chryma, ammoniacum, bdellium, cera, sebum, adeps; oleum, ficus arida, sesamum, fertula campana, narcissi & radix & semen. rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, 5 amaræ nuces, medulla omnis, stimmi, pix, cochlea cocta, cicutæ semen, plumbi re- trimentum, *σπερμα μαλύβδ* Græci vo- cant, panaces, cardamomum, galbanum, re- sina, uva taminia, styrax, iris, balsamum, 10 sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

CAP. XVI.

Quæ cutem purgent.

CUTEM purgat mel, sed magis, si est 15 cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine.

CAP. XVII.

De misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum.

EXPOSITIS simplicibus facultatibus, 25 dicendum est, quemadmodum misce- antur, quæque ex his fiant. Miscentur autem varie, neque hujus ullus modus est, cum ex similibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum ma- 30 teria non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt; quæ comprehendi si possent, tamen esset supervacuum. Nam

Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt; vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam sic, ut
 10 tamen, quæ magis communia sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis commodata sunt, in ipsorum locum deferam.

Sed & ante sciri volo, in uncia pondus
 15 denariorum septem esse. Unius deinde denarii pondus dividi à me in sex partes, id est sextantes, ut idem in sextante denarii habeam, quod Græci habent in eo, quem ἡβόλον appellant. Is ad nostra pondera re-
 20 solatus paulo plus dimidio scrupulo facit.

2. Quid Malagma, & Emplastrum, & Pastillum inter se differant.

Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos τεχνίσματα Græci vocant, cum
 25 plurima eadem habeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam
 30 super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt; ne lædant vulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum au-
 tem

tem & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. Arida medicamenta per se teruntur: deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. Ea vero, quæ liquari possunt, ad ignem si-
mul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui, ut vino vel aceto, coguntur, & rursus coacta, inarescunt: atque, ubi utendum est, ejusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

CAP. XVIII.

De Malagmatis.

25

1. *Malagma adversus calidas podagras.*

HIS cognitis, primum malagmata subijciam; quæ fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa re-
perta. Est tamen, quod refrigerare potest; 30
ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ & alterius, coriandri seminis, cicutæ; lachymæ aridæ, gummi, singulorum

lorum plenum acetabulum, cerati elori, quod *πικλυδρῶν* Græci vocant, selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt, quæ *ἐπιπραστικὰ* vocantur: pleraque certis partibus membrorum accommodata sunt.

2. *Malagma ad materiam extrahendam.*

- 10 **S**i materia extrahenda est, ut in hydrospico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum p. *. ceræ p. *. Aut in quo hæc sunt: æri-
15 ginis rasæ, thuris, singulorum p. ii. *. ammoniaci salis p. vi. *. squamæ æris, ceræ, singulorum p. viii. *. resinæ aridæ p. xii. *. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio, & melle p. ii. *.

20 3. *Malagma ad jecur dolens.*

- Si jecur dolet, id in quo est balsami lachrymæ p. xii. *. costi, cinnamomi, cassiæ corticis, myrrhæ, croci, junci rotundi, balsami seminis, iridis illyricæ, cardamomi,
25 amomi, nardi, singulorum. p. xvi. *. Quibus adjicitur nardinum unguentum, donec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem recentis usus est: si vero servandum est, resinæ terebinthinæ p. xvi. *. ceræ p. x. *. ex
30 vino leni contunduntur, & cum eo miscentur.

4. *Malagma ad lienem.*

- At, si lienis torquet, glandis, quam *μυρ-
M βάλανον*

βάλανον Græci vocant, cortex & nitrum paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quam acerrimo: ubi cerati crassitudinem habet, linteo, ante in aqua frigida madefacto, inlinitur, & sic imponitur, supraque farina ordeacea injicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat: satiusque est id bis, aut ter fieri. 10

5. *Malagma commune pluribus.*

Commune autem & jecinori, & lieni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lyfias composuit ex his: opopanacis, galbani, resinæ, singulorum P. ii. *. ammoniaci, bdellii, ceræ, sevi taurini, iridis aridæ P. i i i i. *. cachryos acetabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita irino 20 unguento temperantur.

6. *Malagma ad laterum dolorem.*

Ad laterum autem dolores compositio est Apollophanis: in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris fuliginis, singulorum 25 P. i v. *. bdellii, ammoniaci, iridis: sevi aut vitulini, aut caprini à renibus, visci, singulorum P. i v. *. Hæc autem omnem dolorem levat, dura emollit, mediocriter calefacit. 30.

7. *Ad idem Andrea.*

Ad idem valet Andreæ quoque malagma, quod etiam resolvit, humorem educit, pus

pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, & ad cicatricem perducit. Prodest impositum minutis majoribusque abscessibus: item articulis, & coxis, & pedibus dolentibus: item, si quid in corpore collisum est, reficit: præcordia quoque dura & inflata emollit: ossa extrahit: ad omnia denique valet, quæ adjuvare calor potest. Id
10 habet ceræ P. XI. *. visci, sycamini, quam alias sycomorum vocant, lachrymæ, singulorum P. I. *. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci thymiamatis; bdelli, iridis Illyricæ, cardamomi, xylobalsami,
15 thuris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, singulorum P. X. *. pyrethri, cocci Gnidii, spumæ nitri, salis ammoniaci, radicis aristolochiæ Creticæ, cucumeris agrestis radicis, resinæ terebinthinæ liquidæ, singu-
20 lorum P. XX. *. quibus adjicitur unguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

8. *Malagmata ad resolvenda, quæ adstricta sunt; & mollienda, quæ dura sunt;*

25 *& digerenda, quæ coeunt.*

Præcipuum vero est ad resolvenda, quæ adstricta sunt, mollienda, quæ dura sunt, digerenda, quæ coeunt, id, quod ad Polyarchum authorem refertur. Habet junci
30 quadrati, cardamomi, thuris fuliginis, amomi; ceræ, resinæ liquidæ, pares portiones.

9. *Aliud malagma ad eadem*

Aliud ad eadem Nilei : crocomagmatis, quod quasi recrementum ejus est, P. IV. *. ammoniaci thymiamatis, ceræ, singulorum P. XXX. *. ex quibus duo priora ex acceto teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum omnia junguntur.

10. *Malagma Moschi ad molliendum.*

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet Galbani unciam, thuris fuliginis P. III. *. ceræ, ammoniaci thymiamatis trientes, picis aridæ P. II. *. aceti heminas tres.

11. *Malagma Medici ad digerenda, quæ coeunt.* 15

Fertur etiam ad dirigenda, quæ coeunt, sub authore Medo: quod habet ceræ P. III. *. panacis P. *. semis, squamæ æris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum P. I. *. plumbi combusti P. I. *. & semis. 20

12. *Malagma Panthemii ad eadem.*

Ad eadem Panthemus utebatur, calcis, P. *. semis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum P. I. *. sevi bubuli P. II. *. & semis. 25

13. *Malagma ad strumas.*

Ad strumam multa malagmata invenio. Credo autem, quo pejus id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quæ in personis varie respondent. 30 Andreas author est, ut hæc misceantur: urticæ seminis P. I. *. piperis rotundi, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinæ

resinæ aridæ, singulorum p. iv. *. resinæ liquidæ, ceræ, pyrethri, piperis longi: lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti, quod *ἄνεργον* vocatur, pares portiones.

14. *Aliud Miconis ad idem.*

Hoc autem Miconis est: fecis aridæ, aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, finapis, cardamomi, radicis cucumeris silvestris, resinæ, singulorum p. iv. *. Quæ ex leni vino contunduntur.

15. *Aliud malagma ad idem valens.*

Expeditius ad idem fit, quod habet visci, 15 felini stercoris, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris p. i. *. lapidis, quem pyriten vocant, p. iv. *. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una, sulphuris 20 oris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

16. *Malagma ad strumam, & phymata.*

Arabis autem cujusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ *φύματα* vocan- 25 tur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. *. lapidis ejus, quem *πυρίτης* vocant, p. iv. *. quibus quidam adjiciunt sulphuris 30 p. ii. *.

17. *Malagma ad strumam, & tubera, & καρκινώδη.*

Est etiam proficiens in struma; & in his tube-

tuberibus, quæ difficulter concoquuntur;
& in his, quæ καρπινώδη vocantur, quod ex
his constat: sulphuris P. II. *. nitri P. IV. *.
myrrhæ P. VI. *. fuliginis thuris P. *. semis, 5
salis ammoniaci P. III. *. ceræ P. I. *.

18. *Malagma Protarchi ad parosidas, &
favum, & mala ulcera.*

Protarchus autem ad παρατίδες atque
tubercula, quæ μελικηρίδες, id est favi, vel 10
φύματα nominantur, item mala ulcera, pu-
micis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuli-
ginis, spumæ nitri, iridis, singulorum
P. VII. *. cum ceræ P. IX. *. miscebat, his-
que olei cyathum & dimidium adjiciebat. 15

19. *Malagma adversus panum, & phymata.*

At adversus panum, tum primum orien-
tem, quod φύγιθλον Græci vocant, & om-
ne tuberculum, quod φῦμα nominatur,
miscetur ochra, quæ Attice nominatur, 20
cum duabus partibus similæ, hisque, dum
contunduntur, subinde mel instillatur,
donec malagmatis crassitudo sit.

20. *Malagma adversus phymata.*

Discutit etiam omne tuberculum, quod 25
φύμα vocatur, id, quod habet calcis, spu-
mæ nitri, piperis rotundi, singulorum
P. I. *. galbani P. II. *. salis P. IV. *. quæ
excipiuntur cerato ex rosa facto.

21. *Malagma ad suppressendum omne, 30
quod abscedit.*

Suppressit quoque omne, quod absce-
dit, id, in quo est galbani, fabæ fressæ, sin-
gulo-

gulorum, P. I. *. myrrhæ, thuris, corticis ex radice capparis, singulorum, P. IV. *. Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adjecto.

22. *Malagma ad sanguinem suppressendum.*

At, si plus satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & liquidæ pineæ; item ex lentisuci, thuris, iridis, singulorum P. I I. *.

23. *Malagma ad carcinomata & phymata lenienda.*

Carcinomata vero & phymata commode his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ singulorum P. I. *. sevi taurini P. *. semis, fecis combustæ quam maxima portione, dum id siccius non faciat, quam esse malagma oportet.

24. *Malagma ad faciem contusam ejusque livorem.*

Quod si facie contusa livor subcruentus est, hæc compositio nocte & die imposita tollit Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum P. I I. *. bdellii, styracis, ammoniaci thymiamaris galbani, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis Illyricæ, ceræ, singulorum P. IV. *. Eidem faba quoque imposita proficit.

25. *Malagmata ἀνασπυλλῆα ad aperiendum.*

Sunt etiam quædam malagmata, quæ ἀνασπυλλῆα Græci vocant, quoniam ape-

riendi vim habent. Quale est, quod ex his constat : piperis longi, spumæ nitri, singulorum P. II. *. erysimi P. IV. *. quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ & aperiendæ sunt. Ejus generis, vehementiusque ex his est, quod habet calcis P. IV. *. piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum P. X. *. mellis P. III. *. olei heminam.

26. *Miconis malagma, ad resolvendum aperiendumque ac purgandum.* IO

Miconis quoque est, quod resolvit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, pari pondere; quibus tantum picis, & ceræ adjicitur, ut fiat cerasi crassitudo.

27. *Malagma ad ossa & nervos.*

Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his : sulphuris P. I. *. resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum P. II. *. thuris fuliginis P. VII. *. ficus aridæ quam pinguiissimæ, sevi taurini, singulorum P. VII. *. ceræ P. XII. *. iridis Macedonicæ P. VI. *. sesami frikti acetabulum. maximeque nervis & articulis malagma hoc convenit.

28. *Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

Euthylei quod est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγχύλας Græci nominant, conveniens, habet fuliginis thuris acetabulum, resinæ tantundem,

dem, galbani sine furculis fescunciam, ammoniaci, bdellii, singulorum P. *. ceræ P. *. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, 5 ammoniaci, galbani, nitri, singulorum P. XIV. *. resinæ liquidæ P. VI. *. ceræ P. XVI. *.

29. *Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

Ad dolores articulorum Sofagoræ : 10 plumbi combusti, papaveris lachrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, sevi, resinæ, ceræ par pondus.

30. *Chryssippi malagma ad idem valens.*

Est & Chryssippi : resinæ liquidæ, sandarachæ, piperis, singulorum P. XII. *. quibus ceræ paululum adjicitur.

31. *Ctesiphontis malagma ad idem valens & ad parotidas, & phymata, & strumam.*

Ctesiphontis : ceræ Creticæ, resinæ te- 20 rebinthinæ, nitri quam ruberrimi, singulorum P. *. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, & cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Prodest 25 vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum.

32. *Malagma ad articulos.*

Ad articulos, fici quoque aridæ partem 30 nepetæ mistam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit.

33. *Malagma Aristonis, adversus podagras, & recentia phymata, & omnes dolores.*

Eadem podagræ præsidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoque, quod habet nar- 5
di, cinnamomi, cassiæ, chamæleontis, junci rotundi, singulorum P. VIII. *. sevi caprini ex irino liquati P. XX. *. iridis P. I. *. quæ in aceto quam acerrimo jacere per XX. dies debet. Idem autem etiam recentia 10
phymata doloresque omnes discutit.

34. *Theoxeni malagma ad pedum dolores.*

At Theoxenus ad pedum dolores, sevi à renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam 20
imponebat; tum superinjiciebat animoniacum thymiama in aceto liquatum.

35. *Numenii malagma ad podagram, ceterosque articulos induratos.*

At Numenius podagram, ceterosque 15
articulos induratos hoc mollicebat, abrotoni, rosæ aridæ, papaveris lachrymæ, singulorum P. III. *. resinæ terebinthinæ P. IV. *. thuris, spumæ nitri, singulorum P. VIII. *. iridis, aristolochiæ, singulorum 25
P. XII. *. ceræ. P. III. *. quibus adjicitur cedriæ cyathus unus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius.

36. *Dexii malagma, si quando callus in articulis increvit.*

Si quando autem in articulis callus in- 30
crevit, Dexius docuit imponere, calcis P. IV. *. cerussæ P. VIII. *. resinæ pineæ P. XX. *.

xx. *. piperis grana xxx. ceræ P. 11. *.
Quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

5

C A P. X I X.

De Emplastris.

Ex emplastris autem nulla majorem
usum præstant, quam quæ cruentis
10 protinus vulneribus injiciuntur. *ἤμα*
μα Græci vocant. Hæc enim reprimunt
inflammationem, nisi magna vis eam cogit;
atque tum illius quoque impetum minuunt,
& glutinant vulnera, quæ id non
15 patiuntur, & cicatricem iisdem inducunt.
Constant autem ex medicamentis non pingui-
bus ideoque *ἀλίπαντα* à Græcis nominantur.

1. *Barbarum emplastrum nigrum quod cruentis protinus vulneribus injicitur.*
20

Optimum ex his est, quod Barbarum nominatur. Habet enim æruginis rasæ P. xii. *. spumæ argenti P. xx. *. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum P. i. *. quibus adjiciuntur olei & aceti singulæ heminæ.

2. *Choacæ emplastrum nigrum, ad idem valens.*

Alterum ad idem, quod choacæ vocant, habet spumæ argenti P. x. *. resinæ aridæ
30 tantundem. sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est. qui fere talis sit, ex pice atque resina: ut ex bitumine nigerrimus;

ex æruginē, aut æris squama, viridis; ex minio ruber; ex cerussa, albus.

3. *Rasilicon emplastrum nigrum ad idem.*

Paucæ admodum compositiones sunt, 5
in quibus aliquid misturæ varietas novat.
Ergo id quoque nigrum est, quod βασιλι-
κὸν nominatur. Habet opopanacis P. I. *.
galbani P. II. *. picis, & resinæ, singulo-
rum P. X. *. olei dimidium cyathum. 10

4. *Smaragdinum emplastrum ad idem.*

At, quod perviride est, smaragdinum ap-
pellatur. in quo sunt resinæ pineæ P. III. *.
ceræ P. I. *. æruginis, P. *. semis, thuris
pollinis P. II. *. olei tantundem, & aceti, 15
quo pollen & ærugo in unum cogantur.

5. *Emplastrum rufum ad idem.*

Est etiam coloris fere ruffi, quod cele-
riter ad cicatricem vulnera perducere vi-
detur. Habet thuris P. I. *. resinæ P. II. *. 20
squamæ æris P. III. *. spumæ argenti P. XX.
*. ceræ P. C. *. olei heminam.

6. *παρακολλητικὸν emplastrum ad idem.*

Præterea est, quod παρακολλητικὸν à glu-
tinando vocant. Constat ex his: bituminis, 25
aluminis scissilis P. IV. *. spumæ argenti
P. IV. *. & olei veteris hemina.

7. *Cephalicum emplastrum Philotæ,
capiti conveniens.*

Præterea sunt quædam generis ejusdem, 30
quæ, quia capitibus fractis maxime con-
veniunt, κεφαλικά à Græcis nominantur.
Philotæ compositio habet terræ Etruriæ,
chalci-

chalcitidis, singulorum P. IV. *. myrrhæ, æris combusti, singulorum P. X. *. ichthyocollæ P. VI. *. æruginis rasæ, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorum P. VII. *. squamæ æris P. XX. *. thuris masculi P. I. *. ceræ P. I. *. rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

10 8. *Emplastrum viride ad idem valens.*

Aliud ad idem viride. Habet æris combusti, squamæ æris, myrrhæ, ichthyocollæ, singulorum P. VI. *. misyos crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum P. VII. *. ceræ P. VI. *. olei heminam, aceti quod satis sit.

9. *Tetrapharmacum emplastrum, ad pus movendum.*

Puri autem movendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est, & τετραφάρμακον à Græcis nominatur. Habet partes portiones ceræ, picis, resinæ, sevi taurini, si id non est, vitulini.

25 10. *Enneapharmacum emplastrum, ad pus movendum, & ad purgandum valens.*

Alterum ad idem, ἐννεαφάρμακον nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel bubula, œsypo, butyro. Quorum quoque pondera paria miscentur.

11. *Emplastra, quibus utriusque rei facultas est.*

Sunt autem quædam emplastra, quibus utrius-

utriusque rei facultas est. quæ, nisi singula habenda sit, meliora sunt. alias deteriora, nec, nisi cum utraque opus est, aut in singulis singulorum inopia, utenda veniunt: sed in copia rejicienda sunt; his potius adhibitis, quæ id proprie, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum: quod habet squamæ æris p. vi. *. thuris fuliginis p. xv. *. ammoniaci tantundem, resinæ terebinthinæ liquidæ p. xxv. *. sevi taurini tantundem, aceti heminas tres, olei 15 sextarium.

Judæi emp'astrum, fracto capiti accommodatum.

At interea, quæ fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod ad auctorem Judæum refertur. Constat ex his: salis p. iv. *. squamæ æris rubri, æris combusti, singulorum p. xii. *. ammoniaci thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singulorum p. vi. *. resinæ Colophonia, ceræ, sevi vitulini curati, singulorum p. xx. *. additur aceti sesquicyathus, olei minus cyatho. Quæ *παραπρωσπία* Græci appellant, nos curata vocamus, cum ex sevo puta omnes membranulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

12. *Emplastra ἰπποκρίδα.*

Sunt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum. quæ ipsa quoque ἰπποκρίδα nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, διὰ δαφνίδου appellatur. In eo est, resinæ terebinthinæ p. x. *. nitri, ceræ, picis aridæ, baccarum lauri, singulorum p. xx. *. olei paululum. Quoties autem
 10 tem baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

 15 13. *Aliud διὰ δαφνίδου ad extrahendum, & pus movendum.*

Aliud eodem nomine, quod puri quoque movendo est. Sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis, picis, ceræ, nitri, baccarum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ,
 20 pyrethri, pares portiones.

 14. *Philocratis emplastrum, ad extrahendum, & pus movendum.*

Præter hæc, est Philocratis: quod habet salis ammoniaci p. vii. *. aristolochiæ p.
 25 vii. *. ceræ, resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum p. xv. *. spumæ argenti p. xxxii. *. Quibus, ut pus quoque moveant, iridis p. iii. *. galbani p. vi. *. adjiciuntur.

 30 15. *Ῥοκῶδης emplastrum, ad extrahendum.*

Optimum tamen ad extrahendum est id, quod à similitudine sordium Ῥοκῶδης Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis,

iridis, propolis, bdellii, capitulorum punici mali, aluminis scissilis & rotundi, mysos, chalcitidis, atramenti sutorii cocti, opopanax, salis ammoniaci, visci, singulorum p. iv. *. aristolochiæ p. viii. *. squamæ æris p. xvi. *. resinæ terebinthinæ p. lxxv. *. ceræ, & sevi vel taurini vel hircini singulorum p. c. *.

16. *Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum: 10*

Hecatæo quoque autore emplastrum generis ejusdem fit ex his: galbani p. ii. *. fuliginis thuris p. iv. *. picis p. vi. *. ceræ, & resinæ terebinthinæ, singulorum p. viii. *. quibus paulum irini unguenti 5 miscetur.

17. *Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.**

Valensque ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p. viii. *. salis ammoniaci, p. vii. *. squamæ æris p. xvi. *. myrrhæ, thuris singulorum p. xviii. *. ceræ p. cl. *. resinæ Colophonix aut pineæ p. cxc. *. olei heminam, aceti sextarium. 23

18 *De emplastris exedentibus.*

Quædam autem sunt emplastra exedentia, quæ *συστήματα* Græci vocant. quale est id, quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum p. ii. *. squamæ æris p. i. *. ladani p. ii. *. aluminis tantundem, spumæ argenti p. iv. *.

19. *Emplastrum, quod exest corpus, & ossa resolvit,
& supercrescentem carnem coerces.*

Exest etiam vehementer corpus, atque
5 ossa quoque resolvit, & supercrescentem
carnem coerces id, quod habet spumæ ar-
genti, squamæ æris, uncias singulas; nitri
ignem non experti, lapidis Asii, aristolo-
chiae p. sextantes, ceræ, resinæ terebinthi-
10 næ, thuris, olei veteris, atramenti sutorii,
salis ammoniaci p. semis, æruginis rasæ p.
bessem, aceti scillitici heminam, vini ami-
næi tantundem.

20. *Emplastra adversus morsus, & alia
recentiora vulnera.*

Emplastrum Diogenis nigrum.

Sunt etiam adversus morsus quædam æ-
commodata; quale est Diogenis nigrum:
quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ
20 aridæ, singulorum p. xx. *. spumæ argenti
p. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squa-
mæ æris. p. iv. *. cerussæ, & æruginis rasæ,
singulorum p. viii. *. ammoniaci f. xii.
*. ceræ, resinæ pineæ, singulorum. p. xxv. *.
25 spumæ argenti p. c. *. olei sextarium. Aut in
quo sunt squamæ æris p. xiv. *. galbani p.
vi. *. cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum
p. viii. *. ammoniaci p. xii. ceræ, resinæ
pineæ, singulorum p. l.v. *. ex quibus spu-
30 ma argenti concoquitur.

21. *Ephesium emplastrum rubrum,
ad idem valens.*

Rubrum quoque emplastrum, quod E-
phic-

282 A. CORN. CELSI Lib. 5.
phesium vocatur, huc aptum est. Habet re-
finæ terebinthinæ P. II. *. galbani P. IV. *.
minii sinopici P. VI. *. thuris fuliginis P.
VI. *. ceræ P. VII. *. spumæ argenti P. XVI. 5
*. olei veteris heminam.

22. *Aliud emplastrum, ad idem valens.*

Item id, quod ex his constat; squamæ
æris, thuris fuliginis, singulorum P. IV. *.
galbani P. VI. *. salis ammoniaci P. XII. Z. *. IO
ceræ P. XXV. *. olei tribus heminis. Hæc au-
tem aliis quoque recentioribus vulneribus
recte imponuntur.

23. *Λευκὰ ἐμπλάστρα, non gravibus vulneribus
accommodata, & maxime senilibus.* 15

Sunt etiam alba lenia, λευκὰ Græci vo-
cant, fere non gravibus vulneribus accom-
modata, præcipueque senilibus. Quale est
quod habet cerussæ P. LII. *. sevi vitulini
curati, & ceræ, singulorum P. LVIII. *. 20
olei heminas tres, ex quibus ea cerussa co-
quitur.

24. *Elephantinum emplastrum.*

Aliud, quod habet cerussæ P. XX. *. ceræ.
P. I. V. *. olei heminam, aquæ sextarium. 25
Quæ quoties adjiciuntur cerussæ vel. spu-
mæ argenti, scire licet, illa ex his coquen-
da esse. Est autem ea percandida compo-
sitiō, quæ supra posita est, ideoque elephan-
tina nominatur. 30

25. *Lenia emplastra.*

Lenia quoque quædam emplastra sunt,
quæ λευκὰ fere Græci nominant; ut id
quod

quod habet minii P. IV. *. spumæ argenti
P. XXV. *. ceræ, & adipis suillæ, singulorum
P. XXXV. *. vitellos ovorum quatuor.

5 26. *Emplastrum lene.*

Alia compositio generis ejusdem: ceræ,
resinæ terebinthinæ, singulorum P. V. *.
cerussæ P. VII I. *. spumæ argenti, plumbi
retrimenti, (συνεχία μεγάλη Græci vo-
10 cant) singulorum P. X. *. cicini olei, & myr-
tei, singulorum heminæ tertia.

27. *Archagathi emplastrum lene.*

Alia, quæ ad authorem Archagathum
refertur: misyos cocti, æris combusti, sin-
15 gulorum P. IV. *. cerussæ coctæ. P. VI I I. *,
resinæ terebinthinæ P. X. *. spumæ argenti
P. VI. *.

28. *Emplastra ejusdem generis, ad leniendum apta.*

Etiamnum generis ejusdem: spumæ ar-
20 genti, ceræ, adipis suillæ, singulorum P.
XXV I I. *. vitelli cocti, rosæ hemina. Aut
compositio hæc: cerati ex oleo myrteo fa-
cti partes tres, adipis suillæ pars quarta,
paululum ex plumbi retrimento. Aut hæc
25 compositio: spumæ argenti selibra, ex olei
hemina, & aquæ marinæ altera, cocta do-
nec bullire desierit, cui paulum ceræ sit
adjectum. Aut hæc: pares portiones ceræ,
sevi, stibii, spumæ argenti, cerussæ.

30

CAP. XX.

De Pastillis.

*Et primo de his , qui ad recentia vulnera
glutinanda , sanandaque apti sunt.*

PASTILLI quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti. Qualis est , qui habet chalcitidis , misyos , spumæ 10 nitri , floris æris , gallæ , aluminis scissilis modice cocti , singulorum p. i. *. æris combusti , capitulorum mali punici , singulorum p. i i i. *. Hunc oportet diluere aceto , ac sic , ubi vulnus glutinandum est , illinere. 15 At , si nervosus aut musculosus is locus est , commodius est cerato miscere , sic ut illius octo partes , nona hujus sit.

1. *Alius pastillus ad glutinanda vulnera.*

Alius ad idem. Constat ex his : bitumi. 20 nis , aluminis scissilis , singulorum p. i. *. æris combusti p. iv. *. spumæ argenti p. xi. *. olei sextario.

2. *De Sphragide pastillo , quem Polyidæ confecit ad glutinandum vulnus.*

25

Sed longe Polyidæ celeberrimus est ; *σφραγίς* autem nominatur. Qui habet aluminis scissilis p. iv. *. atramenti futorii p. i i. *. myrrhæ p. v. *. aloes tantundem , capitulorum punici mali , fellis taurini , sin- 30 gulorum p. vi. *. quæ contrita vino austero excipiuntur.

3. *Pastil-*

3. *Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscænis partibus, inflammationesque eorum.*

5 Ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscænis partibus, inflammationesque eorum: chrysocollæ P. I. *. atramenti sutorii, aluminis scissilis, singulorum P. II. *. halicacabi corticis P. IV. *. minii P. VI. *. spumæ argenti P. XII. *. cerussæ P. XVI. *. quæ ex aceto coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

4. *Pastillus Andronis ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.*

15 Andronis vero est ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia: gallæ, atramenti sutorii, myrrhæ, singulorum P. I. *. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum P. II. *. capitulorum punici mali P. XXV. *. ex passo coactorum & cum usus exigit, aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est.

5. *Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum.*

25 Proprie autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum valet: æruginis P. II. *. myrrhæ P. IV. *. gummi P. VII. *. thuris P. XII. *. stibii, 30 lachrymæ papaveris, acaciæ, singulorum P. XVI. quæ ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

6. *Pastil-*

6. *Pastillus ad expellendum calculum ex vesica.*

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio: cassiæ, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, 5 dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habebant p. i. *. hique singuli quotidie mane jejuno dantur.

10

C A P. X X I.

De Pessis.

HÆC tria compositionum genera, id est, quæ in malagmatis, emplastris 15 pastillisque sunt, maximum præcipueque varium usum præstant. Sed alia quoque utilia sunt: ut ea quæ fœminis subiiciunt. πῶς Græci vocant. Eorum hæc proprietas est: medicamenta compo- 20 sita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

1. *Ad sanguinem evocandum*

Ad sanguinem autem evocandum, caucis duabus adjicitur nitri p. i. *. aut allii 25 semen conteritur, adjicitur myrrhæ paululum, & unguento susino miscetur. Aut cucumeris sylvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

2. *Ad vulvam molliendam.*

Ad vulvam molliendam, ovi vitellus, 30 & fœnum Græcum, & rosa, & crocum temperantur. Aut elaterii p. i i i. *. salis caprun-

tantundem, uvæ taminix p. vi. *. melle excipiuntur.

3. *Alia pessis compositio, ad idem valens.*

- 5 Aliud Boetho autore: quod habet croci, resinæ terebinthinæ, singulorum p. iv. *. myrrhæ p. iii. *. rosæ p. i. *. sevi vitulini p. iii. ceræ p. ii. *. miscentur.

4. *Ad inflammationes vulvæ Numenii pessus.*

- 10 Optima autem adversus inflammationes vulvæ Numenii compositio est, quæ habet croci p. iii. *. ceræ p. i. *. butyri p. viii. *. adipis anserini p. xii. *. vitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

- 15 5. *Ad ejiciendum è vulva infantem mortuum.*

Si vero infans intus decessit, quo facilius ejiciatur, malicorium ex aqua terendum, coque utendum est.

6. *Si mulier vitio locorum concidit, qua curatione utendum sit.*

20

Si concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, conterendæque, deinde his mel adjiciendum est.

25

7. *Si mulier non comprehendit.*

Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

C A P. XXII.

- 30 De Medicamentis, quibus aridis utimur.

1. *Ad carnem supercrescentem exedendam:*

QUEDAM misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur

mur sic, ut inspergamus; aut cum aliquo liquido mixta illinamus: quale est, ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ æris, fuliginis thuris, singulorum p. i. *. æruginis p. ii. *. Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera; & cum cera, implent. Misy quoque & galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt: eaque vel arida inspergere licet, vel excepta cadmia illinire.

2. *Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, eamque leniter exedendam, plures compositiones.*

15

Putrem vero carnem continet, neque ultra serpere patitur, & leniter exest, mel vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel cum olæ foliis, ante ex vino decoctis. Item fertula campana in mulso cocta, deinde contrita. Aut calx cum cerato. Aut amaræ nuces cum allio, sic ut hujus pars tertia sit, paululumque his croci adjiciatur. Aut quod habet spumæ argenti p. vi. *. cornu bubuli combusti p. xii. *. olei myrtei, & vini cyathos ternos. Aut quod ex his constat: floris punici mali, atramenti sutorii, aloes, singulorum p. ii. *. aluminis scissilis, thuris singulorum p. iv. *. gallæ. p. vii. *. aristolochiæ p. x. *. Vehementius idem facit, etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio,

25

30

positio, quæ habet chalcitidis, capitulorum
 mali punici, aloes, singulorum P. I I. *. alu-
 minis scissilis, thuris, singulorum P. I V. *.
 5 gallæ P. V I I I. *. aristolochiæ. P. X. *. mellis
 quantum satis sit ad ea cogenda. Vel can-
 tharidum, sulphuris, singulorum P. I. *.
 lolii P. I I I. *. quibus adjicitur picis liquidæ
 quantum satis est ad jungendum. Vel chal-
 10 citis quoque cum resina & ruta mixta: aut
 cum eadem resina diphryges: aut uva tã-
 minia cum pice liquida. Idem vero possunt
 & feces vini combustæ, & calcis & nitri
 pares portiones. Vel aluminis scissilis P. I.
 15 thuris, sandarachæ, nitri, singulorum P. I.
 *. gallæ. P. V I I I. *. aristolochiæ P. X. *.
 mellis quantum satis est.

3. Heræ compositio.

Est etiam Heræ compositio, quæ habet
 20 myrrhæ, chalcitidis, singulorum, P. I I. *.
 aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum
 P. I V. *. aristolochiæ, gallæ immaturæ, sin-
 gulorum P. V I I I. *. malicorii contriti P.
 xx. *.

25 4. Judæi compositio.

Est & Judæi: in qua sunt calcis partes
 duæ, nitri quam ruberrimi pars tertia:
 quæ urina impuberis pueri coguntur, do-
 nec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde
 30 is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

5. Jollæ compositio.

At Jollas, chartæ combustæ, sandara-
 chæ, singulorum P. I. *. calcis P. I I. au-

N

ripi-

ripigmenti tantundem miscebat.

6. *Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis locis; & ad cancerum, & ad inducendam cicatricem, & ad coercendam* §
carnem incrementem.

Si vero ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus conbustus & contritus inspergi debet. Si ex alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum P. I. *. sandarachæ P. II. *. marmoris cocti P. IV. *. inspergi debent. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum P. I. *. calcis P. IV. Eadem incrementem quoque carnem coercent.

7. *Timæi compositio ad ignem sacrum, vel cancerum.*

Timæus autem ad ignem sacrum, & ad 20 cancerum his utebatur: myrrhæ P. II. *. thuris, atramenti futorii, singulorum P. III. *. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, singulorum P. IV. *. gallæ. P. VI. *. cerussæ combustæ P. VIII. *. Eadem vel 25 arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

8. *Ad sternutamenta excitanda.*

Sternutamenta vero & albo veratro, vel struthio coniecto in nâres excitantur. vel 30 his mistis: piperis, veratri albi, singulorum P. *. III. castorei. P. I. *. spumæ nitri P. II. *. struthii P. III. *.

9. *Gargarizationes quibus fieri debeant.*

Gargarizationes autem aut lævandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Lævant, lac, cremor vel prisanæ, vel fursurum. Reprimit autem aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ decoctæ sunt. Evocant, sinapi, piper.

10

C A P. X X I I I.

*De Antidotis,**quibus malis opitulentur.*

15

ANTIDOTA raro, sed præcipue interdum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus: vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscera, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt adversus venena, vel per morsus vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

T. III.

I. Compositio antidoti.

25

Unum est, quod habet lachrymæ papaveris p. *. z. acori, malabathri p. v. *. iris Illyricæ, gummi, singulorum p. ii. *. anisi p. iii. *. nardi Gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singulorum p. iv.

30

petroselini p. *. iii. z. trifolii p. v. *. cassiæ nigrae, silis, bdellii, carpobalsami, seminis papaveris albi, singulorum p. *. z. styracis p. *. v. z. myrrhæ, opopanacis, nardi

N 2

Syri,

Syri, thuris masculi, hypocistidis succi, singulorum p. vi. *. castorei p. vi. *. costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ, croci, floris junci rotundi, singulorum p. 5 vi. *. z. dulcis radices p. viii. *. z. quæ melle vel passo excipiuntur.

2. *Aliud antidotum, Ambrosia nominatum; quod Zopyrus Ptolemæi regi composuit.*

Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo 10 dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat: costi, thuris masculi, singulorum p. v. *. piperis albi p. *. z. floris junci rotundi p. ii. *. cinamomi p. iii. *. cassiæ nigræ p. iv. *. croci Cilicii 15 p. *. iv. z. myrrhæ, quam staeten nominant, p. v. *. nardi indicis p. *. v. z. quæ singula contrita melle cocto excipiuntur: deinde, ubi utendum est, id, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in portione vini 20 diluitur.

3. *Antidotum Mithridatis.*

Nobilissimum autem est Mithridatis. quod quotidie sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tutum cor- 25 pus suum reddidisse. In quo hæc sunt: costi p. *. z. acori p. v. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi, iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum p. ii. *. apisi p. iii. *. nardi Gallici, gentianæ radices, aridorum; 30 rosæ foliorum, singulorum p. iv. *. papaveris lachrymæ, petroselini, singulorum p. *. iv. z. cassiæ, ulceris, lolii, piperis longi, singulo-

singulorum P. VI. *. styracis P. *. v. z. castorei, thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopanax, singulorum P. VI. *. malabathri
 5 folii P. VI. *. floris junci rotundi, resinæ terebinthinæ, galbani, dauci Cretici seminis, singulorum P. *. v. z. nardi, opobalsami, singulorum P. *. VI. z. thlaspis P. *. VI. radiceis ponticæ P. VII. *. croci, zinziberis,
 10 cinnamomi, singulorum P. *. VIII. Hæc contrita melle excipiuntur, & adversus venenum, quod magnitudinem nucis Græcæ impleat, ex vino datur. In cæteris autem affectibus corporis pro modo eorum,
 15 vel quod Ægyptiæ fabæ, vel ervi magnitudinem impleat, satis est.

CAP. XXIV.

De Acopis.

20 1. *Acopum nervis utile.*

ACOPÆ quoque utilia nervis sunt. Quale est, quod habet floris junci rotundi P. *. II. zz. costi, junci quadrati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum P. *. IV. z. myrrhæ, æris combusti, singulorum P. VI. *. iridis Illyricæ, ceræ, singulorum P. IV. *. Alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum P. XVI. *. sevi. P. I.
 30 *. unguenti irini cyathum.

2. *Acopum alodes nervis utile.*

Alterum, quod ἰλασῶδης vocant, hoc modo fit: ceræ P. *, z. olei tantundem, resinæ

terebinthinæ ad nucis juglandis magnitudinem; simul incoquantur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum 5 irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

3. *Ἐλκεῖται ad ulcera purganda & implenda.*

Ἐλκεῖται autem Græci vocant liquida, quæ illinuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda & implenda, maxime inter 10 nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullæ vitulinæ, sevi vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida 15 miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

4. *Ad sacrum ignem.*

Ad sacrum ignem: spumæ argenti P. VII. 20
*. cornu bubuli combusti P. I I. *. contem-
runtur, adjiciturque invicem vinum, &
id, quod specialiter sic vocatur, & myr-
teum, donec utriusque terni cyathi confi-
ciantur. 25

C A P. X X V.

De Catapotiiis.

I. *Catapotium ad somnum accersendum, & le-
vationem doloris, & simul ad coquendum.* 30

CATAPOTIA quoque multa sunt, va-
riisque de causis fiunt. *Ἀνάδνα* vo-
cant, quæ somno dolorem levant.
Qui-

Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Prodest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lachrymæ, galbani, singulorum p. i. *. myrrhæ, castorei, piperis, singulorum p. i i. Ex quibus, quod ervi magnitudinem habet, satis est devorasse.

10 2. *Catapotium valentius ad somnum.*

Alterum, stomacho pejus, ad somnum valentius, ex his fit: mandragoræ p. *. z. apii seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p. i v. *. quæ ex vino teruntur.

15 Unum autem ejusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumplisse.

3. *Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.*

Sive autem capitis dolores, sive ulcera, 20 sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvæ, sive coxæ est, sive jecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio locorum aliqua prolabitur & obmutescit,

25 occurrit dolori per quietem ejusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ silvestris seminis, singulorum p. i i. *. castorei, cinamomi, singulorum p. i i. *. papaveris lachrymæ, panacis radice, mandragoræ malorum ari-

30 dorum, junci rotundi floris, singulorum p. i i. *. piperis grana lvi. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium

fiat. Ex eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

4. *Catapotium aliud ad multa valens.*

Quinetiam silvestris papaveris, cum jam 5 ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Ubi jam bene manipulus is coctus est, ibidem 10 expressus projiciatur; & cum eo humore passum pari mensura misceatur, inferveatque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex eo fiunt, ad nostræ fabæ magnitudinem, habentque usum 15 multiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data: & aurium dolores levant, adjectis exiguo modo rutæ succo, ac passo: & tormina supprimunt ex vino liquata: & inflammationem vulvæ 20 coercent, mista cerato ex rosa facto, cum paululum his croci quoque accessit: & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

5. *Catapotium ad inducendum somnum, quem 25 vulva dolens prohibuit.*

Item, si vulva dolens somnum prohibet, croci P. II. *. anisi, myrrhæ, singulorum P. I. *. papaveris lachrymæ P. IV. *. cicutæ feminis P. VII. *. miscentur, excipiuntur- 30 que vino veteri, & quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

6. *Ad*

6. *Ad jecur sanandum.*

Ad sanandum jecur, nitri P. *. z. croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum P. I. *. melle excipiuntur, daturque, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

7. *Ad finiendos dolores lateris.*

Ad lateris dolores finiendos piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

10 8. *Ad thoracis dolores finiendos.*

Ad thoracis, nardi P. I. *. thuris, cassiæ, singulorum P. I I I. *. myrrhæ, cinnamomi, singulorum P. VI. *. croci P. VI I I. *. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina
15 tres.

9. *Catapotium Athenionis ad tussim.*

Ad tussim, Athenionis: myrrhæ, piperis, singulorum P. I. *. castorei, papaveris lachrymæ, singulorum P. I. *. Quæ separa-
20 tim contusa postea junguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

10. *Catapotium Heraclidis Tarentini ad tussim & somnum.*

25 At, si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci P. I. *. cinnamomi, castorei, papaveris lachrymæ, singulorum P. I. *. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum P. *. z.

30 11. *Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.*

Quod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus: panacis, myrrhæ, resinæ

N 5

tere-

terebinthinæ, singulorum p. v. *. galbani p. *. z. hyssopi p. *. z. conterenda sunt, hisque hemina mellis adjicienda, & quod digito excipi potest, devorandum est. 5

12. Colice Cassii medici.

Colice vero Cassii ex his constat: croci, anisi, castorei, singulorum p. i i i. *. petroselinii p. i v. *. piperis & longi, & rotundi, singulorum p. v. *. papaveris lachrymæ, 10 junci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. v i. *. quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest, & ex aqua calida sumi.

13. Ad infantem mortuum aut secundas expellendas. 15

Infantem vero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci p. i. *. aut cui dictami Cretici p. i. *. adjunctum est.

14. Laborantibus ex partu quid dari debeat 20

Ex partu laborantibus, crysimum ex vino tepido jejunis dari debet.

15. Ad adjuvandum vocem.

Vocem adjuvat, thuris p. i. *. in duobus cyathis vini datum. 25

16. Adversus difficultatem urinae.

Adversus urinæ difficultatem: piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaveris lachrymæ, croci, costi, uncia singulæ, styracis, resinæ terebinthinæ pondo sex- 30 tantes, mellis apsinthii cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fæbæ Ægyptiæ mane & cœnato dari debet.

17. Arre-

17. *Arteriaces compositio quomodo fiat.*

Arteriace vero hoc modo fit: cassiæ, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum P. I. *. croci P. I. *. piperis grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum P. I. *. coni-
 10 ciuntur in passi eundem modum, eodem-
 que modo decoquuntur. Aut ejusdem passi heminæ tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adjicitur tritæ cassiæ. P. I. *.

C A P. XXVI.

15

De quinque generibus noxarum corporis.

CUM facultates medicamentorum proposuerim; genera, in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque;
 20 sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quæ intumescens in vari-
 25 cem convertitur. Cum quid deest, aut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ego, dilatis his, quæ præcipue scalpellum & manum postulant, nunc
 30 de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem; & ante dicam de his, quæ in quamlibet partem cor-

poris incidunt: tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à vulneribus.

1. *De Vulneribus, quæ per tela inferuntur.*

In his autem ante omnia scire medicus debet, quæ insanabilia sint, & quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem fors ipsius interemit. Deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili rem esse: ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt: sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. Obligari æquum est confessione promptæ rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exitum est, majus curantis negligentia fiat.

2. *Quæ vulnera insanabilia sint.*

Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jecinoris portæ, cui in spina medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

3. *Quæ vulnera difficilem curationem habeant* 30

Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla parte aut pulmo, aut jecinoris crassum, aut membrana, quæ continet cere-

cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica,
aut ullum intestinum, aut septum trans-
versum vulneratum est. Hi quoque in præ-
cipiti sunt, in quibus usque ad grandes in-
tusque conditas venas in alis vel poplitibus
mucro defecit. Periculosa etiam vulnera
sunt, ubicunque venæ majores sunt, quo-
niam exhaurire hominem profusione san-
guinis possunt. Idque evenit non in alis
tantum, atque poplitibus; sed etiam in his
venis, quæ ad anum testiculosque perve-
niunt. Præter hæc malum vulnus est,
quodcunque in alis vel feminibus, vel
inanibus locis, vel inter digitos est. Item
quodcunque musculum, aut nervum, aut
arteriam, aut membranam, aut os, aut car-
tilaginem læsit.

4. *Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

Tutissimum omnium, quod in carne est.
Et hæc quidem loco vel pejora, vel melio-
ra sunt. Modo vero periculum facit, quod-
cunque magnum est.

5. *Observationes in vulneris genere & figura.*

Aliquid etiam in vulneris genere figura-
que est. Nam pejus est, quod etiam colli-
sum, quam quod tantum discissum est. adeo
ut acuto quoque, quam retuso telo, vulne-
rari commodius sit. Pejus etiam vulnus est,
ex quo aliquid excisum est; ex quo ve caro
alia parte abscissa, alia dependet. Pessima
quæque plaga curva est: tutissima, quæ li-
near modo recta est. Quo deinde propius
huic

huic illive figuræ vulnus est, eo vel deterius vel tolerabilius est.

6. *Ætatis observatio, & corporis, & vitæ, & temporis.*

Quinetiam confert aliquid & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus. quia facilius sanescit puer vel adolescens, quam senior: valens, quam infirmus: neque nimis tenuis, neque nimis plenus, 10 quam si alterum ex his est: integri habitus, quam corrupti: exercitatus, quam iners: sobrius & temperans, quam vino venerique deditus. Opportunissimumque curationi tempus, verum est; aut certe neque 15 fervens, neque frigidum. siquidem vulnera & nimius calor & nimium frigus infestant; maxime tamen horum varietas: ideoque perniciosissimus autumnus est.

7. *Signacorum, quæ intus læsa sunt.*

20

Sed pleraque ex vulneribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstravimus, cum positus interiorum partium ostendimus. Veruntamen, quia quædam vicina sunt, 25 interestque, vulnus in summa parte sit, an penitus penetraverit, necessarium est notas subicere, per quas quid intus ictum sit, scire possimus; & ex quibus vel spes, vel desperatio oriatur. 30

8. *Signa percussæ cordis.*

Igitur, corde percusso, sanguis multus fertur, venæ languescunt, color pallidissimus,

simus, sudores frigidi, malique odoris, tanquam in ægroto corpore oriuntur: extremisque partibus frigidis matura mors sequitur.

9. *Signa pulmonis icli.*

Pulmone iclo, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulque etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari juvat: quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

10. *Signa jecinoris vulnerati.*

Jecinoris autem vulnerati notæ sunt: multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam reducta præcordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum scapularum os, intenti. quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

11. *Signa percussorum renum.*

Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit: difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. *Signa vulnerati lienis.*

At, liene iclo, sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad jugulum, sicut jecinore vulnerato, venit.

13. Si

13. *Signa percussa vulva.*

At, cum vulva percussa est, dolor in inguinibus, & coxis, & feminibus est: sanguinis pars per vulnus, pars per naturam descendit: vomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt; quædam mente labuntur; quædam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quæ corde vulnera- 10
to, patiuntur.

14. *Signa percussi cerebri, vel membranae ejus.*

Si cerebrum membranae ejus vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis vomitus in- 15
sequitur: quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant: quorundam trux vultus est: quorundam oculi, quasi resoluti, huc illucque moventur: fereque tertio, vel quinto die delirium accedit. Mul- 20
torum etiam nervi distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. *Signa stomachi percussi.*

25.

Ubi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur; si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescunt; sudores tenues oriuntur; per quos extremae 30
partes frigescunt.

16. *Signa jejuni intestini & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.*

Communes vero jejuni intestini & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus & potio per vulnus exeunt: præcordia indurescunt: nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta vel stercus, vel odorem ejus exhibent.

17. *Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.*

Medulla vero, quæ in spina est, discissa, nervi resolvuntur, aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

18. *Signa septi transversi percussæ.*

At, si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

19. *Signa vesicæ vulneratæ.*

Vesica vero vulneratæ, dolent inguina: quod super pubem est, intenditur: pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaque aut bilem vomunt, aut singultiunt: frigus, & ex eo mors sequitur.

20 *De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus: quandoque meliora, deterioræve sint.*

His cognitis, etiamnum quædam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraq; de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his

his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum albidissimumque, glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente. Sanies est inter utrunque tempus. Pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies & pus quasdam species Græcis 10 nominibus distinctas habent. Est enim quædam sanies, quæ vel ἰχθῆρ, vel μελίκηρος nominatur. Est pus, quod ἐλαιῶδες appellatur. Ἰχθῆρ tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi, nervo læso, in- 15 flammatio secuta est. Μελίκηρος crassior est, glutinosior, & subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur hæc quoque ex malis ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt; & inter hæc loca, maxime ex geni- 20 bus. Ἐλαιῶδες tenue, subalbidum, quasi unguinosum colore, atque pinguitudine oleo albo non dissimile adparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus est autem sanguis, nimium aut tenuis, aut crassus; 25 colore vel lividus, vel niger; aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit, 30 Itemque postea spes in his major est, ex quibus melioris generis quæq; proveniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis,

nuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ ipsum ulcus, & junctam ei cutem erodit. Melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. Ἰχθὺρ autem pejor est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, quique cætera omnia contraria prioribus habet. Melicera autem mala est, multa, & percrassa: melior, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoque pejus est, multum, tenue, dilutum; magisque, si ab initio tale: itemque, si colore fero simile, si pallidum, si lividum, si fœculentum. Præter hæc, si male olet; nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius: itemque, si læve est, si nihil olet, si æquale est. Modo tamen, convenire & magnitudini vulneris, & tempori debet. Nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. Ἐλαττωδὲς quoque pejus est multum, & parum pingue: quo minus autem, quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

12. *Curatio adversus profusionem sanguinis in vulneribus.*

30 Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatio interimat. Si profusionem ti-
memus

memus (quod ex sede vulneris, & ex magnitudine ejus, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest) ficcis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sapius linamenta mutanda sunt. Et, si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem suppressendum est: ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi retenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, (quamvis pleraque ex his sanguinem suppressunt) sit utendum: sed, si semel ad ea decurritur, his potius, quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ, quæ sanguinem fundunt, apprehendendæ, circaque id, quod ictum est, duobus locis deligandæ, intercidendæque; sunt, ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sic etiam, satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, ut puta in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum est, cucurbitulam admoveere ad versa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

22. *Curatioes adversus vulnorum
inflammationem.*

Et adversus profusionem quidem in his
5 auxilium est : adversus inflammationem
autem , in ipso sanguinis cursu. Ea timeri
potest, ubi læsum est vel os, vel nervus, vel
cartilago , vel musculus, aut ubi parum
sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo
10 quoties quid tale erit , sanguinem mature
supprimere non oportebit; sed pati fluere,
dum tutum erit, adeo ut, si parum fluxisse
videbitur, mitti quoque ex brachio debeat;
utique, si corpus juvenile , & robustum , &
15 exercitatum est: multoque magis, si id vul-
nus ebrietas præcessit. Quod si musculus
læsus videbitur , præcidendus erit. nam
percutsus, mortiferus est : præcisus, sanita-
tem recipit.

20 23. *De glutinatione vulnorum.*

Sanguine autem vel suppresso , si nimi-
us erumpit ; vel exhausto , si per se parum
fluxit ; longe optimum est , vulnus gluti-
nari. Potest autem id , quod vel in cute ,
25 vel etiam in carne est ; si nihil ei præterea
mali accedit. Potest caro, alia parte depen-
dens, alia inhærens; si tamen etiamnum in-
tegra est, & conjunctione corporis fovetur.

In his vero , quæ glutinantur , duplex
30 curatio est. Nam si plaga in molli parte est,
sui debet: maximeque, si discissa auris ima
est , vel imus nasus , vel frons , vel bucca ,
vel palpebra , vel labrum , vel circa guttur
cutis,

cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est: imponendæ vero fibulæ sunt (ἀσκήρας Græci nominarunt) quæ oras, paulatim tamen, contrahant; quo minus lata postea cicatrix sit.

Ex his autem colligi potest, utrum id quoque, quod alia parte dependens, alia in-
hærebit, si alienatum adhuc non est, futura-
ram, an fibulam postulet. Ex quibus neu-
tra ante debet imponi, quam intus vulnus
purgatum est: ne quid ibi concreti sangui-
nis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, &
& inflammationem movet, & glutinari
vulnus prohibet. Ne linamentum quidem
quod suppressendi sanguinis causa inditum
est, inibi relinquendum est. nam id quoque
inflammatur. 20

Comprehendi vero futura, vel fibula,
non cutem tantum, sed etiam aliquid ex
carne, ubi suberit hæc, oportebit; quo va-
lentius hæreat, neque cutem abrumpat.
Utraque optima est ex acia molli, non ni-
mis torta, quo mitius corpori infideat.
Utraque neque nimis rara, neque nimis
crebra injicienda est. Si nimis rara est, non
continet: si nimis crebra est, vehementer
afficit; quia, quo sæpius acis corpus transi-
vit, quoque plura loca injectum vincu-
lum mordet, eo majores inflammationes
oriuntur; magisque æstate. Neutra etiam
vim

vim ullam desiderat : sed ea hactenus utilis est , qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur . Fere etiam fibulæ latius vulnus esse patiuntur : sutura oras jungit , quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent ; ut si quod intus humoris concreverit , sit qua emanet . Si quod vulnus neutrum horum recipit , id tamen purgari debet .

- Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa . Si sustinere aliquis aceti vim non potest , vino utendum est . Levis plaga juvatur etiam , si ex aqua frigida expressa spongia imponitur . Sed ea , quocunque modo imposita est , dum madet , prodest : itaque , ut inarescat , non est committendum . Licetque sine peregrinis , & conquisitis , & compositis medicamentis vulnus curare . Sed si quis huic parum confidit , imponere medicamentum debet , quod sine sevo compositum sit ex his , quæ cruentis vulneribus apta esse proposui : maximeque si caro est , barbarum : si nervi , vel cartilago , vel aliquid ex eminentibus , quales aures , vel labra sunt , Polybi sphragidem . Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est : eminentibusque partibus ea , quam Græci *ῥύγχος* vocant .
- Solet etiam , colliso corpore , exigua parte findi cutis . Quod ubi incidit , non alienum est , scapello latius aperire ; nisi musculi , nervique juxta sunt , quos incidi non expedit .

expedit. ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At, si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet; adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant; præcipueque ex his id, quod *πυκνός* vocari proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus est grave, impositum, quo id juvetur, in super circumdare lanam succidam ex aceto & oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. *Quomodo vulnus ligari conveniat.* 15

Fascia vero ad vulnus deligandum linea aptissima est: eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paululum utrinque ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si æque ab utraque, transverse comprehendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utranque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & continet, nec adstringat. quod non continetur, elabitur: quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme sæpius fascia circuire debet: æstate, quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus ac affluenda est. nam nodus vulnus lædit. nisi tamen longe est.

Porro neminem decipi decet, ut propriam

priam viscera curationem requirant, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel ~~scilicet~~ *scilicet* cura, vel alio medicinali genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid aut ex jecinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, id præcidatur. Alioquin vulnus interius ea victus ratio eaque medicamentata sanabunt, quæ cuique visceri convenire superiore libro proposui.

25. *Quomodo vulnerato agendum sit.*

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: isque, si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam; vel, si æstas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis æstimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem scilicet, & exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino reficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum vulneri est.

26. *De notis vulnerrum.*

Nimis vero intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. illud indicium magnæ inflammationis: hoc, emortui corporis est. Protinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnus
O sanum

sanum fore. At ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciofa est, quæ vel levi vulnere supervenit, vel ultra 5 tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum rigorem aut distentionem, quæ ex vulnere orta est, ea non finit. Vomitus quoque biliofus non voluntarius, vel protinus, ut percussus est 10 aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum est; præcipue his, quibus in consuetudine 15 fuit: sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

27. *De curationibus vulnerum.*

Biduo sic vulnere habito, tertio die id 20 aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus injicienda sunt. Quinto jam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die, rursus detecto vulnere, considerandus color est. 25 Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnus esse. idque, quandocunque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vulnus, commodissimum est. 30 Item entis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi hæc sine dolore, tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus,

vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ primo fuerunt.

Si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, neque movetur, aquæ quoque calidæ necessarius usus est, ut materiam digerat, & duritiam emolliat, & pus citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jocunda sit; & usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore caloremque ulceri magis naturalem reddidisse videatur. Post id fomentum, si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, maximeque, si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilagineosis, *ῥυτιδῶδες*. at si latius hiat, idem illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet, eoque inlita linamenta disponi per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id lanam succidam; minusque etiam, quam primo, fasciæ adstringendæ sunt.

28. *Curaciones propria articulorum:*

Sed propria quædam in articulis visenda sunt. In quibus si præcisi nervi sunt, qui continebant, debilitas ejus partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, & ea transversa, commodior est: si ex retuso & gravi est, nullum in figura discrimen est: at videndum est, pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum diu fertur, nervum præcisum esse credibile est: magisque, quo

maiores dolores inflammationesque, & quo maturius excitatæ sunt. Quamvis autem non abscissus nervus est; tamen, si circa durus tumor diu permanet, necesse est, & 5 diuturnum ulcus esse, & sanato quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tarde membrum id vel extendatur, vel contrahatur. Major tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio 10 adhibita est, quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram par- 15 tem inclinatum sit: si jam pus profuit, ut devexum sit.

Optimum etiam medicamentum, quies est. Moveri, & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen periculosum his est, 20 qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus, in quo cubat, tepidus esse debet. Balneum quo- 25 que, dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & tumidum & sordidum reddit. ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Lenis fricatio recte adhibetur; sed his partibus, quæ longe ab- 30 sunt à vulnere.

29: *Vulnus quomodo purgandum est.*

Inflammatione finita, vulnus purgandum

dum est. Id optime faciunt tin̄cta in melle
linamenta : supraque id emplastrum vel
πετραφάρμακον vel ὀνυαφάρμακον dandum
5 est. Tum demum vero purum ulcus est,
cum rubet, ac nimium neque siccum, ne-
que humidum est. At, quodcunque sensu
caret; quod non naturaliter sentit; quod
nimium aut aridum aut humidum est;
10 quod aut albidum, aut lividum, aut ni-
grum est; id purum non est.

30. *Quomodo vulnus implendum est.*

Purgato vulnere, sequitur ut impleatur;
jamque calida aqua catenus necessaria est,
15 ut sanies removeatur. Lanæ succidæ su-
pervacuus usus est: lota melius circunda-
tur. Ad implendum autem vulnus profi-
ciunt quidem etiam medicamenta aliqua:
itaque ea adhiberi non alienum est; ut bu-
20 tyrum cum rosa, & exigua mellis parte;
aut cum eadem parte mellis aut cum ea-
dem rosa, πετραφάρμακον; aut ex rosa lina-
menta. Plus tamen proficit balneum ra-
rum. Cibi boni succi; vitatis omnibus acri-
25 bus. Sed jam plenioribus, avis, & venatio,
& suilla elixa dari potest. Vinum omnibus
dum febris, dum inflammatio est, alienum
est: itemque usque ad cicatricem, si nervi,
musculive vulnerati sunt; etiam, si alte caro.
30 At, si plaga in summa cute generis tutioris
est, potest non per vetus, modice tamen da-
tum, ad implendum quoque proficere. Si
quid molliendum est, quod in nervosis lo-
cis,

ris, musculosisque necessarium est, cerato quoque super vulnus utendum est. At, si caro supererexit, modice reprimat siccum linamentum; vehementius, squama æris. 5 Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quæ corpus exedant. Cicatricem, post omnia hæc, commode inducit lycium ex passo aut lacte dilutum; vel etiam per se impositum sic- 10 cum linamentum vehementius.

31. *De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera incidunt curationibusque eorum.*

Hic ordo felicitis curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere con- 15 fuerunt. Interdum enim vetustas ulcus occupat, induciturque ei callus, & circum oræ crassæ livent. Post quæ, quicquid medicamentorum ingeritur, parum proficit; quod fere negligenter curato ulceri super- 20 venit.

Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia corpus senile, aut mali habitus 25 est, cancer occupat. Id genus à Græcis deductum in species est; nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupavit; sed etiam serpit: deinde aliis aliisque signis discernitur. 30 Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit, isque cum dolore procedit; ἰρυσίπικλος Græci nominant: modo ulcus nigrum

nigrum est, quia caro ejus corrupta est, id-
que vehementius; etiam in putrescendo in-
tenditur, ubi vulnus humidum est, & ex
5 nigro ulcere humor pallidus fertur, mali-
que odoris est, & caro intus corrupta: in-
terdum etiam nervi ac membranæ resol-
vuntur, specillumque demissum descen-
dit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio
10 nonnunquam os afficitur: modo oritur ea,
quam Græci γάγριον appellant.

Priora in qualibet parte corporis fiunt:
hæc in prominentibus membris, id est in-
ter ungues, & alas, vel inguina; fereque in
15 senibus, vel in his, quorum corpus mali
habitus est. Caro illi ulceri vel nigra, vel
livida est, sed sicca & arida; proximaque cu-
tis, plerunque subnigris pustulis impletur;
deinde ei proxima, vel pallida, vel livida,
20 fereq; æruginosa & sine sensu est. Deterior
in inflammatione est, omniaque ea simul
serpunt: ulcus, in locum pustulosum: Pu-
stulæ, in eum, qui pallet aut livet: pallor aut
livor, in id, quod inflammatum est: inflam-
25 matio, in id, quod integrum est, transit.
Inter hæc deinde febris acuta oritur, in-
gensque sitis: quibusdam etiam delirium
accedit: alii, quamvis mentis suæ compo-
tes sunt, balbutiendo vix sensus suos expli-
30 cant: incipit affici stomachus: fit fœdi spi-
ritus ipse odoris. Atque initium ejus qui-
dem mali recipit curationem: ubi vero pe-
nitus insedit, insanabile est. plurimique sub

32. *Curatio veteris ulceris.*

Ac pericula quidem vulnorum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello circumciden- 5
dum est, excidendæque ejus oræ, &, quic-
quid super eas livet, æque incidendum. Si
varicula intus est, quæ id sanari prohibet,
ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis
emissus, novatumque vulnus est, eadem 10
curatio adhibenda, quæ in recentibus vul-
neribus exposita est. Si scalpello aliquis
uti non vult, potest sanare id emplastrum,
quod ex ladano fit: &, cum ulcus sub eo
excusum est, id, quo cicatrix inducitur. 15

33. *Curatio Erysipelatum.*

Id autem, quod ἐρυσίπιδας vocari dixi,
non solum vulnere supervenire, sed sine
hoc quoque oriri consuevit: atque inter-
dum periculum magnum adfert; utique, 20
si circa cervicem aut caput constitit.

Oportet, si vires patiuntur, sanguinem
mittere: deinde imponere simul reprimen-
tia & refrigerantia; maximeque cerussam
solani succo, aut cimoliam cretam aqua 25
pluviali exceptam; aut ex eadem aqua
subactam farinam cupresso adjecta, aut, si
tenerius corpus est, lenticula. Quicquid
impositum est, betæ folio contegendum
est, & super linteolum frigida aqua madens 30
imponendum. Si per se refrigerantia pa-
rum proderunt, miscenda erunt hoc mo-
do: sulphuris P. I. *. cerussæ, croci, sin-
gulorum

gulorum p. x. *. eaque cum vino conte-
renda sunt, & id his illinendum: aut, si du-
rior locus est, solani folia contrita suillæ
5 adipi miscenda sunt, & illinita linteolo su-
perinjicienda

At, si nigrities est, quæ neque dum ser-
pit, imponenda sunt, quæ carnem putrem
lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic,
10 ut cætera, nutriendum est. Si magis putre
est, jamque procedit ac serpit, opus est ve-
hementius erodentibus. Si ne hæc qui-
dem evincunt, aduri locus debet, donec
nullus ex eo humor feratur. nam quod
15 sanum est, siccum est, cum aduritur. Post
ustionem putris ulceris, superponenda
sunt, quæ crustas à vivo resolvant; ἀπὸ ζώ-
ουσα Græci nominant. Ubi exciderunt,
purgandum ulcus, maxime melle & resina
20 est. Sed iis quoque purgari potest, quibus
purulenta curantur, eodemque modo ad
sanitatem perducendum est.

32. *Curatio Gangræna.*

Gangrænam vero, si nondum plane te-
25 net, sed adhuc incipit, curare non difficil-
limum est; utique in corpore juveni: &
magis etiam, si muscoli integri sunt; si ner-
vi vel læsi non sunt, vel leviter affecti sunt;
neque ullus magnus articulus nudatus est;
30 aut carnis in eo loco paululum est, ideoque
non multum, quod putresceret, fuit; con-
sistitque uno loco vitium; quod maxime
fieri in digito potest. In ejusmodi casu pri-

num est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde, quicquid aridum est, & intentione quadam proximū quoque locum male habet, usque ad sanum corpus concidere.

Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus movere consuerunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimantia, 10 aliena sunt: sed his quam levissimis opus est. superque ea, quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. 15

Præcipueque in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, 20 abstinentia utendum. Deinde danda, quæ per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus adstringant; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri ulcere 25 præscripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque siccantibus: aqua vero pluviali frigida. Balneum, nisi jam certa fiducia redditæ sanitatis est, 30 alienum est; siquidem emollitum in eo ulcus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnunquam nihil omnia auxilia pro-

proficere , ac nihilominus serpere sub his cancer. Inter quæ miserum , sed unicum , auxilium est , ut cætera pars corporis tuta sit , membrum , quod paulatim emoritur , abscindere.

35. *Curatio vulnervm , ubi quid collisum est , aut detritum , aut infixum.*

Hæ gravissimorum vulnervm curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda , ubi interior pars collisa ; aut ubi dera sum , detritumve aliquid est ; aut ubi furculus corpori infixus est ; aut ubi tenue , sed altum vulnus infedit.

15 In primo casu commodissimum est malicorium ex vino coquere , interioremque ejus partem conterere , & cerato miscere ex rosa facto , idque superponere : deinde , ubi cutis ipsa exasperata est , inducere lenem medicamentum , qualis λιπαρόν est.

Dera so vero , detrimentoque , imponendum est emplastrum πτερυγίου , minuendumque eibus , & vinum subtrahendum. Neque id , quia non habebit altiores ictus ; 25 contemnendum erit : siquidem ex ejusmodi casibus sæpe cancri fiunt. Quod si levius id erit , & in parte exigua , contenti esse poterimus eodem leni medicamento.

Surculum vero , si fieri potest , oportet 30 vel manu , vel etiam ferramento educere. Si vel præfractus est , vel altius descendit , quam ut ita fieri possit , medicamento evocandus est. Optime autem educit superim-

posita arundinis radix; si tenera est, protinus contrita; si jam durior, ante in mulso decocta. cui semper mel adjiciendum est aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex furculis, arundo est; quia aspera est. Eademque offensa etiam in filice est. Sed usu cognitum est, utranque adversus alteram medicamentum esse, si contrita ac superimposita est. Facit autem idem in omnibus furculis, quodcunque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusq; vulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis; huius Hecatæi emplastrum maxime convenit. 15

36. *Quomodo cicatrix vulneri inducenda, purgandaque sit.*

Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est (quod per purgatis jam, repletisque ulceribus necessarium est) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde, cum jam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur: tum deligari super album plumbum oportet, quo & re- 25
primitur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix silvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterii p. i. *. spumæ argenti p. ii. *. glandis unguentariæ pondo 30
iv. *. quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat
At nigras quoque cicatrices leniter purgant,

gant, paribus portionibus mixta, ærugo & plumbum elotum, eademque resina coacta; siue eo ungitur cicatrix, quod in facie fieri potest; siue id ut emplastrum imponitur; quod in aliis partibus commodius est.

At, si vel excrevit cicatrix, vel concava est, stultum est, decoris causa, rursus & dolorem & medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cui exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt: super concavam, implentia; donec utrumque ulcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

CAP. XXVII.

20 *De vulneribus, quæ per morsus inferuntur, eorumque curationibus.*

25 **D**IXI de his vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnumquam ferarum, aut aliorum animalium, aut serpentium. Omnis autem feræ morsus habent quoddam virus.

30 Itaque, si vehemens vulnus est, cucurbitula admovenda est: si levius, protinus emplastrum injiciendum, præcipueque Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quæ

quæ adversus morsus proposui. si ea non sunt, viride Alexandrinum: si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his, quæ recentibus vulneribus accommodantur. 5 Sal quoque his, præcipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est, si aridus vulneri imponitur, superque id duobus digitis verberatur. exsaniat enim. Ac salsamentum quoque recte super id vulnus deliga- 10 tur.

2. *Curatio adversus rabiosi canis morsum.*

Utique autem, si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus ejus extrahendum est. Deinde, si locus neque nervosus, neque 15 musculosus est, vulnus id adurendum est. Si uri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum usto quidem vulneri superimponenda, quæ cæteris ustis sunt. Ei vero, quod expertum ignem non 20 est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Post quæ nullo novo magisterio, sed jam supraposito vulnus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum 25 mittunt; eumque ibi patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vulnere aperto; quo magis ex eo quoque virus distillet: deinde multo meratoque vino excipiunt, quod omnibus venenis contrarium est. Id- 30 que cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo putatur.

Solet autem ex eo vulnere, ubi parum
occur-

occursum est, aquæ timor nasci. *ὁ δὲ ἐν φεσίῳ*
 Græci adpellant. Miserrimum genus mor-
 bi: in quo simul æger & siti & aquæ metu
 5 cruciatur. quo oppressis in angusto spes est.
 Sed unicum tamen remedium est, nec opi-
 nantem in piscinam non ante ei provisam
 projicere, &, si natandi scientiam non ha-
 bet, modo mersum bibere pati, modo at-
 10 tollere; si habet, interdum deprimere, ut
 invitus quoque aqua satietur. sic enim si-
 mul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed
 aliud periculum excipit, ne infirmum cor-
 pus in aqua frigida vexatum, nervorum
 15 distentio absumat. Id ne incidat, à piscina
 protinus in oleum calidum demittendus
 est. Antidotum autem (præcipue id, quod
 primo loco posui; ubi id non est, aliud) si
 nondum æger aquam horret, potui ex aqua
 20 dandum est: &, si amaritudine offenditur,
 mel adjiciendum est: at, si jam is morbus
 occupavit, per catapotia sumi potest.

3. *Curationes communes adversus omnes
 morsus serpentium.*

25 Serpentium quoque morsus non ni-
 mium distantem curationem desiderant:
 quamvis in ea multum antiqui variarunt;
 adeo ut in singula anguium genera singu-
 la medendi præciperent; aliique alia. sed
 30 in omnibus eadem maxime proficiunt. Igi-
 tur in primis supra vulnus id membrum
 deligandum est: non tamen nimium vehe-
 menter, ne torpeat. Dein venenum extra-
 hendum

hendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiatum jam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, 5 (quod tamen vix incidere potest) tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exfugat.

Neque hercule scientiam præcipuam¹⁰ habent hi, qui Psylli nominantur; sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quædam etiam venatoria venena, quibus Galli præcipue utuntur, non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque¹⁵ colubra ipsa tuto estur: ictus ejus occidit. & si stupente ea (quod per quædam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ejus saliva noxa est. Ergo quisquis, exem-²⁰ plum Psylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem præstabit. Illud interea ante debet attendere, ne quod in gingivis, palato, aliave parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco²⁵ calido collocandus est sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem partem inclinetur.

Si neque qui exfugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet jus anserinum, vel³⁰ vitulinum, & vomere. Vivum autem galinaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere sic,

fic, ut pars interior corpori jungatur. Facit id etiam hœdus agnusve discissus, & calida ejus caro statim super vulnus imposita. Emplastra quoque, quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephesium, vel id quod ei subiectum est. Præsensque in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exorbere portionem meri vini cum pipere; vel quidlibet aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire patitur. nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

4. *Speciales curationes adversus ictus serpentium:*
& primo adversus ictum Aspidis.

Hæc adversus omnes ictus utilia sunt, communiaque: usus tamen ipse docuit, cum, quem Aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cujusdam pueri, qui, cum ab hoc ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos æstus siti premèretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, habet tamen & dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

5. *Adversus ictum Scorpionis.*

In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quædam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio ipse sibi pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt. Quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt. Quidam super prunas eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur; tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbæ solaris (quam ἡλιοτρόπιον Græci vocant) semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

6. *Adversus Aranei & Scorpionis ictum.* 20

Ad scorpionis etiam, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

7. *Adversus Ceraſtis, & Dipsadis, & Hamorrhoidis ictum.* 25

At, si ceraſtes, aut dipsas, aut hæmorrhoids percussit, asphodeli, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum, in duas portiones dividendum est sic, ut ei rutæ paululum adjiciatur. Trifolium quoque & 30 mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumque, & cassia. & cinnamomum recte per potionem assumuntur.

8. *Ad-*

8. *Adversus Chersydri ictum, & Ceraſtis.*

Adversus chersydri vero ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum p. i i.
 5 *. vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem ordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum
 10 sale contrita, melle adjecto. Quod in coquoque vulnere, quod ceraſtes fecit, æque valet.

9. *Adversus Phalangii ictum.*

Ubi vero phalangium nocuit, præter
 15 eam curationem, quæ manu editur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusque ei myrrhæ & uvæ taminia par modus ex passi hemina; vel radiculæ semen, aut lolii radix ex vino; & super vulnus surfu-
 20 res ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

10. *Adversus ictum Italarum anguinum, qui minus terribiles peregrinis sunt.*

Verum hæc genera serpentium & pere-
 25 grina, & aliquanto magis pestifera sunt; maxime, quæ æstuosis gignuntur locis. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis pro-
 30 ficit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel personata, vel marinæ pastinacæ, si vel singulæ binæve tritæ, & sic potui datæ sunt

sunt cum vino, & super vulnus impositæ. Illud ignorare non oportet, omnis serpentis ictum & jejuni & jejuno magis nocere. ideoque perniciosissimi sunt, cum incubant: utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpsit.

11. *Remedium generale adversus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.* 10

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione im-
pserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti: ideo ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia
noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhausta, bibere antidotum: si id non
est, vel merum vinum. 20

12. *Specialia remedia adversus quædam venena: & primo adversus Cantharidas.*

Sunt tamen quædam remedia propria adversus quædam venena, maximeque le-
viora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet. 25

13. *Adversus Cicutam.*

Si cicutam, vinum merum calidum cum
ruta quamplurimum ingerendum est; de-
inde is vomere cogendus: posteaque laser
ex vino dandum. Isque, si febre vacat, in
calidum

calidum balneum mittendus: si non vacat, ungendus ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

5 14. *Adversus Hyoscyamum.*

Si hyoscyamum, fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

15. *Adversus Cerussam.*

10 Si cerussam, jus malvæ, vel juglandis ex vino contritæ, maxime profunt.

16. *Adversus Sanguisugam, si epota est, & lac, quod intus coit.*

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut cum aceto laser.

17. *Adversus Fungos inutiles.*

Si fungos inutiles quis assumpsit, radícula aut è posca, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi vero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturæ genere idonei fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

25 18. *De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.*

Adustris quoque locis extrinsecus vis infertur; itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur foliis aut lilii, aut linguæ caninæ, aut betæ in vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum ad sanitatem perducit.

Sed

Sed dividi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaque, primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent: deinde ea, 5 quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina; vel myrrha cum vino; vel creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua coacta, atque, ubi usus necessitas incidit, aceto 10 diluta. Ex insequentibus, quælibet *λινον*. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi retrimentum, vel vitellos habet.

Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum 15 melle lenticulam: ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustæ cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit: novissime siccum 20 linamentum.

CAP. XXVIII.

De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur. 25

1. *De carbunculo.*

Ab his, quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est, quæ interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo 30 pejus. Ejus hæ notæ sunt. Rubor est, superque cum non nimium pustulæ eminent, maxime nigræ, interdum sublividæ, aut pallidæ.

pallidæ. In iis sanies esse videtur: infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius, quam naturaliter oportet. Circaque
5 quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur. Neque in eo loco levare cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget. Nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrunque. Idque vitium subter-
10 actis quasi quibusdam radicibus serpit; interdum celerius, interdum tardius. Supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit; circumque exiguæ pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum sæpe elidit.

Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id grave est. nam non sentit; quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde ulcus, sicut cætera
15 adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta: quæ undique à viva carne diducta, trahit secum, quicquid corruptum erat; puriusque jam si-
25 nus curari potest implentibus. At, si in summa cute vitium est, possunt succurrere quædam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque vero medicamentum
30 impositum est, si satis proficiet, protinus à viva corruptam partem resolvet.

Certaque esse fiducia potest fere, si undique vitiosa caro excidat, qua hujuscemodi

di

di medicamen exest: si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad unctionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit.

2. *De Carcinomate.*

Non idem periculum *καρκίνωμα* affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et ex jecore, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inæqualiter tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae venae quasi recurvantur: haeque pallent, aut livent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam proprietatem: interdum simile his est, quae vocant Græci *κνιδόλαιμα*, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque ejus ruber est, aut lenticulae similis. Neque tuto secatur. nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quæ

quæ circa sunt, intenduntur & intumescunt. Namque pessimum id genus est, ferreque primum id fit, quod κακότης à Græcis nominatur. Deinde ex eo id καρχίνωμα, quod sine ulcere est. Deinde ulcus; & ex eo, thymium.

Tolli nihil, nisi κακότης, potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo major vis
10 adhibita est, eo magis quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. neque ulli unquam medicina profuit: sed adusta, protinus concitata sunt, & increverunt,
15 donec occiderent. Excisa etiam, post inductam cicatricem, tamen reverterunt, & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent; sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur,
20 quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Discernere autem cacoethes, quod curationem recipit, à carcinomate, quod non recipit,
25 nemo scire potest, nisi tempore & experimento.

Ergo, ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus
30 indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ustionem. Si protinus irritatum est, scire licet, jam carcinoma esse; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementer-

hementia. Sed, si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguiissimam, aut *ῥυπιδίς* emplastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratum ex rosa injiciendum est, 5 adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex aqua, qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama æris est (quæ lenissima ex adurentibus est) eatenus, ne 10 quid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbavit: sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

3. De Theriomate.

Est etiam ulcus, quod *θηρίωμα* Græci 15 vocant. Id & per se nascitur, & interdum ulceri ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel niger: odor fœdus: multus, & mucosus similis humor. Id ipsum ulcus neque tactum, neque medica- 20 mentum sentit: prurigine tantum movetur. circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. Atque id quoque malum serpit. quo omnia sæpe intendun- 25 tur. Fitque ex his ulcus, quod *ἰσθητικὸν ἰδιόμα* Græci vocant; quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ad ossa, corpus vorat. Id ulcus inæquale est, cæno simile; inestque multus humor glutinosus; odor 30 intolerabilis; majorque, quam pro modo ulceris, inflammatio. Vtrunque, sicut omnis cancer, fit maxime in senibus; vel his, quorum

quorum corpora mali habitus sunt.

Curatio utriusque eadem est: sed in majore malo major vis necessaria. Ac primum, à victus ratione ordinandum est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquam quamplurimam assumat. Alvus quoque ei ducatur. Dein, post inflammationem, cibum boni succi capiat;
 10 vitatis omnibus acribus: potionis quantum volet, sic, ut interdiu quidem aquæ contentus sit: in cœna vero etiam vini austeri aliquid bibat. Non æque tamen fame in his, quos *ipsum* urgebit, atque in his, qui
 15 *in elapsa* adhuc habebunt, utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est.

Super ulcus vero inspergenda est arida aloe contrita, & si parum proficiet, chalcitis. At, si quis nervus, exesa carne, nudatus
 20 est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quæ vehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur, a-
 25 verso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleæ folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque, qua
 30 tumor ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, qui apparent, ante con-
 P 2 rectis.

340 A CORN. CELSI. Lib. 5.
tectis. Aduſtum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum eſſe, apparere cuiſlibet ex prioribus poteſt.

4. De Sacro igne.

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Ejus duæ ſpecies ſunt. Alterum eſt ſubrubicundum, aut miſtum rubore atque pallore; exaſperatumque per puſtulas continuas, quarum nulla altera major eſt, ſed plurimæ perexiguæ. In his ſemper fere pus, & ſæpe rubor cum calore eſt: ſerpitq; id nonnunquam ſaneſcente eo, quod primum vitiatum eſt: nonnunquam etiam exulcerato, ubi, ruptis puſtulis, ulcus continuatur, humorque exit, qui eſſe inter ſaniem & pus videri poteſt. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem eſt in ſummæ cutis exulceratione, ſed ſine altitudine, latum, ſublividum, inæqualiter tamen; mediumque ſaneſcit, extremis procedentibus: ac ſæpe id, quod jam ſanum videbatur, iterum exulceratur. At circa, proxima cutis, quæ vitium receptura eſt, tumidior & durior eſt, coloremque habet ex rubro ſubnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora ſeniora tentantur, aut quæ mali habitus ſunt; ſed in cruribus maxime.

Omnis autem ſacer ignis, ut minimum periculum habet ex his, quæ ſerpunt; ſic prope

- prope difficillime tollitur. Medicamentum
ejus fortissimum est, uno die febris, quæ
humorem noxium absumat. Pus, quo cras-
sius & albidius est, eo periculi minus est.
Prodest etiam infra ulcera locum cædi, quo
plus puris exeat; & id, quo ibi corruptum
corpus est, extrahatur. Sed tamen, si feбри-
cula accessit, abstinencia, lectulo, alvi du-
10 ctione opus est. In omni vero sacro igni,
neque lenibus & glutinosis cibis, neque
salsis & acribus utendum est; sed his, quæ
inter utrumque sunt: qualis est panis si-
ne fermento, piscis, hœdus, aves, exce-
15 ptoque apro, omnis fere venatio. Si non est
febricula, & gestatio utilis est, & ambula-
tio, & vinum austerum; & balneum. At-
que in hoc quoque genere potio magis li-
beralis esse, quam cibus, debet.
- 20 Ipsa autem ulcera, si mediocriter ser-
punt, aqua calida: si vehementius, vino
calido fovenda sunt. Deinde acu pustulæ,
quæcumque sunt, aperiendæ. Tum impo-
nenda ea, quæ putrem carnem exedant.
- 25 Ubi inflammatio sublata, ulcusque purga-
tum est, imponi lene medicamentum de-
bet. In altero autem genere, possunt pro-
ficere mala cotonea in vino cocta, atque
contrita: potest emplastrum vel Heræ, vel
30 *πετραφάρμακον*, cui quinta pars thuris ad-
jecta sit: potest nigra hederæ ex vino au-
stero cocta; ac, si celeriter malum serpit,
non aliud magis proficit. Purgato ulcere,

quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

5. *De Chironio ulcere.*

Chironium autem ulcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras duras, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis: odor malus. neque in ulcere, neque in ejus tumore ulla est inflammatio: 10 dolor modicus est. Nihil serpit, ideoque nullum periculum adfert; sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcusque renovatur. Fit maxime in pedibus & cru- 15 ribus.

Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale ejus rei causa fit ex his: squamæ æris, plumbi eloti combusti, singulorum 20 P.VI. *. cadmiæ, ceræ, singulorum P.VIII. *. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. *De Ulceribus, quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur.*

Fiunt etiam ex frigore hiberno ulcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, de- 30 inde exulceratio. Dolor autem modicus: prurigo major est. Nonnunquam humor exit, sed non multus; qui referre vel pus, vel

vel saniem videtur.

In primis multa calida aqua fovendum est, in qua rapa decocta; aut si ea non sunt, 5 aliqua verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperitum ulcus est, æs, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure contritum, 10 tum vino adjecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

7. De Struma.

15 Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipue fatigare medicos solent, quoniam & febres movent, nec unquam facile maturescunt; 20 &, sive ferro, sive medicamentis curantur, plerunque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta sæpius. quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime 25 in cervice; sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque fœminarum se reperisse, chirurgus Meges auctor est.

Propter hæc & album veratrum recte 30 datur, atque etiam sæpius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus

quoque quidam utuntur , quæ exedunt ,
 crustaque cum locum adstringunt : tum
 vero ut ulcus curant. Quæcunque autem
 ratio curandi est , corpus, puro ulcere, 5
 exercendum atque alendum est , donec ad
 cicatricem perveniat. Quæ cum medici
 doceant , ab iis requirenda. Quorundam
 rusticorum experimento cognitum, quem
 struma male habet , eum, si anguem edit, 10
 liberari.

8. De Furunculo.

Furunculus vero, est tuberculum acutum
 cum inflammatione, & dolore; maximeque
 ubi jam in pus vergit. Qui ubi ad apertus est, 15
 & exiit pus, subter apparet pars carnis in pus
 versa, pars corrupta subalbida, subrubra;
 quem ventriculum quidam furunculi no-
 minat. In eo nullum periculum est, etiam si
 nulla curatio adhibeatur: maturescit enim 20
 per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut
 potior medicina sit, quæ maturius liberet.

Proprium ejus medicamentum galba-
 num est. sed alia quoque supra compre-
 hensa sunt. Si cætera desunt, imponi debet, 25
 primum, non pingue emplastrum, ut id
 reprimat: deinde, si non repressit, quod-
 libet puri movendo accommodatum. si ne
 id quidem est, vel resina, vel fermentum.
 Expresso pure, nulla ultra curatio necessa- 30
 ria est.

9. De Phymate.

Phyma vero nominatur tuberculum fu-
 run-

runculo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divulsum est, pus eodem modo apparet: ventriculus, qui in furunculo, non invenitur: verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur & facilius tollitur: in juvenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Ubi ætas induravit, ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discutere-
 10
 15

10. *De Phygethlo.*

Φύγιθλον autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est, & major
 20
 25

quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula. idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstravi.

11. *De Abscessibus.*

Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui

ventrem infestant. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquando intumescit ad similitudinem ejus, quod $\phi\tilde{\upsilon}\mu\alpha$ vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter adolescit, & sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque ¹⁰ sentiuntur intus aliquæ punctiones. Et, quod de subito durius non est, melius est: & quod, quamvis rubet, coloris tamen in album mutati est. quæ signa jam pure oriente nascuntur: tumor enim ruborque ¹⁵ multo ante incipiunt.

Sed, si locus nobilis est, avertendus materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias & paulo ante in erysipelate proposui. ²⁰ Si jam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resolvant: qualis est ficus arida contusa: aut fex mista cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris silvestris radix, cui ex farina duæ ²⁵ partes adjectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum; pondusque adjicere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque ³⁰ emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui.

Quod per hæc discussum non est, necesse

cesse est, mature scat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex aqua cocta, cui & olerum aliquid recte miscetur. Eadem aut hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra edidi: recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantummodo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est, & gravitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities; &, si major abscessus est, horror, atque etiam febricula permanet: penitusque condita suppuratione pro his, quæ alioqui curtis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, jamque is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuration est. Ex qua, ubi vel per se, vel per medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti. Tum, si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si ima plaga exigua est, si mediocris suppuration fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æque linamenta supervacua sunt. In reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero mel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex vino coctum. quæ & per se & mista idonea sunt.

Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel fœni græci lini-

ve semen ex passo coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera, quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniuntque vulneribus, **exposita sunt.**

12. *De Fistulis.*

10

Nonnunquam autem ex ejusmodi abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quædam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breves sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoque plures transversæ: aliæ simplices sunt, 20 aliæ duplices triplicesve, quæ ab uno ore orsæ intus tres fiunt, aut etiam in plures sinus dividuntur: aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa aut cartilaginem penetrant; 25 aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt: aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur.

Expedita curatio est in fistula simplici, 30 recenti, intra carnem. Adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel

vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos læsit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad maxillas, guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est.

Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit; ut, quo tendat, & quam alte perveniat, scire possimus. simul etiam, prorsus humida, an siccior sit: quod extracto specillo patet. Id quoque disci potest, in osse vitium sit, nec ne: &, si jam eo fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam, si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si dilabitur specillum, nondum caries est: si non dilabitur sede, qua innititur, caries quidem, verum adhuc levis est: si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subest, ipsa sedes docet: perventumque esse ad eam, ex renisu patet.

Ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples vero hæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cujus si plus fertur, quam quod simplici spacio convenit,

nit, plures sinus esse manifestum est. Cumque fere juxta sint caro, & nervus, & aliqua nervosa, quales fere tunicae membranæque sunt, genus quoque puris docebit, & num plures sinus intus diversa corporis genera perferant. Siquidem ex carne pus læve, album, copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius & minus: ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint, quia sæpe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod jam desierat; iterum incipit; & testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere.

Si in carne & recens & simplex est; ac neque sinuosa neque cava sede; neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam æris, vel æruginem, vel ex metallicis aliquid. Exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat. quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in lintcolo superimponendum; supra-

supraque injicienda spongia est, in acetum ante demissa: solvique quinto die satis est. Genus victus adhibendum est, quo carnem
5 ali docui.

At, si longius à præcordiis fistula est, ex intervallo jejunum radículas esse, deinde vomere, necessarium est.

Quum vetustate callosa sit fistula (callus
10 autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus) tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lachrymæ P. I. *. gummi P. III. *. cadmiæ P. IIII. *. atramenti sutorii
15 P. VIIII. *. ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ P. I. *. æruginis, sandarachæ, aluminis Ægyptii singulorum P. I. *. atramenti sutorii combusti P. II. *. Aut quod constat ex chalcitide,
20 & è saxo calce; quibus adjicitur auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est; eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rasæ P. II. *. conte-
25 rere, deinde ammoniaci thymiamatis P. II. *. aceto liquare, eoque infuso æruginem cogere. Idque ex primis medicamentis est. Sed, ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum qui-
30 buslibet adurentibus medicamentis erodere: satisque est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta
&

& mixta cum calce, callum exest.

Si quando vero longior & transversa fistula est, demisso specillo, contra principium hujus incidi commodissimum est, & 5 collyrium, quod volueris, demitti.

At si duplicem esse fistulam vel multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas 10 omittat: sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium conjicienda sunt, isque ori fistulae aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda sunt; vel, si 15 sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto; atque intus infundendum, quicquid inditum est. Superponenda sunt, quae refrigerent & reprimant. Nam fere, quae circa fistulam sunt, habent aliquid inflam- 20 mationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta injiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere; si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si jam purgatur, mulso, 25 vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paululum adjiciatur.

Fere vero fit, ut ea tunica, quae inter foramen & integram carnem est, victa tot medicamentis exeat, infraque ulcus purum sit. 30 Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt; praecipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro, multis placuisse linamen-

namentum, in modum collyrii compo-
 situm & tinctum melle, implendi causa de-
 mitti. sed celerius sic glutinatur, quam im-
 5 pletur. Neque verendum est, ne purum
 corpus puro corpori junctum non coeat;
 adjectis quoque medicamentis ad id effica-
 cibus; cum sæpe exulceratio digitorum,
 nisi magna cura prospeximus, sanescendo
 10 in unum eos jungat.

13. *De Ulceris genere, quod $\chi\eta\epsilon\lambda\omicron\upsilon$ nominatur.*

Est etiam ulceris genus, quod à favi si-
 militudine $\chi\eta\epsilon\lambda\omicron\upsilon$ Græcis nominatur. Id-
 que duas species habet. Alterum est subal-
 15 bidum, & furunculo simile; sed majus, &
 cum magno dolore. Quod, ubi maturescit,
 habet foramina; per quæ fertur humor glu-
 tinosus, & purulentus; nec tamen ad ju-
 stam maturitatem pervenit. Si divisum est,
 20 multo plus intus corrupti, quam in furun-
 culo, apparet, altiusque descendit. Raro fit
 nisi in capillis.

Alterum est minus, & super caput emi-
 nens, durum, latum, subviride, subpalli-
 25 dum, magis exulceratum: siquidem ad sin-
 gulorum pilorum radices foramina sunt,
 per quæ fertur humor glutinosus, subpalli-
 dus, crassitudinem mellis, aut visci refe-
 rens, interdum olei: &, si inciditur, viridis
 30 intra caro apparet. Dolor autem, & inflam-
 matio ingens est, adeo ut acutam quoque
 febrem movere consuerint.

Super id, quod minus crebris foramini-
 bus

bus exasperatum est, recte imponitur & ficus arida, & lini semen in mulso coctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quæ proprie huc pertinentia supra posui.

Super alterum, & eadem medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur; & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; & uvæ taminix pars quarta fico adjecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet. Ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt; primum, quæ pus citent; deinde, quæ purgent; tum, quæ impleant.

14. *De Acrochordone, & Thymio, & Myrmecis, & Clavo.*

20

Sunt vero quædam verrucis similia; quorum diversa nomina, ut vitia sunt. *Ἀκροχόρδον* Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris ejusdem; infra ad cutem tenuis, supra latius. idque modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed fere plura, maximeque pueris: eaque nonnunquam subito disinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. sunt, quæ etiam in pus convertuntur.

Ἀκροθύμιο nominatur, quod super corpus

pus

pus quasi verrucula eminet, ad cutem latius, supra tenue, subdurem, & in summo perasperum. Id, qua summum, colorem floris thymi repræsentat; unde ei nomen est; ibique facile finditur, & cruentatur; nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereque citra magnitudinem fabæ Ægyptiæ est, raro majus, interdum perexiguum.
10 Modo autem unum, modo plura nascuntur, vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus: pessima tamen in obscænis sunt; maximeque ibi sanguinem fundunt.

Μυρμηκία autem vocantur humiliora
15 thymio durioraque, quæ radices altius exigunt, majoremque dolorem movent, infra lata, supra autem tenuia, minus sanguinis mittunt: magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis aut in inferioribus partibus pedum.

Clavus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue autem ex contuso,
25 quamvis interdum aliter: doloremque, etiam si non alias, tamen ingredienti movet.

Ex his *Acrochordon* & *acrothymium* sæpe etiam per se finiuntur; & quo minora
30 sunt, eo magis. *Myrmecia* & *clavi* sine curatione vix unquam desinunt. *Acrochordon*, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. *Acrothymio*

thymio clavoque excisis, subrotunda radice nascitur, quæ penitus descendit ad carnem: eaque relicta, idem rursus exit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent: 5 ideoq; ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde radere, commodissimum est. nam sine ulla vis sic mollescit. at, si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, 10 si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paululum, quem ex lapide molari contritofecit. Cætera vero genera medicamentis adurenda sunt. Aliisque id, quod ex fece vini: myr- 15 meciis id, quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimum est. Sed ea, quæ circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur: deinde postea lenticula imponi. Tollit acrothymium etiam ficus in 20 aqua decocta.

15. *De Pustularum generibus.*

At pustulæ maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve aspre- 25 do quædam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel ex sudore nascuntur; ἰκταὶνός-
μοια Græci vocant. eæque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures, similes varis oriuntur, 30 nonnunquam majores. Pustulæ, lividæ sunt, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter naturali colore mutato: subestque illis hu-
mor.

mor. Ubi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet. *φλύκταιναι ἰλκώδες* Græce nominantur. Fiunt vel ex frigore, 5 vel ex igni, vel ex medicamentis.

Φλυζάνειον autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta. ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut 10 aridiora, aut humidiora: & modo tantum cum prurigne, modo etiam cum inflammatione ac dolore: exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in ætate puerili: raro, in medio corpore: sæpe, in eminentibus partibus. 15

Pessima pustula est, quæ *ἐπιφυκτὶς* vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est; &, cum aperta 20 est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est: neque enim ea faba major est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & fere noctu. unde nomen quoque à Græcis ei *ἐπιφυκτὶς* est impositum. 25

In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum 30 est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acribus & extenuantibus. eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc, is, qui tam robustus

stus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspergere; oleoque vinum miscere, & sic ungi; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est; detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia transeundum. *Ἐπιτολὴς* post lenticulam, recte herba quoque sanguinalis, vel viridi coriandro curatur.

Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni græci mixta sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem *περίττω* Græci vocant, P. VIII. *. cum quinquaginta amarum nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent, & tum hoc illini.

16. De Scabie.

Scabies vero est durities cutis rubicundior. ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens; serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, *ἀνελαν* Græci appellant, id est feram.

In

In hac quoque victus ratio eadem, quæ supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est; 5 quod fit ex spodii, croci, æruginis, singulorum p. i. *. piperis albi, omphacii, singulorum p. i. *. cadmiæ p. viii. *. At, ubi jam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris p. i. *. ceræ p. iv. *. picis liquidæ hemina, olei sextariis duobus. quæ simul usque 10 ad crassitudinem mellis incoquantur. Est etiam, quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, 15 aceti cyathos tres. Crocum quoque, lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquantur. Idque omnem utique scabiem 20 sanat. Ac, si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pici liquidæ mistum, sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

25 17. *De Impetiginis speciebus.*

Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem repræsentat. nam & rubet, & durior est, & exulcerata, & rodit. Distat autem 30 ab ea, quæ magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet; videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore quasi squamulæ solvuntur, certio.

certioribusque hoc temporibus revertitur.

Alterum genus est pejus & simile papulæ fere, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulæ ex summa cute decidunt, rosio major est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam, quam prior, temporibus & fit, & definit. Rubra cognominatur.

Tertia etiamnum deterior est. nam &¹⁰ crassior est, & durior, & magis tumet; in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra est: proceditque & latet, nec tardat: minus vero errat in temporibus, quibus aut oritur, aut¹⁵ definit; neque ex toto tollitur. Nigræ cognomen est.

Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile;²⁰ squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes: quibus demptis, profluit sanguis nonnunquam. Alioqui vero humor ejus albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque latius.²⁵

Hæc vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus; atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub authore Pro-³⁰ tarcho retuli. Serapion autem, nitri P. I I. *. sulphuris P. IV. * excipiebat resina copiosa, coque utebatur.

18. *De Papulis.*

Papularum vero duo genera sunt. Alterum est, in quo per minimas pustulas
 5 cutis exasperatur, & rubet, leviterque ro-
 ditur, medium habet pauxillo levius: tar-
 de serpit. idque vitium maxime rotundum
 incipit, eademque ratione in orbem pro-
 cedit. Alterum est, quam *ἀϊσέλιαν* Græci
 10 appellant. In qua similiter quidem, sed ma-
 gis cutis exasperatur, exulceraturque, ac
 vehementius & roditur, & rubet, & inter-
 dum etiam pilos remittit.

Quæ minus rotunda est, difficilius sanc-
 15 scit: nisi sublata est, in impetiginem verti-
 tur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva
 quotidie defricetur, sanescit. Major, com-
 modissime murali herba tollitur, si super
 eadem trita est. Ut vero ad composita me-
 20 dicamenta veniamus, idem illud Protar-
 chi tanto valentius in his est, quanto mi-
 nus in his vitii est. Alterum ad idem, Mi-
 conis: nitri rubri, thuris, singulorum p. i.
 *. cantharidum purgatarum p. ii. *. sul-
 25 phuris ignem non experti tantundem, re-
 sinæ terebinthinæ liquidæ p. xx. *. farinæ
 lolii sext. iiii. git cyathi tres, picis cru-
 dæ sext. unum.

30 19. *De Vitiliginis speciebus, id est, de Albo,*
& Melane, & Lence.

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum
 periculum adfert; tamen & fœda est, & ex
 malo corporis habitu fit. Ejus tres species
 Q sunt.

sunt. Ἀλφὸς vocatur, ubi color albus est, fere subasper & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. cætera eadem sunt. Δούρη habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, & altius descendit; in eaque albi pili sunt, & lanu-
gini similes. Omnia hæc serpunt: sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos & Melas in quibusdam variis temporibus oriuntur & desinunt. Leuce, quem occupavit, non facile dimittit.

Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum vix unquam sanescit; ac, si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non; experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet aut acu pungi. si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est.

Super id vero, quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Irenæum auctorem refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia aride paribus portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole vitiligo perungitur: deinde non ita multo post,

post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie quidem, micone authore, eos, quos Alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt:
 5 sulphuris P. II. *. nitri P. IV. *. myrrhæ aridæ contritæ acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hi vero quos Melanas vocari dixi, curantur,
 10 cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba, eaque sine oleo in balneo ante sudorem insperguntur, ac tum genus id vitiliginis defricatur.

15

LIBER SEXTUS.

CAP. I.

De Vitiis singularum corporis partium.

20 **D**IXI de his vitiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consueverunt, orsus à capite.

25

1. *De capillis fluentibus.*

In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. Adjicit etiam vim quandam ad continendum ladanum cum oleo mistum. Nunc de his
 30 pillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo minus caput quibusdam ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

CAP. II.

De Porrigine.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quæ-
dam quasi squamulæ surgunt, cæque
à cute resolvuntur; & interdum ma-
dent, multo sæpius siccæ sunt. Idque eve-
nit modo sine ulcere, modo exulcerato lo-
co. Huic quoque modo malo odore, modo 10
nullo accedente. Fereque id in capillo fit,
rarius in barba, aliquando etiam in super-
cilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio
nascitur, neque ex toto inutile est. Nam
bene integro capite, non exit: ubi aliquod 15
in eo vitium est, non incommodum est,
summam cutem potius subinde corrumpi,
quam id, quod nocet, in aliam partem ma-
gis necessariam verti.

Commodius est ergo subinde peccando 20
repurgare, quam id ex toto prohibere. Si
tamen ea res magis offendit (quod nimium
humore sequente fieri potest; magisque, si
is etiam mali odoris est) caput sæpe raden-
dum est; dein id super adjuvandum ali- 25
quibus ex leviter reprimentibus; quale est
nigrum cum aceto, vel ladanum cum myr-
teo & vino, vel myrobalanum cum vino.
Si parum per hæc proficitur, vehementio-
ribus uti licet; cum eo, ut sciamus, uti- 30
que in recenti vitio id inutile esse.

CAP. III.

De Sycofi.

5 **E**st etiam ulcus, quod à fici similitudine
 σύκωνος à Græcis nominatur, quia caro
 in eo excrefcit : & id quidem generale
 est. Sub eo vero duæ species sunt. Altera,
 ulcus durum & rotundum est : altera, hu-
 10 midum & inæquale. Ex duro exiguum
 quiddam & glutinosum exit : ex humido
 plus, & mali odoris. Fit utrumque in iis
 partibus, quæ pilis conteguntur : sed, id
 quod callosum & rotundum est, maxime
 15 in barba ; id vero quod humidum, præci-
 pue in capillo.

Super utrumque oportet imponere ela-
 terium, aut lini semen contritum & aqua
 coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut
 20 emplastrum tetrapharmacum ex aceto sub-
 actum. Terra quoque Eretria ex aceto
 liquata recte illinitur.

CAP. IV.

De Areii.

25 **A**REARVM quoque duo genera sunt.
 Commune utrique est, quod, emor-
 tua summa pellicula, pili primum ex-
 tenuantur; deinde excidunt: ac, si ictus is lo-
 30 cus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris:
 increfcitque utrumque in aliis celeriter, in
 aliis tarde. Pejus est, quod densam cutem, &
 subpinguem, & ex toto glabram fecit. Sed

ea, quæ ἀλωπικία nominatur, sub qualibet figura dilatatur. Fit & in capillo, & in barba. Id vero, quod à serpentis similitudine ὀφίανς appellatur, incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est: hoc fere in 10 infantibus. Illud vix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur.

Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam. 15 quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam novacula quotidie radere: quia, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neque ante oportet 20 desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento sutorio satis est.

C A P. V.

De Varis, & Lenticulis, & Ephelide. 25

PENE ineptiæ sunt, curare varos, & lenticulas, & ephelidas: sed eripi tamen fœminis cura cultus sui non potest. Ex iis autem, quæ supra proposui, vari lenticulæque vulgo notæ sunt; quamvis rarior ea species est, quam φακίαν Græci vocant; cum sit ea lenticula rubicundior, & inæqua-

qualior. Ἐφελίδες vero à plerisque ignoratur: quæ nihil est, nisi asperitas quædam & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie: lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est.

Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adjectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum est, & interpositis pluribus horis, mane eluendum, oleoque leviter unguendum.

Ἐφελidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis & paulum mellis adjectum est. Ad omnia vero ista, atque etiam ad colorandas cicatrices, prodest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem authorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ cimoliæ subceruleæ, nucum amarum, farinæ hordei atque erui, struthii albi, fertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quam amarissimo cooguntur, illitumque à vespere usque mane cluitur.

CAP. VI.

*De Oculorum morbis : & primo de his , qui
lenibus medicamentis curantur.* 5

SED hæc quidem mediocria sunt. Ingen-
tibus vero & variis casibus oculi no-
stri patent. Qui cum magnam partem
ad vitæ simul & usum & dulcedinem con-
ferant , summa cura tuendi sunt. 10

Protinus autem orta lippitudine , quæ-
dam notæ sunt , ex quibus , quid eventu-
rum sit , colligere possimus. Nam , si simul
& lacryma & tumor & crassa pituita cœpe-
rint ; si ea pituita lachrymæ mista est ; ne- 15
que lachryma calida est , pituita vero alba
& mollis , tumor non durus , longæ valetu-
dinis metus non est. At si lachryma multa
& calida , pituitæ paulum , tumor modicus
idque in uno oculo est ; longum id , sed sine 20
periculo , futurum est. Idque lippitudinis
genus minime cum dolore est ; sed vix an-
te vigesimum diem tollitur : nonnunquam
per duos menses durat ; quandoque brevius
finitur. 25

Si pituita alba & mollis esse incipit ; la-
chrymæque miscetur , aut , si simul hæ
utrumque oculum invaserunt , potest esse
brevior , sed periculum ulcerum est. Pitui-
ta autem sicca & arida dolorem quidem 30
moveret , sed maturius desinit ; nisi quid ex-
ulceravit.

Tumor magnus , si sine dolore est , & siccus ,
fine

sine ullo periculo est : si ficcus quidem , sed cum dolore est , fere exulcerat ; & nonnunquam ex eo casu fit , ut palpebra cum oculo glutinetur. Ejusdem exulcerationis timor in palpebris pupillisve est ; ubi , super magnum dolorem , lachrymæ salis calidæque eunt ; aut etiam si , tumore jam finito , diu lachryma cum pituita profluit.

- 10 Pejus etiamnum est , ubi pituita pallida aut livida est , lachryma calida aut multa profluit , caput calet , à temporibus ad oculos dolor pervenit , nocturna vigilia urget. siquidem sub his oculis plerunque rumpitur , votumque est , ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula juvat. Si foras jam ruptus procedit , sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est , diu manet . At , si asperum , & crassum est , etiam
20 post curationem vestigium aliquod relinquit.

- Curari vero oculos sanguinis detractio-
ne , medicamento , balneo , fotu , vino , vetu-
stissimus author Hippocrates memoriæ
25 prodidit. Sed eorum tempora & causas pa-
rum explicuit : in quibus Medicinæ sum-
ma est. Neque minus in abstinencia & alvi
ductione sæpe auxilii est. Hos igitur interdum inflammatio occupat : ubi cum tumo-
30 re in his dolor est ; sequiturque pituitæ cur-
sus , nonnunquam copiosior vel acrior , non-
nunquam utraque parte moderatior. In
ejusmodi casu prima omnium sunt quies

& abſtinentia. Ergo primo die, loco obſcuro cubare debet ſic, ut à ſermone quoque abſtineat: nullum cibum aſſumere; ſi fieri poteſt, ne aquam quidem; ſi minus, certe quam minimum ejus.

Quod ſi graves dolores ſunt, commodius ſecundo die; ſi tamen res urget, etiam primo ſanguis mittendus eſt, utique ſi in fronte venæ tument, ſi firmo corpore materia ſuper eſt. Si vero minor impetus, minus acrem curationem requirit. Alvum non niſi ſecundo tertiove die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium deſiderat: ſatisque eſt, uti quiete 15 & abſtinentia.

Neque tamen in lippientibus longum jejunium neceſſarium eſt, ne pituita tenuior atque acrior fiat: ſed ſecundo die dari debet id, quod leviffimum videri poteſt ex 20 iis, quæ pituitam faciunt craſſiorem; qualia ſunt ova ſorbilia: ſi minor vis urget, pulicula quoque, aut panis ex lacte. Inſequentibus diebus, quantum inflammationi detrahetur, tantum adjici cibus poterit; ſed 25 generis ejusdem: utique ut nihil falſum, nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, ſumatur; nihil potui præter aquam. Et victus quidem ratio talis maxime neceſſaria eſt. 30

Prætinus autem primo die, croci P. L. *. & farinæ candidæ quam tenuiſſimæ P. I I. *. excipere oportet ovi albo, donec mellis craſſitu-

crassitudinem habeat: idque in linteolum
 illinere, & fronti agglutinare, ut, compres-
 sis venis, pituitæ impetum cohibeat. Si cro-
 5 cum non est, thus idem facit. Linteolo an
 lana excipiat, nihil interest. Superinun-
 gi vero oculi debent sic, ut croci quantum
 tribus digitis comprehendi potest, suma-
 tur, myrrhæ ad fabæ, papaveris lachrymæ
 10 ad lentis magnitudinem, eaque cum passo
 conterantur, & specillo super oculos indu-
 cantur. Aliud ad idem: myrrhæ p. i. *
 mandragoræ succi p. ii. *. papaveris la-
 chrymæ p. ii. *. foliorum rosæ, cicutæ se-
 15 minis, singulorum p. iii. *. acaciæ p. iv.
 *. gummi p. viii. *. Et hæc quidem inter-
 diu: noctu vero, quo commodior quies
 veniat, non alienum est, superimponere
 candidi panis interiorem partem ex vino
 20 subactam. nam & pituitam reprimit, &, si
 quid lachrymæ processit, absorbet, & ocu-
 lum glutinari non patitur.

Si grave id & durum, propter magnum
 oculorum dolorem, videtur, ovi & album
 25 & vitellus in vas defundendum est, adji-
 ciendumque eo mulsi paulum, idque digi-
 to permiscendum; ubi facta unitas est, de-
 mitti debet lana mollis bene carpta, quæ
 id excipiat; superque oculos imponi. Ea
 30 res & levis est, & refrigerando pituitam
 coercet, & non exarescit, & glutinari ocu-
 lum non patitur. Farina quoque hordeacea
 cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta,

commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant: at hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso ægro commode potest: & quia, cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum ¹⁰ aliquid dandum est, quæ ἀνώδυνα Græci appellant: satisque est puero, quod ervi; viro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi immodica inflammatio est, nihil recte conjicitur: sæpe enim potius concitatur eo puita, quam minuitur. At secundo die, gravi quoque lippitudini per indita medicamenta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est; aut, neutrum ²⁰ necessarium esse, manifestum est.

2. *De diversis oculorum collyriis.*

Multa autem multorumque collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum misturis temperari possunt; cum lenia medicamenta, & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ego autem nobilissima exquar.

3. *Philonis collyrium.*

Est igitur Philonis, quod habet cerusæ ³⁰ elotæ, spodii, gummi, singulorum p. i. *. papaveris lachrymæ combustæ p. i. *. Illud scire oportet, hæc quoque omnia medica-

medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore. Gummi cum quafdam alias facultates habeat, hoc maxime præstat, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. *Dionysii collyrium.*

Dionysii collyrium est: papaveris lachrymæ combustæ, donec tenerescat p. i. *.
thuris combusti, gummi, singulorum p. ii. *.
spodii p. iv. *.

5. *Cleonis collyrium.*

Cleonis nobile admodum: papaveris lachrymæ frictæ p. i. *. croci p. i. *. gummi p. *. v. quibus, cum teruntur, adjicitur rosæ succus. Aliud ejusdem valentius: squamæ ferri, quod *σκόμωμα* adpellant, p. i. *. croci p. ii. *. spodii p. iv. *. plumbi & eloti, & combusti p. i. *. gummi tantundem. Ejus aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei p. *. i. aloes p. *. i. myrrhæ p. ii. *. cadmiæ curatæ p. viii. *. stibii tantundem, acaciæ succi p. xii. *. quod, cum miscueris, in pixidicula servetur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lachrymæ combustæ p. *. i. æris combusti & eloti p. ii. *. nucleorum palmarum combustorum p. x. *. gummi p. xii. *.

6. *Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.*

At ipsius Theodoti, quod à quibusdam *ἄχαριστον* nominatur, ejusmodi est: castorei,

commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant: at hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso ægro commode potest: & quia, cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum ¹⁰ aliquid dandum est, quæ ἀνώδυνα Græci appellant: satisque est puero, quod ervi; viro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi immodica inflammatio est, nihil recte conjicitur: sæpe enim potius concitatur eo ¹⁵ pituita, quam minuitur. At secundo die, gravi quoque lippitudini per indita medicamenta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est; aut, neutrum ²⁰ necessarium esse, manifestum est.

2. *De diversis oculorum collyriis.*

Multa autem multorumque collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum misturis temperari possunt; cum lenia medicamen- ²⁵ ta, & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ego autem nobilissima exquar.

3. *Philonis collyrium.*

Est igitur Philonis, quod habet cerus- ³⁰ sæ clotæ, spodii, gummi, singulorum p. i. *. papaveris lachrymæ combustæ p. i. *. Illud scire oportet, hæc quoque omnia medica-

medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore. Gummi cum quafdam alias facultates habeat, hoc maxime præstat, ut, ubi collyria diu facta inatuerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. *Dionysii collyrium.*

Dionysii collyrium est: papaveris lachrymæ combustæ, donec tenerescat p. i. *.
thuris combusti, gummi, singulorum p. i. i. *.
spodii p. iv. *.

5. *Cleonis collyrium.*

Cleonis nobile admodum: papaveris lachrymæ frictæ p. i. *. croci p. i. *. gummi p. *. v. quibus, cum teruntur, adjicitur rosæ succus. Aliud ejusdem valentius: squamæ ferri, quod *σέμαμα* adpellant, p. i. *. croci p. i. i. *. spodii p. iv. *. plumbi & cloti, & combusti p. i. *. gummi tantundem. Ejus aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei p. *. i. aloes p. *. i. myrrhæ p. ii. *. cadmiæ curatæ p. vii. *. stibii tantundem, acaciæ succi p. xii. *. quod, cum miscueris, in pixidicula servetur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lachrymæ combustæ p. *. i. æris combusti & cloti p. ii. *. nucleorum palmarum combustorum p. x. *. gummi p. xii. *.

6. *Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.*

At ipsius Theodoti, quod à quibusdam *ἄχαρις* nominatur, ejusmodi est: castorei,

rei, nardi indici, singulorum P. I. *. lycii P. *. papaveris lachrymæ tantundem; myrrhæ P. II. *. croci, cerussæ elotæ, aloes, singulorum P. III. *. cadmiæ botryitidis elotæ, æris combusti, singulorum P. VII. *. gummi P. XVII. *. acaciæ succi. P. XX. *. stibii tantundem, quibus aqua pluvialis adjicitur.

7. *Cythion vel Tephron collyrium.*

Præter hæc, ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephron appellant. Habet amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum P. I. *. papaveris lachrymæ P. II. *. cerussæ elotæ P. IV. *. spumæ argenti elotæ P. VI. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

8. *Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

Euelpides autem, qui ætate nostra maximus fuit ocularius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat, & *τρυγῶδης* nominabat. Habet autem hoc, castorei P. II. *. lycii, nardi, papaveris lachrymæ, singulorum P. I. *. croci, myrrhæ, aloes, singulorum P. IV. *. æris combusti P. VII. *. cadmiæ, & stibii, singulorum P. XII. *. acaciæ succi P. XXVI. *. gummi tantundem.

Quo gravior vero quæque inflammatio est, eo magis leniri medicamento debet, adjecto vel albo ovi, vel muliebri lacte. At, si neque medicus, neque medicamentum præsto est, sæpius utrumlibet horum in

ocu-

oculos penicillo ad idipsum facto infusum,
id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus
est, jamque cursus pituitæ constitit, reli-
5 quias fortasse leviores futuras discutiunt
balneum & vinum. Igitur lavari debet le-
viter, ante ex oleo perfricatus, diutiusque
in cruribus & feminibus; multaue calida
aqua fovere oculos; deinde per caput
10 prius calida, tum egelida perfundi: à bal-
neo cavere ne quo frigore afflatus læda-
tur: posthæc cibo paulo plenior, quam
ex operum consuetudine, uti; vitatis ta-
men omnibus pituitam extenuantibus: vi-
15 num bibere lene, subausterum, modice
vetus; neque effuse, neque timide; ut ne-
que cruditas ex eo, & tamen somnus fiat,
lenianturque intus latentia acria. Sed, si
quis in balneo sensit majorem oculorum
20 perturbationem, quam attulerat (quod in-
cidere his solet, qui, manente adhuc pituitæ
cursu, festinarunt) quamprimum discere
debet: nihil eo die vini assumere; cibi mi-
nus etiam, quam pridie. deinde cum pri-
25 mum satis pituita substitit, iterum ad usum
balnei redire.

Solet tamen evenire nonnunquam, si-
ve tempestatum vitio, siue corporis, ut pluri-
bus diebus neque dolor, neque inflamma-
30 tio, & minime pituitæ cursus finiatur.
Quod ubi incidit, jamque ipsa vetustate
res matura est, ab his eisdem auxilium pe-
tendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim

ut

ut in recentibus malis aliena sunt; quia concitare ea possunt, & accendere: sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cesserunt, admodum efficacia esse consueverunt. videlicet hic quoque, ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis adjuvantibus. Sed ante tonderi ad cutem convenit: deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fovere: tum utrumque 10 penicillo detergere, & ungere caput irino unguento; continereque in lectulo se, donec omnis calor, qui conceptus est, finiat; desinatque sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi 15 vique genus veniendum est sic, uti potiones meracæ sint; obtegendumque caput, & quiescendum. Sæpe enim posthæc gravis somnus, sæpe sudor, sæpe alvi dejectio pituitæ cursum finit. Si levatum est malum 20 (quod aliquando serius fit) per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus eisdem alvus nihil reddit, ducenda est; quo magis superiores partes leventur. 25

Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos è sua sede propellat. *πρόπτωση* id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti: si id 30 fieri non potest, alvum duci, longioremque inediam induci, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque

que Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei : neque de ullo magis inter omnes authores convenit.

9. *Nilei collyrium, omnium optimum.*

- Id habet nardi Indici, papaveris lachrymæ, singulorum P. *. gummi P. I. *. croci P. II. *. foliorum rosæ recentium P. IV. *.
10 quæ vel aqua pluviatili, vel vino levi subaustero coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere : aut myrrham nigram cum rosæ foliis miscere : aut hyos-
15 cyami folia cum ovi vitello cocta : aut farinam cum acaciæ succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo præparato, penicillo fovere
20 oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua antè vel myrti vel rosæ folia decocta sint : deinde, ex illis aliquid imponi. Præter hæc, ab occipitio incisa cute, cucurbitula adhibenda est.
52 Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum : deinde futurum, ut indurescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se
30 ostendit, ab eo angulo, qui temporis propior est, incidi oculus debet ; ut, effuso pure, inflammatio ac dolor finiatur, & intus tunicæ residant, quo minus fœda postea
facies

facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyriis ex lacte ut ovo ; vel croco , cui album ovi misceatur. At, si induruit , & sic emortuus est, ut ne in pus verteretur ; quatenus fœde prominebit , excidendum erit sic, ut hamo summa tunica apprehendatur, atque infra id scalpellus incidat : tum eadem medicamenta erunt injicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis 10 in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit , peinde per plura loca fissus est.

10. *De Carbunculis oculorum.*

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, 15 nonnunquam in palpebris : & in his ipsis, modo ab interiore, modo ab exteriori parte. In hoc casu alvus ducenda est : cibus minuendus : lac potui dandum ; ut acria, quæ læserunt , leniantur. Quod ad cataplasma- 20 ta & medicamenta pertinet , his utendum, quæ adversus inflammationes proposita sunt. Arque hic quoque Nilei collyrium optimum est. Si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est , ad cataplas- 25 mata aptissimum est lini semen ex mulso coctum ; aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

11. *De pustulis oculorum.*

Pustulæ quoque ex inflammationibus 30 interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit , magis etiam servanda sunt , quæ de sanguine & quiete supra proposui :

posui : sin serius , quam ut sanguis mitti possit , alvus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet , utique victus ratio
 5 servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est ; quale Nilei , quale Cleonis est.

12. *Philetis collyrium , ad pustulas oculorum.*

Id quoque , quod Philetis vocatur , huic
 10 aptum est. Habet enim myrrhæ , papaveris lachrymæ , singulorum P. I. *. plumbi eloti , terræ samiæ , quæ αἰὼς vocatur , tragacanthæ , singulorum P. IV. *. stibii cocti , amyli , singulorum P. VI. *. spodii eloti ,
 15 cerussæ elotæ , singulorum P. VIII. *. quæ aqua pluviali excipiuntur. Usus collyrii , vel ex ovo , vel ex lacte est.

13. *De Ulceribus oculorum , & de*

Διὰ λιβάνου collyrio.

20 Ex pustulis ulcera interdum fiunt ; eaque recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt , & iisdem fere , quæ supra in pustulis proposui. Fit quoque proprie ad hæc , quod διὰ λιβάνου vocatur. Habet æris
 25 combusti , & eloti , papaveris lachrymæ frictæ singulorum P. I. *. spodii eloti , thuris , stibii combusti & eloti , myrrhæ , gummi , singulorum P. II. *.

14. *De Imminutione oculorum.*

30 Evenit etiam , ut oculi , vel ambo , vel singuli , minores fiant , quam esse naturaliter debeant. Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit , & continuati fletus ,

&

& ictus parum bene curati. In his quoque
iisdem lenibus medicamentis ex muliebri
lacte utendum est: cibis vero his, qui ma-
xime corpus alere, & implere consuerunt: 5
vitandaque omni modo causa, quæ lachry-
mas excitet, & cura domesticorum. quo-
rum etiam, si quid forte incidit, ejus no-
titia subtrahendum: atque acria quo-
que medicamenta, & acres cibi non alio 10
magis nomine his nocent, quam quod la-
chrymas movent.

15. *De Pediculis palpebrarum.*

Genus quoque vitii est, qui inter pilos
palpebrarum pediculi nascuntur. id 15
elans Græci nominant. Quod cum ex
malo corporis habitu fiat, raro non ultra
procedit: sed fere, tempore interposito, pi-
tuitæ cursus acerrimus sequitur; exulcera-
tisque vehementer oculis, aciem quoque 20
ipsam corrumpit.

His alvus ducenda est: caput ad cutem
rondendum, diuque quotidie jejunis per-
fricandum. His, ambulationibus aliisque
exercitationibus diligenter utendum: gar- 25
garizandum ex mulso, in quo nepeta &
pinguis ficus decocta sit: sæpe in balneo
multa calida aqua fovendum caput: vitan-
di acres cibi; lacte pingui vinoque uten-
dum: bibendumque liberalius, quam 30
edendum est. Medicamenta vero intus
quidem lenia danda sunt; ne quid acrioris
pituitæ concitent: super ipsos vero pedicu-
los

los alia, quæ necare eos, & prohibere, ne
similes nascantur, possint. Ad idipsum
spumæ nitri p. i. *. sandarachæ p. i. *. uvæ
5 taminia, p. *. i. simul teruntur, adjicitur-
que verus oleum pari portione, atque ace-
tum, donec eis mellis crassitudo sit.

16. *De Oculorum gravioribus morbis, qui ex in-
flammationibus oriuntur, & validioribus
10 medicamentis curantur, & de Andrea
collyrio, & de Ag' négl.*

Haftenus oculorum morbi, qui lenibus
medicamentis nutriuntur. Genera deinde
alia sunt, quæ diversam curationem desi-
15 derant; fere ex inflammationibus nata, sed
finitis quoque his manentia. atque imprimis
in quibusdam perseverat tenuis pituitæ
cursus. Quibus alvus ab inferiore parte
evocanda est, demendumque aliquid ex
20 cibo. Neque alienum est, illini frontem ex
compositione Andrea. Quæ habet gummi
p. i. *. cerussæ, stibii, singulorum p. i i. *.
spumæ argenti coctæ & elotæ p. iv. *. sed
ea spuma ex aqua pluviali coquitur; &
25 arida hæc medicamenta ex succo myrti
conteruntur. His illita fronte, cataplasma
quoque superinjiciendum ex farina, quæ
frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ
succus, aut cupressus adjecta sit. Cucurbi-
30 tula quoque, inciso vertice, recte accom-
modatur; aut ex temporibus sanguis emit-
titur. Inungi vero eo debet, quod habet
squamæ æris, papaveris lachrymæ, singu-
lorum

lorum p. *. cervini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. i v. *. thuris p. xii. Hoc vero collyrium quia cornu habet, *αἰγὶ κίερα* nominant. Quotiescunque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo.

17. *Μεμίσθρον*, *Euelpidis collyrium.*

Ad idem Euelpidis, quod *μεμίσθρον* nominabat. In eo papaveris lachrymæ, & albi piperis, singulæ uncia sunt, gummi libra, æris combusti p. i. *. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam, profunt balneum & vinum. Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, qui extenuant; tum præcipue, quibus tenuis humor diu fertur. Quod si jam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiorē reddunt, sicut in hoc genere materiæ maxime promptum est; confugiendum est ad ea, quæ, quia ventrem, corpus quoque adstringunt.

18. *De Oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidia, cavis, veteribus.*

At ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod *μεμίσθρον* vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo, quod Smilion nominatur.

19. *Smilion collyrium.*

Habet æruginis p. vi. *. gummi tantundem, ammoniaci, minii linopici, singulorum p. xvi. *. quæ quidam ex aqua; quidam, quo vehementiora sunt, ex aceto terunt.

20. *Phynon collyrium Euelpidis.*

Id quoque Euelpidis, quod Phynona appellabat, hic utile est: croci p. i. *. papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. *. æris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum p. iv. piperis albi p. vi. *. Sed ante litum, hoc unguendum est.

21. *Sphærian collyrium Euelpidis.*

Id quoque ejusdem, quod Sphærian nominabat, eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti p. ii. *. piperis grana sex, cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. iii. *. croci p. iv. *. gummi p. vii. *. quæ cum vino aminæo contemuntur.

22. *Liquidum Euelpidis collyrium.*

Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat. in quo erant hæc: æruginis p. *. minii combusti, atramenti sutorii, cinnamomi, singulorum p. iii. *. croci, nardi, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. *. myrrhæ p. ii. *. æris combusti p. ii. *. cineris ex odoribus p. iv. *. piperis grana xv. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passis tribus heminis decoquuntur, donec corpus unum sit. Idque medicamen-

camentum vetustate efficacius fit.

23. *De cavis oculorum ulceribus.*

Cava vero ulcera commodissime implent ex his, quæ supra posita sunt, Sphæ-
rion, & id quod Philetis vocatur. Idem
Sphærion vetustis ulceribus & vix ad ci-
catricem venientibus optime succurrit.

24. *Hermonis collyrium.*

Est etiam collyrium, quod cum ad plu- 10
ra valeat, plurimum tamen proficere in his
ulceribus videtur. Refertur ad Hermonem
authorem. Habet piperis longi p. i. z. *.
albi p. *. cinnamomi, costi, singulorum
p. i. *. atramenti sutorii, nardi, casia, ca- 15
storci, singulorum p. i. *. gallæ p. v. *. myr-
rhæ, croci, thuris, lycii, cerussæ, singulo-
rum p. vii. *. papaveris lacrymæ p. xii.
*. aloes, æris combusti, cadmiæ, singulo-
rum p. xvi. *. acaciæ, stibii, gummi, sin- 20
gulorum p. xxv. *.

25. *De Cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus
facta sunt, & de Asclepia, & Cano-
pite, & Pyxino, collyriis.*

Factæ vero ex ulceribus cicatrices duo- 25
bus vitiis periclitantur; ne aut cavæ, aut
crassæ sint. Si cavæ sunt, potest eas im-
plere id, quod Sphærion vocari dixi; vel
id, quod Asclepias nominatur. Habet hoc
papaveris lacrymæ p. ii. *. sagapeni, opo- 30
panacis, singulorum p. iii. *. æruginis p.
iv. *. gummi p. vii. *. piperis p. xii. *.
cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum p. xvi. *.

At,

At, si crassæ cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium; quod habet cinnamomi, acaciæ, singulorum p. 5
 1. *. cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ, papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. 11.
 *. piperis albi, thuris, singulorum p. 111.
 *. æris combusti p. 1x. *. cum aqua pluviali. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his
 10 constat: salis fossilis p. 1v. *. ammoniaci thymiamatis p. viii. *. pipaveris lachrymæ p. xii. *. cerussæ. p. xv. *. piperis albi, croci cilicii, singulorum p. l11. *. gummi p. xiii. *. cadmiæ elotæ p. 1x. *. Ma-
 15 xime tamen tollere cicatricem videtur id, quod habet gummi p. 111. *. æruginis p. 1. *. crocomagmatis p. 1v. *.

26. *De alio genere Inflammationis oculorum.*

Est etiam genus inflammationis, in qua, si
 20 cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte mitti necessarium est: multaque aqua calida caput atque oculos fovere: gargarizare ex lenticula, vel ex fici cremore: inungi acribus medica-
 25 mentis, quæ supra comprehensa sunt; maximeque eo, quod Sphæriorion nominatur, quodque lapidem hæmatiten habet. Atque alia quoque utilia sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt; de qua protinus
 30 dicam.

Hæc autem inflammationem oculorum fere sequitur; interdum major, interdum levior. Nonnunquam etiam ex aspritu-

R dine

dine lippitudo fit, atque ipsam deinde aspritudinem auget, fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, & quæ vix unquam finiatur.

In hoc genere valetudinis quidam crassas, durasque palpebras, & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt; versasque quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi in magna ¹⁰ vetustaque aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodem ratione victus & idoneis medicamentis pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore; multaque oculorum palpe- ¹⁵ bras aqua calida fovebimus: cibi autem sumendi sunt acres & extenuantes.

27. *Cæsarianum collyrium.*

At medicamentum id, quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorii P. 20
I. *. misyos P. *. piperis albi P. v. *. papaveris lachrymæ, gummi, singulorum P. II.
*. cadmiæ lotæ. P. III. *. itibii P. VI. *. Satisque constat, hoc collyrium adversus omne genus oculorum valetudinis ido- ²⁵ neum esse; exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

28. *Hieracis collyrium.*

Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest. Habet myrrhæ P. I. 30
*. ammoniaci thymiamatis P. II. *. æruginis rasæ P. IV. *. cum aqua pluviali. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopite,

te, & id quod Smilion vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphærian. Si autem composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quam optimo melle satis commode aspritudo curatur.

29. *De arida lippitudine.*

Est etiam genus aridæ lippitudinis, quod *Ξηροφθαλμία* Græci appellant. Sub hoc neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam fere levi ac prurigine graves sunt, & palpebræ citra duritiem ullam noctur præ gravi pituita inhærescunt: quantoque minor generi huic impetus, tanto finis minus expeditior est.

In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari sæpe, ibique desudare, multaq; fricatione uti necessarium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius perfricare.

30. *Rhinion collyrium.*

Collyrium vero hoc aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ p. i. *. papaveris lachrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum p. i. *. lapidis hæmatitis, lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum p. ii. *. æris combusti p. iv. *. Ac pyxinum quoque eidem accommodatum est.

31. De Scabris oculis.

Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion, id quod supra positum est. Potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaveris lachrymæ, singulorum p. ii. *. piperis albi, gummi, singulorum p. iv. *. cadmiæ lotæ, cerussæ, singulorum p. vi. *. Nullum tamen 10 melius est, quam Euelpidis, quod βασιλικόν nominabat. Habet papaveris lachrymæ, cerussæ, lapidis Asii, singulorum p. ii. *. gummi p. xiii. *. piperis albi p. iv. *. croci p. vi. *. psorici p. xiii. *. Nulla 15 autem per se materia est, quæ Psoricum nominetur; sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul contemruntur, idque in vas fictile inditum, & contactum ficulneis foliis, sub terra reponitur 20 diebus viginti, & rursus sublatum teritur, & sic appellatur psoricum. Verum de basilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non lenibus medicamentis curantur. 25

At, ubi non sunt medicamenta composita, scabros angulos lævant & mel & vinum. Succurritque & his & aridæ lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam, cum fere sit 30 humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras exasperat, sic & si quid prodit humoris, extrahitur; & si

si quid juxta est , repellitur.

32. *De Caligine oculorum.*

Caligare vero oculi nonnunquam ex lippitudine , nonnunquam etiam sine hac , propter senectutem , imbecillitatemve aliam, consueverunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est , adjuvat collyrium , quod Asclepias nominatur. Adjuvat & id,
10 quod ex crocomagmate fit.

33. *Διὰ κρόκου collyrium.*

Proprie etiam ad id componitur , quod *διὰ κρόκου* vocant. Habet piperis P. I. *. croci cilicii , papaveris lachrymæ, cerussæ,
15 singulorum P. II. *. psorici, gummi, singulorum P. IV. *.

34. *De Caligine propter senectutem, aut aliam imbecillitatem.*

At, si ex senectute aliave imbecillitate id
20 est, recte inungi potest, & melle quam optimo, & cyprino , & oleo vetere. Commo-
dissimum tamen est, balsami partem unam, & olei veteris, aut cyprini partes duas, mel-
lis quam acerrimi partes tres miscere. Uti-
25 lia quoque huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime, quæque ad extenuan-
das cicatrices supra comprehensa sunt.

Cuicunque vero oculi caligabunt , huic opus erit multa ambulatione, atque exerci-
30 tatione , frequenti balneo , ubi totum qui-
dem corpus perfricandum est , præcipue tamen caput ex irino , donec insudet ; ve-
landumque postea, nec detegendum, ante-

quam sudor & calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus, & extenuantibus: interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum. 5

35. *De Suffusione oculorum.*

Suffusio quoque, quam Græci *ὕψισον* nominant, interdum oculi pupillæ, qua cernit, se opponit. Quod si inveteraverit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere; in temporibus venas adurere; gargarizando pituitam evocare; suffumigare; oculos acribus medicamentis inungere, expedit. 15
Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

36. *De Resolutione oculorum.*

At ne resolutio quidem oculorum (quam *παράλυσις* Græci nominant) alio victus modo, vel aliis medicamentis curanda 20 est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in uno oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer ipse 25 oculus convulsus est, ut is neque quoquam intendi possit, neque omnino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

37. *De Mydriasi oculorum.*

Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla diffunditur & dilatatur, aciesque ejus hebescit, 30

scit, ac pene caligat. Difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero, id est paralyfi & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adjiciendum est; oculos vero melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi, relevatique: quidam sine ulla manifesta causa subito obcæcati sunt. Ex quibus nonnulli, cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, & recenti re & interposito tempore, medicamentis quoque moliri dejectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

38. *De Imbecillitate oculorum.*

20 Præter hæc imbecillitas oculorum est, ex qua quidem interdum satis, noctu nihil cernunt. quod in fœminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet sanguine jocinois (maxime hircini; sin minus, caprini) ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem exte-
30 nuant. Quidam contrito semine portulacæ mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo distillet, eoq; inungunt. Utendum vero est exercitationibus, balneo, & fricationibus.

39. *Ad Ocnlos, qui extrinsecus offenduntur,
& sanguine suffusi sunt.*

Et hæc quidem in ipsis corporibus ori-
untur. Extrinsecus vero interdum sic ictus
oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-
datur. Huic nihil commodius est, quam
sanguine vel columbæ, vel palumbæ, vel
hirundinis inungere. Neque id sine causa
fit; cum harum acies extrinsecus læsa, in- 10
terposito tempore in antiquum statum re-
deat, celerrimeque hirundinis. Unde etiam
locus fabulæ factus est, per parentes id
herba restitui, quod per se sanescit. Eorum
ergo sanguis nostros quoque oculos ab ex- 15
terno casu commodissime tuetur, hoc or-
dine; ut sit hirundinis optimus, deinde pa-
lumbæ, minimum efficax columbæ, & si-
bi ipsi, & nobis.

Supra percussum vero oculum, ad in- 20
flammationem leniendam, non est alienum
imponere etiam cataplasmata. Sed sal ar-
meniacus, vel quilibet alius quam optime
teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjici-
atur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id 25
deinde miscendum est cum hordeacea fari-
na, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem,
recognitis omnibus, quæ medici quoque
prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix
ullum ex iis, quæ supra comprehensa sunt, 30
oculi vitium esse, quod non simplicibus
quoque, & promptis remediis subinde re-
moveri possit.

C A P.

C A P. V I I.

De Aurium morbis.

5 **H**ACTENUS in oculis ea reperiuntur ;
in quibus medicamenta plurimum
possunt : ideoque ad aures transeun-
dum est ; quarum usum proximum à lumi-
nibus natura nobis dedit. Sed in his ali-
10 quanto majus periculum est. nam vitia o-
culorum intra ipsos nocent : aurium in-
flammationes doloresque, interdum etiam
ad dementiam mortemque præcipitant.
Quo magis inter initia protinus succur-
15 rendum est, ne majori periculo locus sit.

Ergo, ubi primum dolorem aliquis sen-
sit, abstinere & continere se debet. Poste-
ro die, si vehementius malum est, caput
tondere, idque irino unguento calido per-
20 ungere, & operire. At magnus cum febre
vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque
mittatur. Si id aliquæ causæ prohibent,
alvus solvenda est. Cataplasmata quoque
calida, subinde mutata, proficiunt ; sive
25 fœni græci, sive lini, sive alia farina ex
mulso decocta. Recte etiam subinde admo-
ventur spongiæ, ex aqua calida expressæ.
Tum, levato dolore, ceratum circumdari
debet ex irino, aut cyprino factum. In qui-
30 busdam tamen melius, quod ex rosa est, pro-
ficat. Si vehemens inflammatio somnum ex
toto prohibet, adjici cataplasmati debent,
papaveris cortices fricti atque contriti, sic

R 5

ut

ut ex his pars dimidia sit ; eaque tum simul ex passo vel mulso decoquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet ; quod semper ante tepesceri convenit, comodissimeque per strigilem instillatur, ubi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus continet. Et hæc quidem communia sunt.

Medicamentum vero est & rosæ, & radicum arundinum succus, & oleum, in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita vero ad inflammationem dolo- remque leniendum hæc fere sunt : castorei, papaveris lachrymæ pares portiones conteruntur, deinde adjicitur his passum. Vel papaveris lachrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur. Vel id, quod amarum in ægyptia faba est, conteritur, rosa adjecta. Quibus myrrhæ quoque paululum à quibusdam miscetur, vel papaveris lachrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amatarum nucum cum rosa succus. Vel castorei, myrrhæ, papaveris lachrymæ pares portiones cum passo. Vel croci P. I. *. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum P. III. *. quibus, cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idque ex primis medicamentis est. Vel papaveris lachryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis ; quæ
habet

habet castorei, opopanacis, papaveris lachrymæ ex aceto, singulorum p. ii. *. spumæ nitri p. iv. *. quæ contrita passo
 5 excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant; atque ita reponuntur. Ubi usus requirit, rursus id medicamentum, adjecto passo, pistillo teritur. Illud perpetuum est, quotiescunque crassius medicamentum
 10 est, quam ut in aurem instillari possit, adijciendum cum esse humorem, ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit.

2. De Pure & malo odore aurium.

Si vero pus quoque aures habent, recte
 15 lycium per se infunditur; aut irinum unguentum; aut porri succus cum melle; aut centaureæ succus cum passo; aut succus mali punici in ipsius cortice tepesfactus, adjecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam
 20 miscentur myrrhæ, quam *σαντλί* cognominant, p. i. *. croci tantundem, nuces amaræ xxv. mellis sesquicyathus. quæ contrita, cum utendum est, in cortice mali punici tepesiant. Ea quoque medica-
 25 menta, quæ oris exulcerati causa componuntur, æque ulcera aurium sanant. Quæ si vetustiora sunt, & multa sanies fluit, apta compositio est, quæ ad authorem Erasistratum refertur. habet piperis, croci, sin-
 30 gulorum, p. i. *. myrrhæ, misy cocti, singulorum p. ii. *. æris combusti p. ii. *. hæc ex vino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur passi heminæ tres, & si-

mul incoquuntur. Cum vero utendum est, adjicitur his mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum, quod habet lentisci, gallæ, singulorum p. i. *. omphacii p. i. *. succum punici mali. Est & Menophili validum admodum, quod ex his constat : piperis longi p. i. *. castorei p. ii. *. myrrhæ, croci, papaveris lachrymæ, nardi Syriaci, thuris, malicorii, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quam optimi, singulorum p. iv. *. Quibus, dum cōteruntur, adjicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passifiat. Est & Cratonis : cinna-
 15 momi, cassiæ, singulorum p. i. *. nardi, lycii, myrrhæ, singulorum p. i. *. aloes p. ii. *. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus lycium cum vino decoquitur; deinde his alia miscentur. At, si multum puris, 20
 malusque odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum p. ii. *. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur. ubi utendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris lachrymæ, 25
 acaciæ succi par pondus miscetur, hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; ea-
 que trita ex vino diluuntur. Per se quoque hyoscyami succus satis proficit. 30

3. *Compositiones ad omnia aurium vitia.*

Commune vero auxilium adversus omnes aurium casus, jamque usu comprobatum

tum Asclepiades composuit. In eo sunt cin-
namomi, casia, singulorum P. 1. *. floris
junci rotundi, castorei, piperis albi & lon-
gi, amomi, myrobalani, singulorum scri-
puli duo, thuris masculi, nardi syriaci,
myrrha pinguis, croci, spumæ nitri, singu-
lorum P. 11. *. Quæ separatim contrita,
rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque
ita condita, ubi utendum est aceto diluun-
tur. Eodem modo commune auxilium
auribus laborantibus est Polybi sphragis ex
dulci vino liquata. Quæ compositio priori
libro continetur.

15 Quod si & sanies profluit, & tumor est,
non alienum est, mixto vino per oricula-
rium clysterem eluere; & tum infundere
vinum austerum cum rosa mixtum, cui
spodii paulum sit adjectum, aut lycium
20 cum lacte, aut herbæ sanguinalis succum
cum rosa, aut mali punici succum cum exi-
gua parte myrrhae.

4. De Ulcere sordido aurium.

Si sordida quoque ulcera sunt, melius
25 mulso eluuntur; & tum aliquod ex his,
quæ supra scripta sunt, quod mel habeat,
infunditur. Si magis pus profluit, & caput
utique tondendum, & multa calida aqua
perfundendum, & gargarizandum, & usque
30 ad lassitudinem ambulandum, & cibo mo-
dico utendum est. Si cruor quoque ex ul-
ceribus apparet, lycium cum lacte debet
infundi; vel aqua, in qua rosa decocta sit,
succo

succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adjecto.

Quod si super ulcera caro increvit, ea-
que mali odoris, & sanguinem fundit, aqua
repida elui debet; tum infundi id, quod
ex thure & ærugine, & aceto, & melle fit,
aut mel cum ærugine incoctum. Squama
quoque æris cum sandaracha contrita per
fistulam recte instillatur. 10

5. *De Vermibus aurium.*

Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt,
protrahendi oriculario specillo sunt: si
longius, medicamentis enecandi; caven-
dumque, ne postea nascantur. Ad utrum- 15
que proficit album veratrum cum aceto
contritum. Elui quoque aurem oportet vi-
no, in quo marrubium decoctum sit. Sic
emortui vermes in primam auris partem
prolabuntur, unde facillime educi possunt. 20

6. *Ad Compressa aurium foramina.*

Si foramen auris compressum est, & in-
tus crassa sanies subest, mel quam optimum
indendum est. Si id parum proficit, mellis
cyatho & dimidio, æruginis rasæ p. 11. *. 25
adjiciendum est, incoquendumque, & co-
utendum. Iris quoque cum melle ad idem
proficit. Item mellis & rosæ scripuli duo.
Item galbani p. 11. *. myrrhæ cum melle,
& fellis taurini, singulorum p. 11. *. vini 30
quantum satis est ad myrrham diluendam.

7. *Ad Gravem auditum.*

Ubi vero gravius aliquis audire cœpit
(quod

(quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut
5 crusta , qualis super ulcera innascitur , aut sordium coitus. Si crusta est , infundendum est aut oleum calidum , aut cum melle ærugo, vel porri succus , aut cum mulso nitri paulum. Atque, ubi crusta ex auricu-
10 la procidit , eluenda est aqua tepida ; quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahat. Si sordes eæque molles sunt , eodem specillo eximendæ sunt. At, si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum in-
15 jiciendum est ; cumque emollitæ sunt , eodem modo elui aurem , purgarique oportet. Quod si capitis gravitas manet , attondendum idem ; & leniter , sed diu perfri-
candum est , adjecto vel irino vel laureo
20 oleo , sic ut utrilibet paululum aceti miscatur : tum diu ambulandum , leniterque post unctionem aqua calida caput foven-
dum : cibisque utendum ex imbecillissima & media materia ; magisque assumendæ
25 dilutæ potiones ; nonnunquam gargari-
zandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto & laureo oleo & succo radiculæ corticis : aut cucumeris agrestis succus , adjectis rosæ foliis contri-
30 otis. Immaturæ quoque uvæ succus cum rosa instillatus , adversus surditatem satis proficit.

Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsæ sonant. Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Levissimum est, 5 ubi id ex gravedine est: pejus, ubi ex morbo, capitisve longis doloribus incidit: pessimum, ubi, magnis morbis venientibus, maximeque comitali, provenit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, & 10 spiritum continere, donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, fricationem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt: cibus non uten- 15 dum nisi extenuantibus: in aurem dandus radiculae succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde mel- 20 le cocto excipitur, & inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his cœpit, ideoque novo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo oleo; aut huic mixtum casto- 25 reum cum succo nucum amararum; aut myrrha & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio: eademque facienda sunt, quæ supra com- 30 prehendi, cum majore quoque diligentia: & præterea, donec is sonus finiatur, à vino abstinendum.

Quod si simul & sonus est, & inflammatio,

tio, laureum oleum coniecisse abunde est, aut id, quod ex amaris nucibus exprimitur; quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

9. *Ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda.*

Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal.

- Si pulex intus est, compellendum eo lanæ paululum est; quo ipse si subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem injiciendum, ibique vertendum est. utique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paululum recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media, inhærens capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cujus auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam non emineat: tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur; atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

CAP. VIII.

De Narium morbis.

NARES vero exulceratas fovere oportet vapore aquæ calidæ. Id & spongia expressa atque admota fit, & subiecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa, aut argenti spuma. cum quodlibet horum aliquis conterit, ei, dum teritur, invicem vinum & oleum myrteum adjiciat, donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem ea ulcera circa os sunt, pluresque crustas & odorem fœdum habent, quod genus Græci ὀζανον appellant; sciri quidem debet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen hæc tentari possunt; ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur, multaque calida aqua perfundatur: multa eidem ambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinæ terebinthinæ congi- ciatur (quod specillo quoque involuto lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus ejus sentiatur. Sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ subjiciendus est: deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut men-

menthæ, aut marrubii succus; aut atramentum sutorium, quod candefactum, deinde contritum sit; aut interior scillæ
5 pars contrita; sic ut horum cuilibet mel adjiciatur. Cujus in cæteris admodum exigua pars esse debet; in atramento sutorio tanta, ut ea mistura liquida sit; cum scilla utique pars major; involvendumque lana
10 specillum est, & in eo medicamentum tingendum, eoque ulcera implenda sunt. Rursusque linamentum involutum & oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumque in narem, & ab inferiore
15 parte leniter deligandum. Idque per hiemem & ver bis die; per æstatem & autumnum, ter fieri debet.

2. *De Carnosis carunculis narium.*

Interdum vero in naribus carunculæ
20 quædam similes muliebribus mammis nascuntur, hæque imis partibus, quæ cartilaginossæ sunt, inhærent. Has curare oportet medicamentis adurentibus; sub quibus ex toto consumuntur. Πολύπυς vero
25 est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium ossibus inhæret; & modo ad labra tendens narem implet, modo retro per id foramen quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, ut post
30 uvam conspici possit; strangulatque hominem, maxime austro aut euro flante; fereque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat; fereque

καρπινώδης est; itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet minii sinopici, chalcitidis, calcis, sandarachæ, singulorum P. I. *. atramenti futorii P. II. *.

C A P. I X.

10

De Dentium dolore.

IN dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circumcidendum est: cibo quoque primo abstinendum; deinde eo modico mollique utendum, ne mandentis dentes irriter; tum extrinsecus admovendus per spongiam vapor aquæ calidæ; imponendumque ceratum ex cypri-
no aut irino factum, lanaque id compre-
hendendum, caputque velandum est. Quod si gravior dolor est, utiliter & alvus ducitur, & calida cataplasmata super maxillam injiciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpius-
que mutatur. Cujus rei causa & quinque-
folii radix in vino mixto coquitur; & hyoscyami radix vel in posca, vel in vino mixto coquitur sic, ut paululum his salis adjiciatur; & papaveris non nimium aridi cortices, & mandragoræ radix, eodem modo. Sed in his tribus utique vitandum est, ne, quod haustum erit, devoretur. Ex populo quo-

quoque alba cortex radicis in hunc usum
 in vino mixto recte coquitur; aut in aceto
 cornu cervini ramentum & nepeta cum
 5 teda ac ficu pingui: item ficus pinguis vel
 in mulso, vel in aceto & melle; ex quibus
 cum ficus discocta est, is humor percola-
 tur. Specillum quoque lana involutum
 in calidum oleum demittitur, eoque ipse
 10 dens fovetur. Quinetiam quædam quasi
 cataplasmata in dentem ipsum induntur.
 in quem usum ex malo punico acido atque
 arido malicorii pars interior cum pari por-
 tione & gallæ & pinei corticis conteritur,
 15 misceturque his minium; eaque contrita
 aqua pluviali coguntur: aut panacis, pa-
 paveris lachrymæ, peucedani, uuæ taminia
 sine seminibus pares portiones conterun-
 tur: aut galbani partes tres, papaveris la-
 20 chrymæ pars quarta. Quicquid dentibus
 admotum est, nihilo minus supra maxil-
 lam ceratum (quale supra posui) esse debet
 lana obtectum. Quidam etiam myrrhæ,
 cardamomi, singulorum P. I. *. croci, pyre-
 25 thri, ficorum, piperis, singulorum P. IV. *.
 sinapis P. VII. *. contrita linteolo illinunt,
 imponuntque in humero partis ejus, qua
 dens dolet; si is superior est, à scapulis; si in-
 ferior, à pectore: idque dolorem levat; &
 30 cum levavit, protinus submovendum est.

Si vero exesus est dens, festinare ad exi-
 mendum eum, nisi res coegit, non est ne-
 cesse: sed tum omnibus fomentis, quæ su-

pra

praeposita sunt, adjiciendæ quædam valen-
 tiores compositiones. sunt, quæ dolorem
 levant. quales hæ sunt, quæ habent papa-
 veris lachrymæ p. i. *. piperis p. ii. *. foreos
 p. x. *. quæ contrita galbano excipiuntur,
 idque circumdatur: aut Menemachi, maxi-
 me ad maxillares dentes; in quæ sunt, croci
 p. i. *. cardamomi, thuris fuliginis, ficorū,
 piperis, pyrethri, singulorum p. iv. *. sinapis
 p. vii. *. Quidā autem miscent pyrethri,
 piperis, elaterii, singulorum p. i. *. alumi-
 nis scissilis, papaveris lachrymæ, uvæ ta-
 minia, sulphuris ignem non experti, bi-
 tuminis, lauri baccarum, sinapis, singulo-
 rum p. ii. *. Quod si dolor eximi cum co-
 git, piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem modo bacca hederæ conjecta in ejus
 foramen, dentem findit, isque per testas ex-
 cidet. Plani quoque piscis (quam nos pasti-
 nacam, Græci *πρυγία* vocant) aculeus tor-
 retur, deinde conteritur, resinaque exci-
 pitur, quæ denti circumdata hunc solvit.
 Alumen quoque scissile in foramen conje-
 ctum dentem citat. Sed id tamen involu-
 tum in lanula demitti commodius est; quia
 sic & dentem servat, & dolorem levat.
 Hæc à Medicis accepta sunt: sed agrestium
 experimento cognitum est, cum dens do-
 luerit, herbam mentastrum cum suis radi-
 cibus evelli debere, & in pelvem mitti, su-
 praque aquam infundi, collocarique juxta
 sedentem hominem undique veste conte-
 ctum;

Etum ; tum in pelvem candentes filices demitti, sic, ut aqua tegantur, hominemque cum hiantē ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit; idque longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

C A P. X.

De Tonsillis.

SI vero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumescunt, caput quoque velandum est, & extrinsecus is
 15 locus vapore calido fovendus; multa ambulatione utendum; caput in lecto sublimē habendum; gargarizandumque reprimētibz medicamentis. Radix quoque ea, quam dulcem appellant, confusa & in passo
 20 mulsove decocta, idem præstat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est; quæ hoc modo fiunt. Ex malo punico dulci succus exprimitur, & ejus sextarius ad lenem ignem decoquitur,
 25 donec ei mellis crassitudo sit; tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. i i. *. per se conteruntur, paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur,
 30 & rursus leniter incoquantur: aut ejusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita hæc adjiciuntur; nardi p. *. omphacii p. i. *. cinnamomi, myr-

myrrhæ, casia, singulorum p. i. *. Eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quoque valetudine lenis esse debet, ne exasperet. 5

Quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum; cibo abstinendum, neque assumendum quicquam præter aquam calidam est: alvus quoque ducenda est: gargarizandumque 10 ex fico & mulso: illinendumque mel cum omphacio. extrinsecus admovendus, sed aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde mulso calido gargarizandum. 15

At, si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum est, 20 illinendaque ulcera hoc medicamento: passi quam dulcissimi tres heminæ ad unam coquuntur; tum adjicitur thuris p. i. *. croci, myrrhæ, singulorum, p. *. iterumque omnia fervere. Ubi pura ulcera 25 sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hic quoque cibus lenibus opus est; quibus adjici dulce vinum potest.

CAP. XI.

30

De Oris ulceribus.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda

cunda sunt , optime his medicamentis
curantur , quæ supra posita ex malis puni-
cis fiunt. Continendusque sæpe ore repri-
5 mens cremor est , cui paulum mellis sit
adjectum : utendumque ambulationibus ,
& non acri cibo. Cum vero pura ulcera
esse cœperunt , lenis humor , interdum
etiam quam optima aqua ore continenda
10 est. Prodestque assumptum purum vinum ,
pleniorque cibus , dum acribus vacet : in-
spargique ulcera debent alumine scissili , cui
dimidio plus gallæ immaturæ sit adjectum.

Si jam crustas habent , quales in adustis
15 esse consuerunt , adhibendæ sunt compo-
sitiones , quas Græci *ἰσχυρὰς* nominant. Ha-
bent hæ junci quadrati , myrrhæ , sandara-
chæ , aluminis , pares portiones : aut croci ,
myrrhæ , singulorum P. II. *. iridis , alu-
20 minis scissilis , sandarachæ , singulorum P.
IV. *. junci quadrati P. VIII. *. aut gallæ ,
myrrhæ , singulorum P. II. *. aluminis
scissilis P. II. *. rosæ foliorum P. IV. *. Qui-
dam autem croci P. *. aluminis scissilis ,
25 myrrhæ , singulorum P. I. *. sandarachæ
P. II. *. junci quadrati P. IV. *. miscent.
Priora arida insperguntur : hoc cum melle
illinitur ; neque ulceribus tantum , sed
etiam tonsillis.

30 Verum ea longe periculosissima sunt ul-
cera , quas *ἄφθας* Græci appellant ; sed in
pueris. hos enim sæpe consumunt. in viris
& mulieribus idem periculum non est.

Hæc ulcera à gingivis incipiunt; deinde
 palatum, totumque os occupant; tum ad
 uvam faucesque descendunt. quibus obses-
 sis, non facile fit, ut puer convalescat. ac 5
 miserius etiam est, si lactens adhuc infans
 est; quo minus imperari remedium aliquod
 potest. Sed inprimis nutrix cogenda est
 exerceri ambulationibus, & his operibus,
 quæ superiores partes movent: mittenda 10
 in balneum, jubendaque ibi calida aqua
 mammas perfundere: tum alenda cibus le-
 nibus, & his qui non facile corrumpun-
 tur: potione, si febricitat puer, aquæ: si
 sine febre est, vini diluti, ac, si alvus nutriti 15
 subsistit, ducenda est. Si pituita in os ejus
 coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera per-
 ungenda sunt melle, cui rhus quem syria-
 cum vocant, aut amaræ nuces adjectæ sunt:
 vel mistis inter se rosæ foliis aridis, nucleis 20
 pini, mentha, collectis cum melle: vel eo
 medicamento, quod ex moris fit: quorum
 succus eodem modo, quo punici mali, ad
 mellis crassitudinem coquitur, eademque
 ratione ei crocum, myrrha, alumen, vi- 25
 num, & mel miscetur. Neque quicquam
 dandum, à quo humor evocari possit. Si
 vero jam firmior puer est, gargarizare de-
 bet his fere, quæ supra comprehensa sunt.
 Ac, sic leniora medicamenta in eo parum 30
 proficiunt, adhibenda sunt ea, quæ adu-
 rendo crustas ulceribus inducant. Valens
 quoque est scissile alumen, vel chalcitis, vel
 atramen-

atramentum futorium. Prodest etiam fa-
mes & abſtinentia, quanta maxima impe-
rari poteſt. Cibus debet eſſe lenis. Ad pur-
ganda tamen ulcera, interdum caſcus ex
melle recte datur.

C A P. X I I.

De Linguae ulceribus.

10 **L**INGUÆ quoque ulcera non aliis me-
dicamentis egent, quam quæ prima
parte ſuperioris capitis expoſita ſunt.
Sed quæ in latere ejus naſcuntur, diutiſ-
ſime durant. Videndumque eſt, num con-
15 tra dens aliquis acutior ſit, qui ſaneſcere
ſæpe ulcus eo loco non finit, ideoque li-
mandus eſt.

C A P. X I I I.

20 *De Parulidibus & ulceribus gingivarum.*

SOLENT etiam interdum juxta dentes
in gingivis tubercula quædam oriri
dolentia; *παρυλίδας* Græci appellant.
Hæc initio leniter ſale contrito perfricare
25 oportet; aut inter ſe mixtis ſale foſſili com-
buſto, cupreſſo, nepeta; deinde eluere
os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare,
donec pituitæ ſatis profluat. In majore
vero inflammatione iſdem medicamentis
30 utendum eſt, quæ ad ulcera oris ſuprapoſi-
ta ſunt: & mollis linamenti paululū invol-
vendum aliqua compositione ex his, quas
ἀνθραξ vocari dixi; demittendumque id
S 2. inter

inter dentem & gingivam. Quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admo-
vendus erit spongiæ vapor calidus, impo-
nendumq; ceratum. Si suppuratio se osten-
det, diutius eo vapore utendum erit: &
continendum ore calidum mulsum, in quo
ficus decocta sit. Idemque subcrudum in-
cidendum, ne, si ibi diutius pus permanse-
rit, os lædat. Quod si major is tumor est, 10
commodius totus exciditur, sic ut ex utra-
que parte dens liberetur. Pure exempto,
si levis plaga est, satis est ore calidam aquã
continere, & extrinsecus fovere eodem
vapore: si major est, lenticulæ cremore uti, 15
iisdemque medicamentis, quibus cætera
ulcera oris curantur.

Alia quoque ulcera in gingivis plerun-
que oriuntur, quibus eadem, quæ in reli-
quo ore, succurrunt. Maxime tamen man- 20
dere ligustrum oportet, succumque eum
ore continere. Fit etiam interdum, ut ex
gingivæ ulcere, siue *παρὰ τὸ* fuit, siue non
fuit, diutius pus feratur, dente aut corru-
pto, aut fracto, vel aliter vitiato osse: 25
maximeque id per fistulam evenire con-
suevit. Quod ubi incidit, locus aperi-
endus, dens eximendus; testa ossis, si qua de-
cessit, recipienda est; si quid vitiosus est, ra-
dendum. Post quæ, quid fieri debeat; su- 30
pra in aliorum ulcerum curatione compre-
hensum est. Si vero à dentibus gingivæ re-
cedunt, eadem antheræ succurrunt. Uti-
le

le est etiam pira aut mala non permatura mandere, & ore cum humorem continere. Idemque præstare non acre acetum in ore retentum potest.

CAP. XIV.

De Uvæ morbo.

- 10 **U**væ vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur; &, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur: caputque super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum
- 15 aqua gargarizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uva vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum huic
- 20 aptum, quod Andronium appellatur. constat ex his; alumine scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy. quæ per se contrita, mixtaque rursus paulatim adjecto vino austero, teruntur,
- 25 donec his mellis crassitudo sit. Chelidoniæ quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit: cumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum.
- 30 Quod si minor in ea inflammatio, laser terere, eique adjicere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipsi uvæ subjicere. Ac mediocriter eam tu-

mentem aqua quoque frigida, eodem modo subjecta, reprimit. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, vel cum lasere, vel sine eo. At curationis uvæ productæ per manum, ratio subjecta est.

C A P. XV.

De Cancro oris.

Si quando autem ulcera oris cancer invasit, primo considerandum est, num malus corporis habitus sit; eique occurrendum: deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera, humido ulceri arida inspersa; sicciori, cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes duæ, auripigmenti pars una. Si penitius malum descendit, chartæ combustæ partes tres, auripigmenti pars quarta: aut pares portiones salis fricti, & iridis frictæ: aut etiam pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere; ne vicinum & sanum locum lædant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem conjiciunt, donec tabescere desinat; deinde id acetum coquunt, donec exiccetur; eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum injicitur, & ante & post os diluendum est vel cremore lenticulæ, vel aqua, in qua aut ervum, aut oleæ,

aut

aut verbenæ decoctæ sint, sic, ut cuilibet
 eorum paululum mellis misceatur. Acc-
 tum quoque ex scilla retentum ore, satis
 5 adversus hæc ulcera proficit: & ex aceto
 cocto sali, sicut supra demonstratum est,
 rursus mistum acetum. sed & diu contine-
 re utrumlibet, & id bis aut ter die facere,
 prout vehemens malum est, necessarium
 10 est. Quod si puer est, cui id incidit, specil-
 lum lana involutum in medicamentum de-
 mittendum est, & super ulcus tenendum;
 ne per imprudentiam adurentia devoret.
 At, si dolor in gingivis est, moventurque
 15 aliqui dentes, refigere eos oportet. nam cura-
 tionem vehementer impediunt. Si nihil
 medicamenta proficient, ulcera erunt adu-
 renda. Quod tamen in labris ideo non est
 necessarium, quoniam excidere commo-
 20 dius est. Et id quidem, æque adustum, at-
 que excisum, sine ea curatione, quæ cor-
 pori manu adhibetur, impleri non potest.
 Gingivarum vero ossa, quæ hebetia sunt,
 in perpetuum ustione nudantur. neque
 25 enim postea caro increfcit. Imponenda ta-
 men adustis lenticula est, donec sanitatem,
 qualis esse potest, recipiant.

CAP. XVI.

30 De Parotidibus.

Hæc in capite fere medicamentis
 egent. Sub ipsis vero auribus oriri
 parotidis solent; modo in secunda

valetudine, ibi inflammatione orta; modo post longas febres, illuc impetu morbi converso. Id abscessus genus est. Itaque nullam novam curationem desiderat: a-5 nimadversionem tantummodo hanc habet necessariam, ut, si sine morbo id intumuit, primum reprimentibus experimentum fiat: si ex adversa valetudine, illud inimi- cum est, maturarique & quam primum 10 aperiri commodius est.

C A P. X V I I.

De Umbilico prominente.

AD umbilicos vero prominentes; ne 15 manu ferroque utendum sit, antequam tentandum est, ut abstineant, alvus his ducetur: imponatur super umbilicum id, quod ex his constat; cicutæ & fuliginis, singulorum P. I. *. cerussæ elotæ P. IV. *. 20 plumbi eloti P. VIII. *. ovis duobus; quibus etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius impositum esse oportet; & interim con- quiescere hominem; cibo modico uti, sic ut vitentur omnia infantia. 25

C A P. X V I I I.

De Obscænarum partium vitiis.

PR O X I M A sunt ea, quæ ad partes obscænas pertinent. quarum apud 30 Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta jam usu sunt; cum in omni fere medicorum volumine atque sermone jacten-

5 jactentur: apud nos fœdiora verba, ne con-
 suetudine quidem aliqua verecundius lo-
 quentium commendata sunt: ut difficilis
 hæc explanatio sit, simul & pudorem, &
 artis præcepta servantibus. Neque tamen
 ea res à scribendo detertere me debuit. Pri-
 mum, ut omnia, quæ salutaria accepi, com-
 prehenderem: dein, quia in vulgus eorum
 10 curatio etiam præcipue cognoscenda est,
 quæ invitissimus quisque alteri ostendit.

2. *De Colicæ morbis.*

Igitur si ex inflammatione coles intu-
 muit, reduciq; summa cutis, aut rursus
 15 induci non potest, multa calida aqua fo-
 vendus locus est. Ubi vero glans contexta
 est, oriculario quoque clystere inter eam
 cutemque aqua calida inferenda est si mol-
 lita sic & extenuata cutis reducenti pa-
 20 ruit, expeditior reliqua curatio est: si
 tumor vicit, imponenda est vel lenticula
 vel marrubium, vel oleæ folia ex vino co-
 cta, sic ut cuilibet eorum, dum teritur,
 mellis paululum adjiciatur: sursumque co-
 25 les ad ventrem deligandus est; quod in om-
 ni curatione ejus necessarium est: isque ho-
 mo continere se, & abstinere à cibo debet,
 & potione aquæ tantum à siti vindicari.
 Postero die rursus adhibendum iisdem ra-
 30 tionibus aquæ fomentum est, & tum vi-
 quoque experiundum, an cutis sequatur:
 Eaque, si non parebit, leviter summa scal-
 pello concidenda erit. nam, cum sanies

profluxerit, extenuabitur is locus, & facilius cutis ducetur.

Sive autem hoc modo victa erit, sive nunquam repugnaverit; ulcera vel in cutis, & ulteriore parte, vel in glande, ultrave eam in cole reperientur: quæ necesse est, ut pura siccaque sint, aut humida & purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fovenda sunt: deinde imponendum licium 10 ex vino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si tenuis iis humor inest, vino eluenda sunt; tum butyro rosæ & mellis paululum, & resinæ terebinthinæ pars quarta adjicienda est, coque 15 utendum. At, si pus ex iis profluit, ante omnia elui mulso calido debent: tum imponi piperis P. I. *. myrrhæ P. II. *. croci, misyos cocti, singulorum P. II. *. quæ ex vino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uvæ madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad idem; piperis P. I. *. myrrhæ P. I. *. croci P. II. *. misyos P. I. *. æris combusti P. II. * 25 quæ primum ex vino austero conteruntur; deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur, donec visci crassitudinem habeant. Ærugo quoque cum cocto melle, & ea, quæ ad oris ulcera 30 supra comprehensa sunt, curant. At Erasistrati compositio, aut Cratonis, recte super purulenta naturalia imponitur. Folia quoque

quoque oleæ ex novem cyathis coquuntur; his adjicitur aluminis scissilis p. iv. *. lycii p. vii. *. mellis sesquicyathus : ac, si plus puris est, id medicamentum ex melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est; post curationem, dum inflammatio manet, quale suprapositum est, cataplasma super dare, & quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paululum adjiciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem; aut etiam omphacium cum melle; aut id, quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis; aut anthera, sic, ut ei paululum mellis adjiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino curant.

Si vero ulcus latius atque altius serpit, eodem modo elui debet: imponi vero, aut ærugo aut omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut marrubii, myrrhæ, croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. *. minii sinopici p. ii. *. quæ per se singula primum teruntur, deinde juncta iterum, melle adjecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant; tum in æneo vase leniter coquuntur, ne superfluant; cum jam guttæ indur-

S 6

rescunt,

rescunt, vas ab igne removetur: idque medicamentum tum, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas utile est. 5

Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere; profluitque pituita multa, fannies tenuis malique odoris, non coacta, at aquæ similis, in qua caro recens lota est: doloresque is locus, & puuctiones habet. Id 10 genus quamvis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est; quale est emplastrum *πετραφάρμακον* ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paululum ei miscatur: aut id, quod ex butyro, rosa, re- 15 fina, melle fit; supra vero à me positum est. Præcipueque id ulcus multa calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori committendum.

Interdum autem per ipsa ulcera coles 20 sub cute exesus est sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscinditur, illam esse servandam, ne confidat, ulcerique ag- 25 glutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque urinæ intercludat.

Tubercula etiam, quæ *φύμαλα* Græci vocant, circa glandem oriuntur; quæ vel 30 medicamentis, vel ferro aduruntur; & cum crustæ exciderint, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

3. *De Cancro, qui in Cole nascitur.*

Hæc citra cancrum sunt; qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipue ulcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupavit, protinus specillum subjiciendum, eaque incidenda est; deinde oræ vulsellaprehendendæ, tum, quicquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque adurendum. Quoties quid ustum est, id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit: deinde, ubi crustæ exciderunt, ulcera sicut alia curentur.

- 15 At, si cancer ipsum colem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id, quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hic quoque scalpello, quicquid
20 corruptum est, sic, ut aliquid secum integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est; exciso cancro, vulnus esse adurendum. Sed si ex medicamentis, si ex ferro crustæ occalluerint, maximum periculum est, ne his decidentibus,
25 ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili pene corpore opus est, donec ex ipso crustæ maturæ leniter resolvantur. At si vel volens aliquis,
30 vel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ san-

sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet: neque ullo postea motu dandus eisdem periculo locus est.

4. De Phagedana in Cole nascente.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod *Pharyngitis* à Græcis nominatur, oriri solet. In quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est; & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, sed serpit, ac, si sustinuimus, usque ad vesicam tendit: neque succurri postea potest. Sed, si in summa glande circa fistulam urinæ est, prius in eam tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum: si vero alte penetravit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cætera eadem, quæ in aliis cancris, facienda sunt.

5. De Carbunculo, qui in cole nascitur.

Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque omni pene sensu caret. quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoque medicamentis utendus, maximeque chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricto & contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad oras ulceris componuntur.

6. De

6. De Testiculorum morbis.

In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum, quod est ex fabæ farina ex mulso cocta, & cum cumino contrito ex melle coacta; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupressu; aut lilii radix contrita. At, si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœni Græci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut similia ex vino contrita, cui paululum croci sit adjectum. Si vetustior jam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita.

Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent. Imponendum vero utrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea compositio, quæ habet niri cocti p. i. *. resinæ pineæ, cumini, singulorum p. i. i. *. uvæ taminæ sine seminibus p. iv. *. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculus aliquidem desit, fere quoque pus increfcit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso seroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

7. De

7. *De Ani morbis.**De Rhagadiis.*

Anus quoque multa tædii que plena mala recipit, nec à se multum abhorrentes curationes habet. Ac primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis scinditur; *παράδια* Græci vocant. Id si recens est, quiescere homo debet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, 10 &, ubi induruerunt, purganda: deinde alterum jacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic, ut invicem utroque aliquandiu utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhypodes rosa diluendum 15 est; aut œsypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa factò; aut eidem cerato liquido plumbum elotum adjiciendum; aut resinæ terebinthinæ myrrha; aut spumæ argenti vetus oleum; & quo- 20 libet ex his id perungendum. Si, quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, &, quicquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In 25 hoc autem casu, neque acris cibis utendum, neque asperis, nec alvum comprimantibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa, meliora 30 sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

8. *De Condylomate.*

Condyloma autem est tuberculum,
quod

quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet, eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus: tum recte imponitur & lenticula cum
 10 exigua mellis parte, sertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto; & cum eodem cerato contritum vel cotoneum malum, vel malicorii ex vino cocti pars interior: & chalcitis
 15 cocta atque contrita, deinde cæsypo ac rosa excepta; & ex ea compositione, quæ habet thuris p. i. *. aluminis scissilis p. ii. *. cerussæ p. iii. *. spumæ argenti p. v. *, quibus, dum teruntur, invicem rosa & vi-
 20 num instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab altera vero parte totidem fascias habet; cumque subjectus est, ansis ad ventrem datis, à po-
 5 2 steriore parte in eas adductæ fasciæ conjiciuntur, atque, ubi artatæ sunt, dexterior sinistra, sinisterior dextra procedit, circumdatæque circa alvum inter se novissime nodo deligantur. Sed, si vetus condy-
 30 loma jam induruit, neque sub his curationibus desit, aduri medicamento potest, quod ex his constat; æruginis p. ii. *. myrrhæ p. iv. *. gummi p. viii. *. thu-

ris p. xii. *. stibii, papaveris lachrymæ, acaciæ, singulorum p. xvi. *. Quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi, renovant. Si id nondum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

9. De Hemorrhoidibus.

10

Tertium autem ani vitium est, ora venarum tanquam capitulis quibusdam turgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt; *αιμορροϊδες* Græci vocant. Idque etiam in ore vulvæ fœminarum incidere consuevit. 15 Atque in quibusdam parum tuto suppressitur; qui sanguinis profluvio imbecilliores non sunt. habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati quidam, cum sanguis exitum non haberet, inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & gravissimis morbis correpti sunt. Si cui vero id nocet, is desidere in aqua ex verbenis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ foliis contritum; 25 aut ex his aliqua, quæ sanguinem suppressunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi intra alvus eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum est, & id fovendum ovis, imponendi vitelli cum rosæ foliis ex passio subactis: idque, si intus est, digito illinendum; si extra, superillitum panniculo imponendum est. Ea quoque medica-

30

medica-

medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis vero in hoc casu iisdem, quibus in prioribus, utendum est. Si ista parum juvant, solent imposita medicamenta adurentia ea capitula absumere. At, si jam vetustiora sunt, sub authore Dionysio inspergenda sandaracha est: deinde imponendum, quod ex his
10 constat; squamæ æris, auripigmenti, singulorum p. v. *. saxi calcis p. viii. *. postero die acu compungendum. Adustris capitulis fit cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet. Sed, quoties is suppressus est, ne
15 quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est: prætereaque & viris, & fœminis, quibus menstrua non proveniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

20 10. Si Anus, vel Os vulvæ procidit, quæ curatione utendum sit.

At, si anus ipse, vel os vulvæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet, purum ne id sit, quod provolutum
25 est, an humore mucoso circumdatum. Si purum est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis vel malicorio incocta. Si autem humidum, vino austero sublavandum est, illinendumque fece vini
30 combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est; imponendaque plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta; tum linteolum & lana, eaque super deli-

428 A. CORN. CELSI Lib. 6.
deliganda sunt, cruribus inter se devinctis.

11. *De Fungo ani aut vulvæ.*

Fungo quoque simile ulcus in eadem sede nasci solet. Id, si hiems est, egelida; si aliud tempus, frigida aqua fovendum est: deinde squama æris inspergenda, supraque ceratum ex myrteo factum, cui paululum squamæ, fuliginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, vel aliis medicamentis similibus, vel vehementioribus, ferro adurendum est.

C A P. X I X.

De Digitorum ulceribus.

15

DIGITORUM autem vetera ulcera commodissime curantur, aut lycio, aut amurca cocta, cum utrilibet vinum adjectum est. In iisdem recedere caruncula ab unguibus cum magno dolore consuevit; *πτερύγιον* Græci appellant. Oportet alumen Melium rotundum in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum, quantum ejus aridi fuit, tantundem mellis infundere, & rudicula miscere, donec similis croco color fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul malunt, cum paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerunt. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum: chalcitis, malicorium, squama

squama æris excipiuntur fico pingui leviter cocta & melle; aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non expecti par modus cerato miscetur ex myrteo facto; aut æruginis rasæ p. i. *. squamæ æris p. ii. *. mellis cyatho coguntur; aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus, & si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandum est scalpello, tenuibusque ferramentis adurendum, & sicut reliqua usta, curandum.

At, ubi scabri ungues sunt, circum aperiri debent, qua corpus contingunt: tum super eos ex hac compositione aliquid imponi; sandarachæ, sulphuris, singulorum p. ii. *. nitri, auripigmenti, singulorum p. iv. *. resinæ liquidæ p. vii. *. tertioque id die resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi ungues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur.

LIBER SEPTIMUS.

P R Æ F A T I O.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, 5
& qualis esse Chirurgus debeat, &
quid hoc in libro describatur.

Tertiam esse medicinæ partem, quæ manu curet, & vulgo notum, & à me 10
 propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat. estque ejus effectus inter omnes medicinæ partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum 15
 multum fortuna conferat, eademque sæpe salutaria, sæpe vana sint; potest dubitari, secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime nitimur, quamvis 20
 profectus evidentior est, tamen sanitatē & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe, manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest; qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea 25
 parte, quæ manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc autem pars, cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinæ Hip- 30
 pocrate, quam à prioribus exulta est. Deinde, posteaquam diducta ab aliis habere professores suos cœpit, in Ægypto quoque incre-

increvit. Philoxeno maxime authore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque
5 & Solstratus, & Herones & Apollonii duo, & Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quædam reppererunt. Ac Romæ quoque non mediocres professo-
10 & Euelpistus Phlegetis filius, &, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adjecerunt.

Esse autem chirurgus debet adolescens,
15 aut certe adolescentiæ propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, immisericors, sic, ut sa-
20 nari velit cum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, fecerit: sed perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur.

25 Potest autem requiri, quod huic parti proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum, Chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem
30 posse omnia ista præstare concipio: atque, ubi se deviserunt, cum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus,
non

non accipit ; & in quibus vulneribus ulceribusve plus profici manu , quam medicamento, credo : tum , quicquid ad ossa pertinet. Quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisque in aliud volumen ossibus , in hoc cætera explicabo : præpositisque his , quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent , transibo.

C A P. I.

10

De Vexatîs.

VEXATA igitur in quacunque parte corporis sint, quamprimum sic curari debent, ut, qua dolor est, ea scalpello 15 cutis crebro incidatur , detergeaturque eodem adverso profluens sanguis. quod si paulo tardius subvenitur, jamque etiam rubor est; qua rubet corpus: si tumor quoque accessit, quacunque is est, id idem optimum 20 auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt ; maximeque lana succida ex aceto & oleo. Quod si levior is casus est, possunt etiam, sine scalpello, imposita eadem mederi. Et, si nihil aliud est, cinis quoque ; ma- 25 xime ex sarmentis : si is non est , quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

C A P. I I.

De his, quæ per se intumescunt , quomodo incidenda, & curanda sint. 30

VERUM hoc quidem promptum est. In his autem negotium majus est, quæ per

per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant. Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamenta que his idonea executus sum: nunc superest, ut dicam, quæ in iis manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet; quod, quicquid illud malæ corruptæq; materiæ coit, extrahat: idque iterum, tertioq; recte fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas est, nihil à cucurbitula agere.

Interdum etiam fit, sed raro, ut quicquid abscedit, velamento suo includatur. id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed, subjecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo modo pertinet; quia quicquid, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet: neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari: tum, pure quoque maturiore, hæc interdum esse consuevit. Ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, si id incidit, siue jam durities est, in hac auxilii nihil est: sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora

T

conti-

contigerunt, nihil præterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem & inguinibus raro secandum est: item ubicunque mediocris abscessus est: item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est; nisi festinare curandi imbecillitas cogit. Satisque est cataplasmatibus efficere, ut per se pus aperiatur, nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. cujus hæc ratio est, quod exigua plaga diutius ad pus evocandum pateat, parvaque postea cicatrix sit. At, si nervi juxta sunt, ignis alienus est; ne distendantur & membrum debilitent: necessaria vero opera scalpelli est. Sed cætera etiam subcruda aperiri possunt; inter nervos ultima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet. eique pus jungat, quo propius reperiatur. Jamque alia rectam plagam desiderant, ut in carne: alia vero vehementer cutem extenuant, in quibus rota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admovetur, id agendum est, ut & quam minimæ & quam paucissimæ plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo, & in numero. Nam majores sinus, latius, interdum etiam duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat;

beat; ne quis humor intus subſiſcat, qui proxima & adhuc ſana rodendo ſinuet. Eſt etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda ſit. Nam, ubi poſt longos morbos totius corporis habitus vitiatuſ eſt, lateque ſe ſinus ſuffudit, & in eo jam cutis pallet; ſcire licet, eam jam emortuam eſſe, & inutilem futuram. Ideoque excidere commodius eſt: maxime, ſi circa articulos maiores id evenit, cubantemque ægrum fluens alvus exercuit, neque per alimenta quicquam corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad ſimilitudinem myrtei folii fiat, quo
15 facilius ſaneſcat. Idque perpetuum eſt; ubi-
cunque medicuſ & quacunque de cauſa cutem excidit. Pure effuſo, in aliſ vel inguinibus linamento opus non eſt; ſed ſpongia ex vino imponenda eſt. In cæteris partibuſ, ſi
20 æque ea linamenta ſupervacua ſunt, purgationiſ cauſa paulum mellis infundendum; dein glutinantia ſuperdanda: ſi illa neceſſaria ſunt, ſuper ea quoque ſimiliter dari ſpongia eodem modo ex vino expreſſa
25 debet. Quando autem linamentiſ opus ſit, quando non ſit, aliaſ dictum eſt. Cætera eadem, incifa ſuppuratione, faciendâ ſunt, quæ, ubi per medicamenta rupta eſt, faciendâ eſſe propoſui.

CAP. III.

De bonis, malisve signis Suppurationum.

PROTINUS autem, quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest; fereque iisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare; siti non 10 confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare: itemque habere pus album, læve, non fœdi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris; pus nigrum, aut seculentum, & fœdi 15 odoris: item procedente curatione eruptio sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, oræ callosæ fiunt, illa quoque ipsa carne hebetæ, nec firma. Deficere tamen animam, vel in ipsa curatione, vel postea, 20 pessimum omnium est. Quinetiam morbus ipse, si subito solutus est, dein suppuratio exorta est; si effuso pure permanet, non injuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium 25 non est. Sed ut hæc ipsa fortuna huc illucve discernit; sic medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor videbitur, vino & aqua pluviali 30 mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit, debet: si purgandum erit, mulso; rursusque imponere eadem. Ubi jam repres-
sus

sus videbitur humor, ulcusque purum erit,
 produci carnem conveniet, & foveri ulcus
 pari portione vini ac mellis, superque im-
 5 poni spongiam ex vino & rosa tinctam, per
 quæ caro producitur. Plus tamen, ut alias
 quoque dixi, victus ratio eo confert. Ea
 est, solutis jam febribus & cibi cupiditate
 reddita, balneum rarum; quotidiana, sed
 10 lenis gestatio; cibi potionesque corpori fa-
 ciendo aptæ. Quæ omnia, per medicamen-
 ta quoque suppuratione rupta, sequuntur.
 Sed, quia magno malo vix sine ferro mede-
 ri licet, in hunc locum reservata sunt.

15

C A P. I V.

De Fistulis.

A D V E R S U S fistulas quoque, si altius
 penetrant, ut ad ultimas demitti col-
 20 lyrium non possit, si tortuosæ sunt,
 si multiplices, majus in manu, quam in me-
 dicamentis præsidium est; minusque ope-
 ræ est, si sub cute transversæ feruntur, quam
 si recta intus tendunt. Igitur, si sub cute
 25 transversa fistula est, demitti specillum de-
 bet, supraque id ea incidi. Si flexus repe-
 riuntur, hi quoque simul specillo & ferro
 persequendi sunt. Idemque faciendum, si
 plures se quasi rivuli ostendunt. Ubi ad fi-
 30 nes fistulæ ventum est, excidendus ex ea
 totus callus est, superque fibulæ dandæ, &
 medicamentum, quo glutinetur. At, si re-
 cta subter tendit, ubi, quo maxime ferat,

T 3

specillo

specillo exploratum est, excidi is sinus debet: dein fibula oris cutis injicienda est, eique glutinantia medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptius ulcus est (quod interdum osse vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia.

2. *De Costarum fistulis.*

Solent autem inter costas fistulæ subterire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utra-¹⁰que parte præcidenda & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent quoque, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intel-¹⁵ligi potest & ex loco, & ex magnitudine doloris, & quia nonnunquam spiritus eò cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinæ locus nullus est. In cæteris²⁰ vero, quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt; cæteris, quæ ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta²⁵ imponuntur.

3. *De Ventris fistulis.*

Ventri nullum os subest; sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt: adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. Id non³⁰ ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri potest, tutior fistula est contra jecur, & lienem, & ventri-

ventriculum, quam contra intestina: non quo perniciosior ibi res sit, sed quo alteri periculo locum faciat. Cujus experimento
 5 moti quidam authores parum modum rei cognoverunt. Nam venter sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futuræ comprehendunt, quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perripit, excidere eam licet, futuraque oras conjungere. Si vero ea fistula
 10 intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi permagna vi
 15 sui non potest; utique ab interiore parte, qua quasi membrana quædam finit abdomen, quam *μεμβράνη* Græci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri cæpit, rumpitur illa futura, atque intestina sol-
 20 vuntur, quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

4. De Ani fistulis.

25 Propriam etiamnum animadversionem desiderant eæ, quæ in ano sunt. In has demisso specillo, ad ultimum ejus caput incidi cutis debet: dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam
 30 ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum sit. Ibi linum apprehendendum ligandumque cum altero capite est, ut laxe cutem, quæ super fistulam est, teneat. Id-

que linum debet esse crudum, & duplex
triplexve, sic tortum, ut unitas in eo facta
sit. Interim autem licet negocia agere,
ambulare, lavare, cibum capere, perinde
atque sanissimo. Tantummodo id linum
bis in die, soluto nodo, ducendum est sic,
ut subeat fistulam pars, quæ superior fuit.
Neque committendum est, ut id linum pu-
trescat: sed tertio quoque die nodus resol- 10
vendus est, & ad caput alterum recens li-
num alligandum, eductoque vetere, id in
fistula cum simili nodo relinquendum. Sic
enim id paulatim cutem, quæ supra fistu-
lam est, incidit: simulque & id sanescit, 15
quod à lino reflectum est; & id, quod ab eo
morderetur, inciditur. Hæc ratio curationis
longa, sed sine dolore est.

Qui festinant, adstringere cutem lino
debent, quo celerius secetur; noctuque ex 20
penicillo tenuia quædam intus demittere,
ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extendi-
tur. Sed hæc dolorem movent. Adjicitur
celeritati, sicut tormento quoque, si & li-
num, & id, quod ex penicillo est, aliquo 25
medicamento illinitur ex iis, quibus cal-
lum exedi proposui. Potest tamen fieri, ut
ad scalpelli curationem etiam illo loco ve-
niendum sit, si intus fistula fert, si multi-
plex est. Igitur in hæc genera demisso spe- 30
cillo, duabus lineis incidenda cutis est; ut
media inter eas habenula tenuis admodum
injiciatur, ne protinus oræ cocant; sitque
locus

locus aliquis linamentis, quæ quam paucissima superinjicienda sunt; omniaque eodem modo facienda, quæ in abscessibus posita sunt. Si vero ab uno ore plures sinus erunt, recta fistula scalpello erit incidenda ab eo; cæteræ, quæ jam patebunt, lino excipiendæ. Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto pervenire non poterit, collyrium rodemittendum erit.

Cibus autem in omnibus ejusmodi casibus, si ve manu, si ve medicamentis agatur, dari debet humidus; potio liberalis, diuque aqua. ubi jam caro increfcit, tum de-
r 5 mum & balneis raris utendum erit, & cibus corpus implentibus.

C A P. V.

De Telis è corpore extrahendis.

20 **T**EL A quoque, quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe ejiciuntur. Sunt enim quædam difficultates ex generibus eorum; quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt.
25 Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit. illic viam, qua redeat, ipsum sibi fecit; hic, à scalpello accipit. nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum
30 infedit, & in summa carne est, aut certe magnas venas & loca nervosa non transiit; nihil melius est, quam, qua venit, id revellexe. Si vero plus est, per quod telo rever-
T 5 tendum.

tendum, quam quod perumpendum est; jamque venas nervosque id transiit, commodius est aperire quod superest, eaque extrahere. nam & propius petitur, & tutius evellitur. Et in majore membro, si medium mucro transiit, facilius sanescit, quod pervium est; quia utrinque medicamento fovetur. Sed, si retro telum recipiendum, amplianda plaga est; quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quæ major fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte ampliatur. In summa autem utraque parte ista habenda cura. est, ne nervus, ne vena major, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumque à scalpello. Ubi autem incisum est satis, telum eximendum est: tunc quoque eodem modo, & eadem cura habita, ne sub eo, quod eximitur, aliquid eorum lædatur, quæ tuenda esse proposui.

2. *De Sagittis recipiendis.*

Hæc communia sunt: præter quæ propria quædam in singulis telorum generibus sunt, quæ protinus subjiciam. Nihil tam facile in corpus, quam sagitta, conditur, eademque altissime insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa angusta est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est;

est; præcipueque, quia fere spiculis cingitur; quæ magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde, aperta via, caro diduci debet ferramento factò ad similitudinem Græcæ literæ γ : deinde, ubi apparuit mucro, si ei arundo inhæret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit. Si jam illa decidit, solum-
 10 que intus ferrum est; mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. nam, ampliato magis vulnere, aut
 15 arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea majora valentioraque
 20 sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid dilacerent, sic evellenda sunt. & in sagittis quidem hæc observatio est.

3. *De Latis telis educendis.*

Latum vero telum, si aliquis intus in
 25 carne habuerit, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo quodam genere ferramenti, quod
 Διοκλῆς γροφίον Græci vocant; quoniam
 30 niam authorem Dioclem habet: quem inter priscos maximosque medicos fuisse, jam posui. Lamina est ferrea, vel ænea etiam, ab altero capite duos utrinque deorsum

conversos uncus habens; ab altero duplicata lateribus, leviterque extrema eam in partem inclinata, quæ sinuata est; insuper etiam ea parte inclinata, quæ perforata est. 5
Hæc juxta telum transversa demittitur: deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paululum torquetur, ut telum foramine suo excipiat: cum in cavo mucro est, illico duo digiti, subjecti partis alterius uncis, si- 10 mul ferramentum id extrahunt, & telum.

4. *De alio telorum genere.*

Tertium genus telorum, quod interdum evelli debet, est plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta 15 cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque, quod inest, ea, qua venit, forcipe extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhæsit, vel in 20 articulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; & tunc vel manu vel forcipe telum extrahendum est. Et vix unquam ita telum non sequitur. 25 sed, si morabitur, excuti quoque cum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi non evellitur, terebra juxta forare, & ab eo foramine, ad speciem literæ, contra telum os excidere sic, ut lineæ, quæ didu- 30 euntur, ad telum spectent: eo facto, id necesse est labet, & facile auferatur.

Inter duo vero ossa si per ipsum articu-
lum

lum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, & per has in diversas partes diducenda sunt, ut nervos
 5 distendant: quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum id extrahitur:
 10 eadem scilicet ratione, quæ supra posita est.

5. *De Venenato telo evellendo.*

At, si venenato quoque telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adjicienda curatio est,
 15 quæ vel epoto veneno, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non alia est, quam quæ esset, si corpore icto nihil inhæsisset, de qua satis alio loco dictum est.

20

C A P. V I.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate, capitis tuberculis.

25 **H**ÆC evenire in qualibet parte corporis possunt: reliqua, certas sedes habent, de quibus dicam, prorsus à capite. In hoc multa variaque tubercula oriuntur; γάγγλια, μελικηρίδας, & ἀθή-
 30 ρα nominant; aliisque etiamnum vocabulis quædam, alii discernunt; quibus ego πατόματα quoque adjiciam, quæ quamvis & in cervice, & in alis, & in lateribus ori-
 xi so-

ri solent; per se tamen non posui; cum ista omnia mediocres differentias habeant, ac neque periculo terreant, neque diverso genere curentur. Omnia autem ista & ex parvulo incipiunt, & diu paulatimque increscunt, & tunica sua includuntur. Quædam ex his dura ac renitentia, quædam molliaccedentiaque sunt: quædam spatio nudantur, quædam tecta capillo suo permanent, fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant, ut conjectura prælagiri potest; sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta sunt, non potest. Maxime tamen in his, quæ renituntur, aut lapillis quædam similia, aut concreti confertique pili reperiuntur. In his vero, quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui puliculæ, aut quasi rasæ cartilagini, aut carni hebeti & cruentæ, quibus alii alii que colores esse consueverunt. Fereque ganglia renituntur: atheromati subest quasi tenuis pulicula: meliceridi liquidior humor; ideoque pressu circumfluit: steatomati pingue quiddam, idque latissime patere consuevit, resolvitque totam eutem superpositam sic, ut ea labet; cum in cæteris sit adstrictior. Omnia, derafa ante, si capillis conteguntur, per medium oportet incidere, ut effundatur, quicquid intus coit. Sed steatomatis tunicæ quoque secanda est: quia non facile à cute & subjecta carne ea separatur. At in cæteris ipsa tunica inviolata servanda est.

Proti-

Protinus autem, cum ista alba & intenta se ostendit, tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & carne est, ejiciendaque cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhærit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaque
10 his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus moventia adhibenda sunt.

C A P. V I I.

15

*De Oculorum vitiis, quæ scalpello
& manu curantur.*

SED ut hæc neque genere vitii, neque ratione curationis inter se multum distant: sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ nasci solent, pingues gravesque; quæ vix attollere oculos sinunt, le-
20 vesque pituitæ cursus, sed assiduos, in oculis movent. Fere vero in pueris nascuntur. Oportet, compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello transversa linea incidere, suspensa leviter manu, ne
25 vesica ipsa vulneretur, & ut, loco ei patefacto, ipsa prorumpat; tum digitis eam apprehendere, & evellere. facile enim sequitur. Dein superinungi collyrio debet ex
30 iis

iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur: quo paucissimis diebus cicaticula inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica est. effundit enim humorem; neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri movendo sunt.

2. *De Criche.*

In eadem palpebra super pilorum locum 10 tuberculum parvulum nascitur, quod à similitudine hordei, à Græcis *χρῆς* nominatur. Tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foveri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed facile à parte sustineatur. hac enim ratione sæpe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi: eodem deinde vapore postea quoque foveri, & superinungi, donec ad sanitatem perveniat. 20

3. *De Chalazio.*

Alia quoque quædam in palpebris huic 25 non dissimilia nascuntur; sed neque utique figuræ ejusdem, & mobilia, simulatque digito huc vel illuc impelluntur. Quæ, quia grandini similia sunt, *χαλάζια* Græci vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, 30 ab exteriori parte; si sub cartilagine, ab interiori: dein scalpelli manubriolo deducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus
plaga

plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus: si extra, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

5 *5. De Ungue oculorum.*

Unguis vero, quod ὤφθαλμος Græci vocant, est membranula nervosa, quæ oriens ab angulo, nonnunquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. Sapius à natorum, interdum etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inveteravit, jamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam vero unius diei, vel adversus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic aversus, ut in gremium ejus caput resupinus effundat. Quidam, si in sinistro oculo vitium est, adversum: si in dextro, resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc, si ille adversus est, inferiorem; si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum, paulum mucrone intus recurvato, subjicere extremo ungui debet, eumque infigere; atque eam quoque palpebram tradere alteri: ipse, hamulo apprehenso, levare unguem, eumque acu trajicere linum trahente: deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue, si qua parte oculos inhæret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum

gulum veniat: deinde invicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium ejus, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est; ne vel ex ungue aliquid relinquantur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex angulo quoque caruncula abscindatur, quæ, si vehementius unguis ducitur, sequitur quoque ac decipit. Si abscissa est, patet foramen, per quod 10 postea semper humor descendit; ~~puada~~ Græci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda membranula, ne quid ex angulo lædatur. Ei deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia aut lana succida: proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter 20 se palpebræ glutinentur (siquidem id quoque tertium periculum accedit) eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur. 25

Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemem. De qua re, ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt: alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est 30 eo, quod incidit; sicut in vulneribus, & fistulis, alia, in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum & facile est; sicut evenit

evenit in iis , quæ & tarde increscunt , & dolore non cruciant. In his ver expectandum est: aut, si quid magis preffit , melior
5 tamen autumnus quam hiems vel æstas est ; atque is ipse medius , jam fractis æstibus, & nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit , quæ tractabitur , hoc quoque majori periculo subje-
10 cta est. & sæpe , quo major plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio servabitur.

5. *De Entanthide.*

Ex curatione vero unguis , ut dixi , vitia nascuntur , quæ ipsa aliis quoque de causis
15 oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso , vel aliter , tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: *ιγχορδὶς* Græce nominatur. Excipi hamulo , & circumcidi debet : hic quoque diligenter temperata manu , ne quid ex ipso angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento sutorio ; inque eum angulum, diductis palpebris, inferendum, supraque
20 eodem modo deligandum: proximisque diebus similiter nutriendum , ut primo, tantum aqua egelida , vel etiam frigida foveatur.

6. *De Ancyloblepharo.*

30 Interdum inter se palpebræ coalescunt, aperiri que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere , ut palpebræ cum albo oculi cohærescant; scilicet, cum
in

in utrovis fuit ulcus negligenter curatum. sanescendo enim, quod diduci potuit & debuit, glutinabitur; ἀσχυλοβλήφαρον sub utroque vitium Græci vocant. Palpebræ tantum inter se cohærentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra. nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet; quia bene res sæpius cedit. Igitur adversum specillum inferendum, diducendæque eo palpebræ sunt: deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio ejus loci finiatur. At, ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit, Heraclides Tarentinus author est, adverso scalpello subsecare; magna cum moderatione, ut neque ex oculo, neque ex palpebra quicquam abscindatur; ac, si necesse est, ex palpebra potius. Post hæc, inungatur oculus medicamentis, quibus asperitudo curatur: quotidieque palpebra vertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur; sed etiam ne inhæreat: ipsique etiam ægro præcipiatur, ut sæpe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse, neque unquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæserit, memoriæ prodidit.

7. De Agilope.

Etiamnum in angulo, qui naribus prior est, ex aliquo vitio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita assidue destillet: αἰγίλωσα Græci vocant. Idque assidue

due male habet oculum: nonnunquam etiam, exeso osse, usque ad nares penetrat. Idque interdum naturam carcinomatis habet: ubi intentæ venæ & recurvatæ sunt, color pallet, cutis dura est, & levi tactu irritatur, inflammationemque in eas partes, quæ conjunctæ sunt, evocat. Ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoque ea res maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum. neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse difficilem quanto autem angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit: recenti tamen re mederi facilius est. Hamulo autem summum ejus foraminis excipiendum; deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum; oculoque & cæteris junctis partibus bene obrectis, os ferramento adurendum est vehementius. quod si jam carie vexatum est, quo crassior huic squama abscedat, quidam adurentia imponunt; ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. quod & tardius & non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur eadem, quæ in cæteris uestis.

8. *De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.*

Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam
modo

modo palpebræ summa cutis relaxatur, & procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remittit: modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes vero hæ sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem spathæ lata, in ignem conjicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transvehat: deinde iterum, tertioque ad alterum angulum. quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat: atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id genus sanescit. Quidam ajunt, acu transsui juxta pilos exteriorē partem palpebrę oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse injiciendū, & per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpori adglutinandum, & imponendum medicamentū, quo foramen glutinetur, sic enim fore, ut is pilus in exteriorē partem postea spectet. Id primum fieri non potest, nisi in pilo longiore; cum fere breves eo
loci

loci nascantur. Deinde, si plures pili sunt, necesse est longum tormentum sit, & toties acus transiens magnam inflammationem moveat. Novissime, cum humor aliquis ibi subsit, oculo & ante per pilos & tum per palpebræ foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi
10 abductus est, redeat. Ea vero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubii. Siquidem oportet confecto oculo mediam palpebræ cutem, siue ea superior, siue inferior est, apprehen-
15 dere digitis, ac levare. tum considerare, quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit; si pa-
20 rum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. Quod deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut inter oram, quæ pilos continet, & propiorem ei lineam, aliquid
25 relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus est: & si superior palpebra est, ante; si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum: initiumque faciendum in sini-
30 stro oculo, ab eo angulo, qui temporis; in dextro, ab eo, qui naribus propior est: idque, quod inter duas lineas est, excidendum. deinde oræ vulneris inter se simplici
futura

sutura committendæ, operiendusque oculus est: &, si parum palpebra descendet, laxanda utique, si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ultere⁵ riore ora excidenda. Ubi secta est, aliæ suturæ adjiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc, in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent.¹⁰ Idque, si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia, ex aqua frigida expressa, super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum injiciendum. Quarto su-¹⁵ tura tollenda est, & collyrio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

9. De Lagophthalamo.

Nonnunquam autem, nimium sub hac curatione excisa cute, evenit, ut oculus²⁰ non contegatur. Idque interdum etiam alia de causa fit. *λαγώφθαλμοι* Græci appellant. In quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest: si exiguum, mederi licet. Paulum infra superci-²⁵ cilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus ejus deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ usque ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil læsa. nam, si ea incisa est, palpebra concidit, neque attolli postea po-³⁰ test. Cute igitur tantum diducta sit, ut paululum in ima oculi ora descendat; hiantes scilicet super plaga, in quam linamentum inji-

injiciendum est, quod & conjungi diductam cutem prohibeat, & in medio carunculam creet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

10. *De Ectropio*

Ut superioris autem palpebræ vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit: sic inferioris, quo parum
10 sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute. *εκτροπίον* Græci vocant. Si ex mala curatione
15 est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde
20 de melle inungendum à quarto die, vapore aquæ calidæ fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducen-
tibus.

11. *De Staphylomate.*

25 Hæc fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, sive ruptis intus membranis aliquibus, sive laxatis; & similis figura acino
30 sit. unde id *σταφύλωμα* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera, ad ipsas radices per medium transfluere acu, duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore
V parte,

parte, alterius ex inferiore adstringere inter se, quæ paulatim secando id excident. Altera, in summa parte ejus ad lenticulæ magnitudinem excidere; deinde spodium aut cadmiam infricare. Utrolibet autem facto, album ovi lana excipiendum & imponendum; posteaque vapore aquæ calidæ fovendus oculus, & lenibus medicamentis iungendus est. 10

12. *De Clavis oculorum.*

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula; quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acui commodissimum est, infra- 15 que eam excidere, deinde lenibus medicamentis iungere.

13. *De Oculorum natura.*

Suffusionis jam alias feci mentionem; quia cum recens incidit, medicamentis 20 quoque sæpe discutitur: sed, ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat. quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cujus cognitio, cum ad plu- 25 ra loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à Græcis *μεγαλοδὴς* vocatur; eaque, qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. 30 Huic interior adjuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque

que plenior. quæ *χοριοειδής* à Græcis nominatur. Hæ duæ tunicæ, cum interiora oculi cingant, rursus sub his cœunt; extenuatæque & in unum coactæ per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhærescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus *εραχοειδής* nominavit. Eâ media subsidit; eoque cavo continet quiddam, quod, à vitri similitudine, *υαλοειδής* Græci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est; sed quasi concretus humor. Ex cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæsius, cum summa tota tunica alba sit. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit. Sub his gutta humoris est, ovi albo similis: à qua videndi facultas proficiscitur. *κρυσταλλοειδής* à Græcis nominatur.

14. De Suffusione.

Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concre-
scit humor sub duabus tunicis, qua locum
vacuum esse proposui; isque paulatim in-
durefcens, interiori potentia se opponit.
Vitii ejus plures species sunt, quædam sanabiles, quædam quæ curationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si im-
mobilis, colorem vero habet: marinæ aquæ, vel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si magna est, si nigra pars oculi, amissa natu-

rali figura , in aliam se vertit , si suffusioni color cœruleus est , aut auro similis , si labat , & hac atque illac movetur , vix unquam succurritur. Fere vero peior est, quos ex graviore morbo , majoribusve capitis doloribus , vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea curationi senilis ætas est; quæ sine novo vitio , tamen aciem habentem habet : ac ne puerilis quidem ; sed inter has media ætas. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque concavus, satis opportunus est. Atque ipsius quoque suffusionis quædam maturitas est. Expectandum igitur est , donec jam non fluere , sed induritie quadam concrevisse videatur.

Ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet; pridie , ab omnibus abstinere. Post hæc in adverso sedili collocandus est loco lucido , lumine adverso, sic ut contra medicus paulo altius sedeat; à posteriore autem parte caput ejus, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet : nam levi motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus , qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. Curari vero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admovenda est, aut acuta , aut certe non nimium tenuis , eaque demittenda, sed recta, est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi & angulum temporis

pori propiorem, è regione mediæ suffusionis sic, ne qua vena lædatur. Neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest; quia prementi nihil renititur. Ubi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leniterque ibi verti & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet; ubi deinde eam transiit, vehementius imprimi, ut inferiori parti insadat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadem acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late efficiunt. Post hæc educenda acus recta est, imponendumque est lana molli exceptum ovi album, & supra, quod inflammationem coerceat, atque ita devinciendum.

Post hæc opus est quiete, abstinence, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo (qui postero die satis mature datur) primum liquido, ne maxillæ laborent; deinde, inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus. Quibus, ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. De Pituita oculorum.

De pituitæ quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, jam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animadvertimus autem quibusdam

nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere: quæ res aspritudinem continuat, & ex levibus momentis inflammationes & lippitudines excitat; totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adjuvari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen nosse oportet, ut alteris succurratur, alteris manus non injiciatur. 10

Ac primum supervacua curatio est in his, qui ab infantibus id vitium habent; quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non necessaria etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est: 15 siquidem manu nihil adjuvantur; medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorem pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt. Lata etiam capita vix medicinæ patent. Tum interest, pituitam emittant venæ, 20 quæ inter calvariam & cutem sunt, an quæ inter membranam cerebri & calvariam: superiores enim per tempora oculos rigant; inferiores, per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest au- 25 tem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt; non potest his, quæ ab osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia levata altera parte, nihilominus altera infestat. 30

Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à superciliis usque

usque ad verticem illini debent : si sicci oculi esse cœperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari : si nihilominus
 5 madent, manifestum est sub osse descendere: si est tumor, sed levior duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Id-
 10 que non in Græcia tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est: adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quasque exposita sit.

Reperti in Græcia sunt, qui novem li-
 15 neis cutem capitis inciderent: duabus in occipitio rectis, una super eas transversa: dein duabus super aures, una inter eas item transversa: tribus denique inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à ver-
 20 tice rectæ eas lineas ad tempora deduce- rent; cognitisque, ex motu maxillarum, muscutorum initiis, leviter super eos cutem inciderent, diductisque per retusos hamos oris, infererent linamenta sic, ut
 25 neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro cresceret, quæ venas, ex quibus ad oculos transiret, adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à media aure ad mediam
 30 alteram aurem; deinde à naribus ad verticem: tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt; & post sanguinem effusum, os ibidem adusserunt. Nihilominus

autem & in temporibus, & inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt.

Frequens curatio est, venas in temporibus adurere quæ fere quidem in ejusmodi malo tument: sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est. Tenuibus autem ferramentis, & retusis venæ adurendæ; donec in oculos 10 pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excæcatorum itinerum, per quæ humor ferebatur.

Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæque venæ sunt, ideoque legi 15 non possunt, eodem modo cervice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora, & inter verticem ac frontem: deinde cervice resoluta, qua notæ 20 sunt, venas incidere, & sanguinem mittere: ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide; ne subjecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem, ve- 25 hementer sic, ut squama ab osse recedat.

Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Co- 30 mata sit, ubi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quo modo curanda sunt, jam explicui. Nunc illud

lud adjicio; neque ut crustæ decidant, neque ut ulcus impleatur, adustis venis, esse properandum; ne vel sanguis erumpat, vel
 5 cito pus supprimatur: cum per hoc siccescere eas partes opus sit; per illud exhauriri opus non sit. Si quando tamen sanguis eruperit, infrianda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ut ne adurant.
 10 Quemadmodum autem venæ deligendæ sint, quidque lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices, dicam.

C A P. V I I I.

15 *De Aurium morbis, qui manu & scalpello curantur.*

VERUM ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quæ in
 20 hac medicinæ parte tractentur. Solet tamen evenire vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoque audiendi usu careat.
 25 Quod ubi incidit, specillo tentandum est, altene id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. Nam si alte est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet; ne sine
 30 effectus spe oriatur distentio nervorum, & ex ea mortis periculum sit: hoc facile curatur. Nam qua cavum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex

adurentibus, vel candente ferro aperendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & jam ulcus purum est, injicienda eo pinna est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque id, medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit, ut ea remota, postea facultas audiendi sit.

At ubi aures perforatæ sunt, & offendunt, trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leniter ejus oræ exulcerentur, aut etiam adurentem medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget; tum quod eum locum repleat, & cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in his, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere, quod super est, ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoque & naribus fieri possit, eandem autem curationem habeat, simul explicanda est.

C A P. I X.

Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri & curari possint.

30

CURTA igitur his tribus, ac si qua parte parva sunt, curari possunt: si qua majora sunt, aut non accipient curationem

curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit; quia minus facile & cibus assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus; sed ex vicino adducitur. quod etsi in levi mutilatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest; in magna, non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est; quia nusquam aut celeritus cancer occupat, aut difficiliter tollitur.

Ratio curationis ejusmodi est: id quod curtatum est, in quadratum redigere; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quæ citiorem partem ab ulteriore ex toto diducant; deinde ea, quæ sic resolvimus, in unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, quas antefecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur: sic enim fit, ut facilius quod adducitur, sequi possit. quod non vi cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & dimissum non multum recedat.

Interdum tamen ab altera parte cutis haud omnino adducta deformem, quem

reliquit locum, reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imisve narium partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Utrunque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis aut mediis naribus, aut mediis labris decrit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis curta- 10
ta esse consuerunt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est: neque enim aut glutinatur, aut acuto tuto trajicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas 15
oras liberæ cutis utrinque coitus puris fieri possit. Tum junctæ oræ inter se suendæ sunt, utrinque cute apprehensa; & quæ prioris lineæ sunt, ea quoque futuræ injiciendæ sunt. Siccis locis, uti naribus illi- 20
ta spuma argenti, satis proficit. In interiores vero, lunatasque plagas, linamentum dandum est; ut caro increescens vulnus impleat. Summaque cura, quod ita sutum est, suendum esse, apparere ex eo potest, quod 25
de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquæ calidæ: rursusque idem medicamentum injiciendum. quo fere septimo die glutinatum est. Tum futuræ eximi, & ulcus ad 30
sanitatem perducere debet.

CAP. X.

De Polypo.

5 **P**OLYPUM vero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari jam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto, in modum spathæ facto, resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia, ne in-
 10 fra cartilago lædatur; in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis
 15 supprimitur, eoque nares leniter implendæ. Sanguine suppresso, linamento ulcus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto
 20 id sanescat.

CAP. XI.

De Ozena.

25 **I**D autem vitium, quod ὀζῆνα à Græcis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit;
 30 cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel subtilem fistulam, vel enodem scriptorium, calamum in nares esse conjiciendum.

dum, donec sursum ad os perveniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse æruginē & melle: 5
ubi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admove-
ri. Tum sui narem debere; & adustum qui- 10
dem ulcus eadem ratione curari: futuram vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

C A P. XII.

15

*De Oris vitiis, quæ manu &
ferro curantur.*

1. *De Dentibus.*

IN ore quoque quædam manu curantur. Ubi in primis dentes nonnunquam mo- 20
ventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum marcescentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admove-
re, ut leviter attingat, non ut insadat. Adusta 25
gingivæ melle illinendæ, & mulso cluendæ sunt. Ut pura ulcera esse cœperunt, arida medicamenta infrianda sunt ex his, quæ reprimunt.

Si vero dens dolores movet, eximique 30
eum, quia medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo resolvatur; tum is concutiendus est.

Eadem-

Eademque facienda, donec bene moveatur, nam dens hærens cum summo periculo evellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur. Idque etiam majore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosve concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forcipe dens excipiendus est.

- 10 At si exesus est ante, id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forcipe confringatur. Recta vero forceps ducendus est, ne inflexis radicibus os raram, cui dens inhæret, 15 parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent: sæpe enim forceps, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra 20 comprehendat, os gingivæ prehendit & frangit.

- Protinus autem, ubi plus sanguinis profuit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, 25 quæ recessit, & vulsella protrahenda est: si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossi testa recipiatur. Quod si fractum statim non est, sed intumescit extrinsecus maxilla, ut os hiare non possit, foris 30 imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam

etiam tum id extrahi convenit. Nonnunquam etiam, eo læso, fissura fit. quæ eradi debet.

Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrhæ sit adjecta: continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, fri-
catione capitis, cibo non acri utendum est. 10

At, si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quod galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris ante dens nascitur, quam prior excidat, is, qui cadere debuit, circumradendus & evellendus est; is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad justam magnitudinem perveniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facto forcipe, quam
πίζαγγα Græci vocant, eximenda est. 25

2. De Tonsillis induratis.

Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, *ἀρνάδες* autem à Græcis appellantur, cum sub levi tunica sint, oportet digito circumradere & evellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinire vulnus medicamento, quo sanguis supprimitur. 30

3. De

3. *De Uva.*

Uva, si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest: solet enim multum sanguinem effundere, itaque melius est iis uti, quæ alias proposita sunt. Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum à
10 pituita deducta est, & tenuis, acuta, alba est, præcidi debet. itemque, si ima, livida & crassa; summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quam vulsella apprehendere, sub eaque, quod volumus, ex-
15 cidere. Neque enim ullum periculum est, ne plus minusve præcidatur: cum liceat tantum infra vulsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est; idque præcidere, quo longior uva est, quam esse
20 naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

4. *De Lingua.*

Lingua vero quibusdam cum subjecta
25 parte à primo natali die juncta est; qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsella apprehendenda est, sub eaque membrana incidenda: magna cura habita, ne venæ, quæ juxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceant.
30 Reliqua curatio vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognovi, qui, succisa

fuccisa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicinâ, etiam, ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod consequi convenit.

5. *De Abscessu sub lingua.*

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit; quod fere consistit in tunica, doloresque magnos movet. Quod, si exiguum est, incidi semel satis est: si majus, summa cutis usque ad tunicam excidenda est; deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica, undique circumdata, liberanda est; 15 magna diligentia per hanc curationem habita, ne qua major vena incidatur.

6. *De Labris.*

Labra autem sæpe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, 20 quod sermo prohibetur; qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quæ ad ulcera oris fiunt: si vero altius descenderunt, 25 necessarium est tenui ferramento adurere. quod spatheæ simile, quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt, quæ in naribus adustis exposita sunt.

30.

CAP. XIII.

De Cervicis vitio.

5 **A**T in cervice, inter cutem & asperam
arteriam, tumor increfcit (βερίχονή-
λιν Græci vocant) quo, modo caro
hebes, modo humor aliquis, melli aquæ-
ve fimilis, includitur; interdum etiam mi-
10 nutis offibus pili immifti. Ex quibus quic-
quid eft, quod tunica continetur, poteft
adurentibus medicamentis curari. Quibus
fumma cutis cum fubjecta tunica exurit.
quo facto, five humor eft, profluit; five
15 quid denfius, digitis educitur: tum ulcus
fub linamentis fanefcit. Sed fcalpelli cura-
tio brevior eft. Medio tumor una linea
inciditur ufque ad tunicam: deinde vitio-
fus finus ab integro corpore digito fepara-
20 tur, totufque cum velamento fuo eximi-
tur: tum aceto, cui vel falem vel nitrum
aliquis adjecit, eluitur; oræque una futura
junguntur; cæteraque eadem, quæ in aliis
futuris, fuperinjiciuntur: leniter deinde, ne
25 fauces urgeat, deligatur. Si quando autem
tunica eximi non potuerit, intus inſper-
genda adurentia, linamentifque id curan-
dum, & cæteris püs moventibus.

CAP. XIV.

De Umbilici vitiis.

30 **S**UNT etiam circa umbilicum plura vi-
tia; de quibus, propter raritatem, inter
autho-

authores parum constat. Verisimile est autem, id à quoque prætermis-
 sum, quod ipse non cognoverat: à nullo id, quod non
 viderat, fictum. Commune omnibus est, &
 umbilicum indecore prominere. Causæ re-
 quiruntur? Meges tres has posuit: modo in-
 testinum eo irrumperè, modo omentum,
 modo humorem. Sostratus nihil de omen-
 to dixit. Duobus iisdem adjecit, carnem ibi 10
 interdum increfcere; eamque modo inte-
 gram esse, modo carcinomati similem.
 Gorgias ipse quoque omenti mentionem
 omisit: sed eadem tria causatus, spiritum
 quoque interdum eo dixit irrumperè. He- 15
 ron omnibus his quatuor positis, & omenti
 mentionem habuit, & ejus, quod simul &
 omentum & intestinum habuerit.

Quod autem horum sit, his indiciis co-
 gnoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, 20
 tumor neque durus, neque mollis est: om-
 ni frigore minuitur; non solum sub omni
 calore, sed etiam retento spiritu crescit:
 sonat interdum; atque, ubi resupinatus est
 aliquis, relapso intestino, ipse desidit. Ubi 25
 vero omentum est, cætera similia sunt, tu-
 mor mollior, & ab ima parte extenuatus
 in verticem est; si quis apprehendit, elabi-
 tur. Ubi utrumque est, indicia quoque mix-
 ta sunt, & inter utrumque mollities. At 30
 caro durior est, semperque etiam resupi-
 nato corpore tumet, prementique non ce-
 dit, prioribus facile cedentibus. Si vitio-
 sa est,

sa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premittitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, 5 sed protinus redit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.

Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur, itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamantis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variæ sententiæ 10 sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, relabatur. Sinus vero umbilici, tum vacuus, à quibusdam duabus regulis excipitur; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: à quibusdam ad imam acu trajectatur, duo lina ducente; deinde utriusque lini duobus capitibus diversæ partes adstringuntur (quod in uva quoque oculi fit:) 20 nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adjecerunt quidam, ut, antequam vincirent, summum una linea inciderent; quo facilius digito demisso, quod illuc irupisset, depellerent: tum deinde vincirent. 30 Sed abunde est, jubere spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim ejus atramento notare; resupinatoque homine, digitis tumorem

morem eum premere, ut, si quid relapsum non est, manu cogatur: post hæc, umbilicum adtrahere, &, qua nota atramenti est, lino vehementer adstringere: deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur: atque, ut cætera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam, ubi humor est, 10 optime proficit.

Sed ante quædam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed à septimo fere anno ad 15 quartum decimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque tumoribus facile subveni- 20 tur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hibernum vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima ætas non aliena est. Præter hæc, abstinere 25 pridie debet. Neque id satis est: sed alvus quoque ei ducenda est; quo facilius omnia quæ excesserunt, intra uterum confidant.

C A P. X V.

30

Quomodo Aqua hydropicis emittatur.

AQUAM his, qui hydropici sunt, emitti oportere, alias dixi. nunc, quem-

quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico, fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte; quidam, ipso umbilico perforato, id facere consueverunt: quidam, cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso; quia, quod per ignem divisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut fere tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat: demittendumque ita est, ut membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur: eo tum plumbea aut ænea fistula injicienda est, vel recurvatis in exteriorem partem labris, vel eadem circumcingente quadam remora; ne tota intus delabi possit. Hujus ea pars, quæ intra, paulo longior esse debet, quam quæ extra; ut ultra interiorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est: atque ubi major pars ejus evocata est, claudenda demisso linteolo fistula est; & in vulnere, si id ustum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ vestigium appareat. Quidam tamen etiam non ulla cute, protinus fistulam recipiunt, & super vulnus spongiam expressam ex aqua frigida, vel ex aceto deligant: deinde postero die rursus fistulam demittunt (quod recens vulnus paululum diductum patitur) ut, si quid humoris superest,

480 A. CORN. CELSI Lib. 7.
pereſt, emittatur : idque bis ita feciſſe con-
tenti ſunt.

C A P. X V I.

*De Ventre, iſtu perforato, &
Inteſtiniſ vulneratiſ.*

N O N N U N Q U A M autem venter i-
ctu aliquo perforatur ; ſequiturque,
ut inteſtina evolvantur. Quod ubi ¹⁰
incidit, protinus conſiderandum eſt, an in-
tegra ea ſint; deinde, an hiſ color ſuiſ ma-
neat. Si tenuiſ inteſtinum perforatum
eſt, nihil profici poſſe, jam retuli. Latius
inteſtinum ſui poteſt : non quod certa ſi- ¹⁵
ducia ſit ; ſed quod dubia ſpes, certa de-
ſperatione ſit potior. interdum enim glutinatur.
Tum, ſi utrumlibet inteſtinum livi-
dum, aut pallidum, aut nigrum eſt, quibuſ
illud quoque neceſſario accedit, ut ſenſu ²⁰
careat, medicina omniſ inaniſ eſt. Si vero
adhuc ea ſui coloris ſunt, cum magna fe-
ſtinatione ſuccurrendum eſt : momento
enim alienantur externo & inſueto ſpiritu
circundata. Reſupinanduſ autem homo ²⁵
eſt, coxiſ erectioribuſ; &, ſi anguſtius vul-
nuſ eſt, quam ut inteſtina commodè reſun-
dantur, incidendum eſt, donec ſatiſ pateat.
Ac, ſi jam ſicciora inteſtina ſunt, perluen-
da aqua ſunt, cui paululum admodum olei ³⁰
ſit adjectum. Tum miniſter oraſ vulneriſ
leniſter diducere manibuſ ſuiſ, vei etiam
duobuſ hamiſ, membranæ interiori inje-
ctiſ,

ctis, debet: medicus priora semper intestina, quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorum locum servet. Respositis omnibus, leniter homo concutendus est. quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes reducantur, & in his confidant. His conditis, omentum quoque considerandum est: ex quo, si quid jam nigri & 10 emortui est, forfice excidi debet: si quid integrum est, leniter super intestina reduci: futura autem, neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se, satis proficit; sed utriusque. Et quidem è duobus 15 linis facienda est, & spissior quam alibi; quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æque magnis inflammationibus par ea exposita est. Igitur in duas acus fila conjicienda, eæque duabus manibus tenen- 20 dæ & prius interiori membranæ sutura injicienda est sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. quo fit, ut ab intesti- 25 nis ea pars semper acum longe sit, quæ acuta; propinqua, quæ retusa est. Semel utraq; parte trajecta, permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra 30 continuit: iterumque eodem modo per oras immittendæ sunt: atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Post hæc,

eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ, similique ratione ei quoque parti utraque futura injicienda; semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus trajectis. Dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedero debere; manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

C A P. X V I I.

*De Interiore membrana
abdominis rupta.*

INTERDUM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod foeminis quoque ex utero saepe evenire consuevit: fitque præcipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecora intumescat. Atque id quoque aliter atque aliter curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immissis sic utrinque devinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uva positum est, ut, quicquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii (quod semper eodem modo servandum esse jam posui) & tum oras sutura jungunt.

gunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea
 5 parte rupta membrana sit; quaque integra est, ea magis obnitatur: tum, qua rupta videbitur, incidendæ scalpello duæ tunicae sunt, ut, exciso medio, interior membrana utrinque recentem plagam habeat;
 10 quia, quod vetus est, futura non coit. Loco patefacto, si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum oras ejus exulceret. Cætera, quæ ad futuram, reli-
 15 quamque curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

2. De Varicibus ventris.

Præter hæc evenit, ut in quorundam
 20 ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quam quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo.

C A P. X V I I I.

25 De Testiculorum natura, & morbis.

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent. quæ quo facilius explicem,
 30 prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam glandulis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent: dolent autem

in ictibus & inflammationibus tunicarum, quibus hi continentur. Dependent vero ab inguinibus per singulos nervos, quos *κροτοῖς* Græci nominant, cum quorum utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ. Hæc autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ *ἐλαιοειδής* à Græcis nominatur. Super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima 10 parte inhaeret. *δασυὴ* Græci vocant. Multæ deinde membranulæ venas & arterias, eosque nervos comprehendunt; atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus tenues patulæque sunt. Hactenus 15 propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui etiam conspicitur à nobis. *ὄρχις* Græci, scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte 20 mediis tunicis leviter innexus, à superiore tantum circumdatus est.

Sub hoc igitur plura vitia esse consueverunt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his 25 integris fiunt. siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit. 30 Tum pondere eo devolvitur, aut omentum, aut etiam intestinum: atque ibi re-
perta via, paulatim ab inguinibus in inferiores

riores quoque partes nisum, subinde nervosas tunicas, & ob id, quod dixi, patentes diducit. *ἐπιεργήλῳ* & *ἐπιπλοκήλῳ* Græci vocant: apud nos indecorum, sed commune his, herniæ nomen est.

Deinde, si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illucve conversum, aut alioquovis modo collocatum: itemque, si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu vero inæqualis est, & mollis, & lubricus.

At si intestinum quoque descendit, tumor is sine inflammatione modo minuitur, modo increfcit; estque fere sine dolore &, cum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit, interdum sic minuitur, ut in scroto exiguæ reliquæ maneat: at sub clamore, & satietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crefcit: frigore omni contrahitur, calore diffunditur; estque tum scrotum & rotundum, & tactu leve: idque, quod subest, lubricum est; si pressum est, ad inguen revertitur; dimissumque iterum cum quodam quasi murmure devolvitur. & id quidem in levioribus malis evenit. Nonnunquam autem stercore accepto vastius tumet, retroque compelli non potest: adfertque tum dolorem & scroto, & inguinibus, & abdomini. Nonnunquam stomachus quoque affectus primum rufam bi-

lem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram.

Integris vero membranis interdum eam partem humor distendit. Atque ejus quæque species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is increfcit, vel in membranis, quæ ibi circa venas & arterias sunt, ubi hæ gravatæ occalluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est. 10 Nam modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit. Græci communi nomine, quicquid est, *ὑδρῶδες* appellant: nostri vero, scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc 15 quoque sub eodem nomine, quo priora, habent.

Signa autem quædam communia sunt, quædam propria. Communia, quibus humor deprehenditur: propria, quibus locus. 20 Humorem subesse discimus, si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum levior; aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris: isque mollis est, si non nimius humor subest; 25 at, si is vehemente increvit, renititur sicut uter repletus & arcte adstrictus: venæ quoque in scroto inflantur; &, si digito premimus, cedit humor, circumfluenſque id, quod non premitur, attollit; & tanquam in vitro 30 cornuve per scrotum apparet; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem ejus sic deprehenditur. Si inter summam me-

mediamque tunicam est, cum digitis duobus premimus, paulatim humor inter eos revertens subit: scrotum remissius & albidius est; si ducitur, aut nihil, aut paululum intenditur: testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. At, si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat.

- 10 Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur. *κισσοκήλιω* Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ quandoque intortæ, conglomeratæque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel
15 mediam tunicam, vel imam: interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculum nervumque ejus, increscunt. Ex his eæ, quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ vero, quæ mediæ imæve tunicæ insident,
20 ut magis conditæ non æque quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subjectæ sunt: præterquam quod & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo; & id prementi magis renititur, ac per ipsos
25 venarum toros inæquale est; & , qua parte id est, testiculus magis justo dependet. Cum vero etiam super ipsum testiculum nervumque ejus id malum increvit, aliquanto longius testiculus ipse descendit,
30 minorque altero fit, utpote alimento amisso.

Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increscit. *σπερκοκήλιω* Græci vocant.

Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque adfert; & nisi celeriter ea inflammatio conquievit, & dolor ad inguina atque ilia pervenit; partesque hæc intumescunt, & nervus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indurescit.

Super hæc, inguen quoque nonnunquam ramices implent. *βυβονομήλω* ad-¹⁰pellant.

C A P. X I X.

De Testiculorum curationibus communibus:

& primo de incisione & curatione ¹⁵
Inguinis, vel Scroti.

HIS cognitis, de curatione dicendum est. In qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam.²⁰ Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ac ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, inter-²⁵dum scrotum. In utraque curatione homo ante per triduum bibere aquam; pridie abstinere etiam à cibo debet: ipso autem die collocari supinus: deinde, si inguen incidendum est, idque jam pube contegitur,³⁰ ante radendum est: tum, extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tuni-

cæ

cæ inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perveniatque ad eam, quæ media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. Minister autem, sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscindat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ jungatur, digitoque inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde, si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: majores vero ante longiore lino deligandæ sunt; ne periculo se sanguinem fundant.

25 Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra tamen non tota demenda est: nam quod ad basin testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. itaque ibi relinquendum est.

Idem in ima quoque tunica, si læsa est,
X § facien-

faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paululum ea abscindenda; ne, læsa abdominis membrana, inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex ea rursus relinquendum est; ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præster.

Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis, & arteriis, & nervo suo leniter demittendus est; videndumque, ne 10 sanguis in scrotum descendat, neve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt. quæ, 15 pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injiciendæ duæ fibulæ sunt; & insuper medicamentum, quo glutinetur.

Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix major & la- 20 tior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida, vel spongia: cætera eadem, quæ, ubi pus 25 moveri debet, adhibenda sunt. At, cum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, & incidendum; si parvulum est, quod nocet, 30 modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquatur: si majus est, etiam amplius, ut paululum tantummodo

tummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas fecet, quæ inter summam mediamque tunicam sunt. At, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicumque autem repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: me-
dicum, digito manubriolove scalpelli ducta inferiore parte, tunicam extra collocare; deinde eam ferramento, quod à similitudine corvum vocant, incidere sic, ut intrare duò digiti, index & medius possint:
his deinde confectis, incidenda reliqua pars tunicae, & inter digitos scalpellus immit- tendus est, eximendumque aut effundendum quicquid est noxium.

Quamcumque autem tunicam quis violavit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra dixi, quam altissime ad inguens; imani autem, paulo infra. Cæterum antequam excidantur, hæ quoque vinciri lino summa cura debent; & ejus lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in aliis quoque venis, quæ id requisierint.

Eo facto, testiculus intus reponendus est:

est: oræque scroti futuris inrer se commit-
tendæ; neque paucis, ne parum glutinen-
tur, & longior fiat curatio; neque multis,
ne inflammationem augeant. Atque hic
quoque videndum est, nequid in scroto
sanguinis maneat: tum imponenda gluti-
nantia sunt.

Si quando autem in scrotum sanguis de-
fluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, 10
incidi subter id debet; purgatoque eo spon-
gia, acri aceto madens, circumdari. Deli-
gatum autem vulnus omne, quod ex his
causis factum est, si dolor nullus est, quin-
que primis diebus non est resolvendum, sed 15
bis die tantum aceto irroranda, lana vel
spongia imposita: si dolor est, tertia die
resolvendum; & ubi fibulæ sunt, hæ inci-
dendæ; ubi linamentum, id mutandum est;
rosæque & vino madefaciendum id, quod 20
imponitur. Si inflammatio increfcit, ad-
jiciendum prioribus cataplasma ex lenti-
cula & melle; vel ex malicorio, quod in
austero vino coctum sit; vel ex his mixtis.
Si sub his inflammatio non conquirit, post 25
diem quintum multa calida aqua vulnus
fovendum, donec scrotum ipsum & exte-
nuetur, & rugosius fiat: tum imponendum
cataplasma ex triticea farina, cui resina pi-
nea adjecta sit. quæ ipsa, si robustus cura- 30
tur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda
sunt. Neque dubium est, quodcunque vi-
sium fuit, si magna inflammatio est, quin
ca,

ea, quæ pus movent, imponenda sunt.

Quod si pus in ipso scroto ortum est, paululum id incidi debet, ut exitus detur; linamentumque catenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos propiore cataplasmate, deinceps cerato utendum est. Hæc proprie ad ejusmodi vulnera pertinent. Cætera, & in curatione, & in victu, similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

CAP. XX.

15 *De Intestini in scrotum devoluti curatione.*

HIS propositis ad singulas species veniendum est. Ac, si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei
20 causa fit, cui uno loco pila assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur: deinde reliqua fasciæ pars arcte circundatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se
25 tunicæ glutinantur. Rursus, si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adjiciunturque dolores & vomitus (quæ ex stercore, per cruditatem eo delapso, fere accidunt) scalpellum
30 adhberi sine perniciæ non posse, manifestum est: levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est.

Sanguis

Sanguis mitti ex brachio debet: deinde; si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore superhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc, & farina hordeacea cum resina injicienda; & ipse demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoque adjectum 10 sit; dandumque aliquid cibi levis & calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quæ supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor re- 15 verterit, eadem erunt facienda.

Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est: non quo excludi à scroto non possint (nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quo 20 repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo, quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus 25 in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberet. Neque enim nisi cum periculo læditur, quæ incidenda est; cum 30 intestinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debet sic, ne ipse lædatur;

tur ; tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit.

- 5 Sin vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem
10 modo duobus hamis excipitur sic, ut à sinistro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur; sub eaque index digitus sinistræ manus ad imum testiculum
15 demittitur, eumque ad plagam compellit: deinde dextræ manus duo digiti, pollex atque index, venam & arteriam & nervum tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliquæ membranulæ pro-
20 hibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quæ excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque ejus vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est; quo
25 major plaga sit, & plus creare carnis possit.

C A P. X X I.

De Omenti in scrotum prolapsi curatione.

- 30 **A**T si omentum descendit; eodem quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæque tunicæ sunt. Considerandum autem est, majorne ejus modus, an exiguus sit. Nam quod

quod parvulum est, super inguen in uterum vel digito vel adverso specillo repellendum est: si plus est, sinere oportet de-
pendere, quantum ex utero prolapsum est; 5
idque adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur & excidat. Quidam hic quoque duo lina acu trajiciunt, binisque singulorum capitibus diversas partes adstringunt. Sub quo æque, sed tardius emo- 10
ritur. Adjicitur tamen hic quoque celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis, quæ exedunt, nec erodunt. *σπινκῶ* Græci vocant. Fuerunt etiam, qui omentum forfice præciderent. Quod in 15
parvulo non est necessarium: si majus est, potest profusionem sanguinis facere; si-
quidem omentum quoque venis quibusdam, etiam majoribus illigatum est. Neque vero, si discisso ventre id, quod prolap- 20
sum est, forfice præciditur, cum & emortuum sit; & aliter tutius avelli non possit, inde huc exemplum transferendum est.

Vulnus autem curari, si reductum omentum est, futura debet: si id amplius 25
fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

2. *De Hernia aquosa curatione.*

Si vero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem, inguen; nisi in his quo- 30
que liquoris ejus major modus prohibet: in viris vero, & ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum est,

est, eo protractis tunicis humor effundi debet: si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor est effundendus, abscindendæque membranæ sunt, si quæ cum continuerunt; deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adjectum, vel nitrum habeat: si sub media, imaye tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæque sunt.

C A P. XXII.

De Ramicis curatione.

15 **R**AMEX autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis infigantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque, ubi inter se implicatæ glomerantur, eo ferrum id admovendum est; tum
20 super farina ex aqua frigida subacta injicienda est; utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui: tertio die lenticula cum melle imponenda est: post, ejectis crustis, ulcera melle purganda,
25 rosa implenda, & ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus vero super mediam tunicam venæ tument, incidendum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venæ digito vel manubriolo
30 scapelli separandæ. qua parte vero in hærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vinciendæ; tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponendusque testiculus est.

At,

At, ubi supra tertiam tunicam ramex infedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tresve venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est; ut ab inguine, & à testiculo deligatæ venæ præcidantur, isque condatur. Sin totum id ramex obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis sic, ut paulatim eas protrahat æque adducendo, donec is testiculus par alteri fiat; tum fibulæ oris sic injiciendæ, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriori parte oram vulneris perforat: tum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est, duas fibulas esse. Tum venæ, quæcunque protractæ sunt in ipsum inguen, averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, & purgato vulnere, est; ut una simul & oras & venas cicatrix devinciat.

Ubi vero inter imam tunicam & ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una curatio est, quæ totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecore, qui-

quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est: si idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscindendæ sunt.

C A P. XXIII.

10

De Carne, qua inter tunicas testiculorum concrevit, & de Nervoindurato.

15

CARO quoque, si quando inter tunicas increvit, nihil dubii est, quin excimenda sit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est.

20

25

At, si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim, febres ardentes; & aut virides, aut nigri vomitus: præter hæc, ingens sitis, & linguæ aspritudo fereque à die tertio spumans bilis alvo cum rofione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremæ partes frigescunt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

C A P. XXIV.

30

De Ramice inguinis.

VBI vero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi; si major, duabus lineis debet, ut medium

dium excidatur : deinde , non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui , colligendæ venæ, vinciendæque , ubi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt. Neque quicquam novi curatio vulneris ejus requirit.

C A P. XXV.

Ad tegendam Glandem colli, si nuda est. 10

AB his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt. In quo si glans nuda est, vultque aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest : sed expeditius in puero, quam in viro ; in eo, cui id naturale est, quam in eo, qui quarundam gentium more circumcissus est; in eo, cui glans parva juxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse coles est, quam in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, ejusmodi est. Cutis circa glandemprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condatur; ibique deligatur: deinde, juxta pubem, in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur; magnaue cura cavetur, ne vel urinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, incidantur. Eo facto, cutis ad vinculum inclinatur, nudaturque circa pubem velut circulus; tum super eo linamenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisque velamenti supra latitudo plagæ præstet. Sed, donec cicatrix sit, vinctum esse id debet; in medio tantum relicto exiguo urinæ itinere.

re. At in eo, qui circumcisis est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore cole est. Non ita dolet, quia, summo soluto, diduci deorsum usque ad pubem manu potest; neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem: tum multa frigida aqua fovetur; emplastroque circumdatur, quod valem lenter inflammationem reprimat; proximisque diebus abstinere, donec prope à fame victus sit, ne forte eam partem satietas excitet. Ubi jam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circulum: super glandem autem adverso emplastroposito induci. sic enim fit, ut inferior pars glutinetur; superior ita sanescat, ne inhæreat.

2. *Quomodo Glans penis contacta aperiiri possit.*

20 **C**ONTRA, si glans ita contacta est, ut nudari non possit (quod vitium Græci *φίμωσις* appellant) aperienda est. Quod hoc modo fit. Subter à summa ora, cutis inciditur recta linea usque ad frenum; atque ita superius tergus relaxatum, cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut vertex ejus ad frenum; basis in 30 tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere: nam ambu-

502 A. CORN. CELSI Lib. 7.
ambulatio, atterendo ulcus sordidum reddit.

3. *Infibulandi ratio.*

Infibulare quoque adolescentulos interdum valetudinis causa quidam consue-
runt: ejusque hæc ratio est. Cutis, quæ super
glandem est, extenditur, notaturque utrin-
que à lateribus atramento, qua perforetur;
deinde remittitur. Si super glandem notæ 10
revertuntur, nimis apprehensum est, & ul-
tra notari debet: si glans ab his libera est,
is locus idoneus fibulæ est. Tum, qua notæ
sunt, cutis acu filum ducente transuitur,
ejusque filii capita inter se deligantur, quo- 15
tidieque id movetur, donec circa foramina
cicatriculæ fiant. Ubi hæ confirmatæ sunt,
excepto filo fibula inditur, quæ, quo levior,
eo melior est. Sed hoc quidem sæpius inter
supervacta, quam inter necessaria est. 20

C A P. X X V I.

*De Urinæ reddendæ difficultate, &
curatione.*

RES vero interdum cogit emoliri ma- 25
nu urinam, cum illa non redditur;
aut quia senectute iter ejus colla-
psum est; aut quia calculus, vel concretum
aliquid ex sanguine intus se opposuit: ac
mediocris quoque inflammatio sæpe eam 30
reddi naturaliter prohibet. Idque non in
viris tantummodo, sed in fœminis quoque
interdum necessarium est. Ergo æneæ fistu-
læ

læ fiunt: æque, ut omni corpori, ampliori
 minorique sufficiant, ad mares, tres; ad
 fœminas, duæ medico habendæ sunt. Ex
 5 virilibus maxima decem & quinque est di-
 gitorum; media, duodecim; minima, no-
 vem: ex muliebribus major, novem; mi-
 nor, sex. Incurvas vero esse eas paululum,
 sed magis viriles oportet, lævesque admo-
 10 dum; ac neque nimis plenas, neque nimis
 tenues.

Homo tum resupinus eo modo, quo in
 curatione calculi figuratur, super subscel-
 lium aut lectum collocandus est. Medicus
 15 autem à dextro latere, sinistra quidem ma-
 nu colem masculi continere; dextra vero
 fistulam demittere in iter urinæ debet: at-
 que ubi ad cervicem vesicæ ventum est, si-
 mul cum cole fistulam inclinatam in ipsam
 20 vesicam compellere, eamque, urina reddi-
 ta, recipere. Fœmina brevius urinæ iter,
 simul & rectius habet, quod carunculæ si-
 mile, inter imas oras super naturale posi-
 tum, non minus sæpe auxilio eget, sed ali-
 25 quanto minus difficultatis exhibet.

Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam
 fistulam calculus, qui subinde ea extenua-
 tur, non longe ab exitu inhærescit. Eum,
 si fieri potest, oportet evellere, vel oricula-
 30 rio specillo, vel eo ferramento, quo in se-
 ctione calculus protrahitur. Si id fieri non
 potuit, cutis extrema quam plurimum at-
 trahenda &, condita glande, lino vincien-
 da

da est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est: rum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

2. *Calculosis quæ curatio adhibeatur.*

Cum vesicæ vero, calculique facta mentio sit; locus ipse exigere videtur, ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptum sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experendum est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam novem annos, nondum quatuordecim excessit; &, si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. non quo interdum etiam temeraria medicina proficiat; sed quo sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. quæ simul cum ipsa curatione proponam.

Igitur, ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ cervicem descendat. Quod an incidit, digitis quoque, sicut in curatione docebo,

docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est; & tum loco calido curatio adhibenda: quæ hoc modo ordinatur.

Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque cum & aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehendit; reductisque ejus cruribus, ipsum
10 quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui curatur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt:
15 quorum & sedilia interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur; atque alter, prout consedit, sinistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites
20 suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc, etiamnum à lateribus duo valentes
25 objiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt.

30 Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisis, sinistræ manus duos digitos, indicem & medium, leniter prius unctos oleo, simul in anum ejus demittit; dextræ-

Y

que

que digitos super imum abdomen leniter imponit; ne, si utrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædat. Neque vero festinanter in hac re, ut 5 in plerisque, agendum est; sed ita, ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quæritur calculus. ubi repertus, minore nego- 10 cio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque manus ejus ul- 15 tra translata subsequitur.

Atque, ubi repertus est calculus (qui necesse est in manus incidat) eo curiosius deducitur, quo minor læviorque est; ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica sit. 20 Ergo ultra calculum dextra semper manus ei se opponit; sinistra cum compellit deorsum digitis, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut ne pronus exeat: si planus, 25 sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si lævior altera parte est, ut ea an- 30 tecedat.

Cum jam eo venit, ut super vesicæ cervicem sit, ut juxta anum incidi cutis plaga lunata

- lunata usque ad cervicem vesicæ debet, cornibus ad coxas spectantibus paululum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est, 5 etiamnum sub cute, altera transversa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinæ iter pateat sic, ut plaga paulo major, quam calculus sit. Nam, qui metu fistulæ (quam illo loco *ὑγρονόα* Græci 10 vocant) parum patefaciunt, cum majore periculo eodem revolvuntur: quia calculus iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit. idque etiam perniciosius est, si figura quoque calculi, vel asperitudo aliquid eo 15 contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & distentio nervorum fieri potest. quæ si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset, incisa.
- 20 Cum via patefacta est, in conspectum calculus venit: in cujus corpore multum discrimen est. Ideo, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest. Si major, injiciendus à superiore 25 ei parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusæ latitudinis; ab interiori parte lævis, qua corpori jungitur; ab interiori asper, qua calculum attingit. Isque 30 longior potius esse debet: nam brevior extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, & teneatur; quia, si apprehen-

hensus est , ille simul inclinatur. Idque eodem nomine opus est , ne , cum adduci uncus cœperit , calculus intus effugiat , hic in oram vulneris incidat , eamque convulneret. In qua re , quod periculum esset , jam supra proposui.

Ubi satis teneri calculum patet , eodem pene momento triplex motus adhibendus est : in utrumque latus ; deinde extra , sic ¹⁰ tamen , ut leniter id fiat , paululumque primo calculus attrahatur : quo facto , attollendus uncus extremus est , uti intus magis maneat , faciliusque illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus pa- ¹⁵ rum commodè comprehenditur , à latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio.

Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim qui- ²⁰ dam non asperi tantummodo , sed spinosi quoque calculi , qui per se quidem delapsi in cervicem , sine ullo periculo eximuntur. In vesica vero , non tuto vel hi conquiruntur , vel attrahuntur : quoniam , ubi illam ²⁵ convulnerant , ex distentione nervorum mortem maturant ; multoque magis , si spina aliqua vesicæ inhæret , eamque , cum deduceretur , duplicavit. Colligitur autem eo , quod difficilius urina redditur , in ³⁰ cervice calculum esse ; eo , quod cruenta distillat , illum esse spinosum : maximeque id sub digitis quoque experiendum est , neque

que adhibenda manus, nisi id consistit. Actum quoque leniter intus digiti objiciendi, ne violenter promovendo convulserent: tum incidendum. Multi hic quoque scalpello usi sunt. Meges (quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) feramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic
 15 deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo con-
 20 sequebatur, ut semel, quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo cervix ea parte secta est, leniter extrahi, quod aspe-
 rum est, debet; nulla, propter festinationem, vi admota.

3. *Signa calculorum, vel arenosorum .
 vel mollium.*

At calculus arenosus, & ante manifestus
 25 est; quoniam urina, quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione; quoniam inter subjectos digitos neque æque, sed leniter renititur, & insuper dilabitur. Item molles calculos, & ex pluribus minutisque, sed
 30 inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, secum trahens quasdam quasi squamulas. Hos omneis, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet abdu-

abducere, ne vesicam lædant, neve intus aliqua dissipata reliquia maneat, quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis, vel unco eximendum est.

At, si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut, si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter invenitur; inventusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitatque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam non secti, cum diu frustra per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus, ad plagam urina postea promovente, excidit.

Si quando autem is major non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posse, findendus est. cuius repertor Ammonius, qui ob id *Ἀμμώνιος* cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitur calculo sic, ut facile eum conclusum quoque teneat, ne is retro revolvatur: tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, & ex altera parte ictum, findat; magna cura habitata, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

4. De Calculis foeminarum.

Hæ vero curationes in foeminis quoque
fimi-

similes sunt ; de quibus parum , proprie tamen quædam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuus est ; quia is urina in cervicem compellitur, quæ & brevior, quam in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & , si in urinæ itinere , quod est angustius, inhæret, eodem tamen unco sine ulla noxa
 10 educitur. At in majoribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subjici digiti tanquam masculo, mulieri per naturalia ejus debent. Tum, virgini quidem, sub ima sinisteriore ora ; mulieri vero, inter
 15 urinæ iter & os pubis , incidendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit. neque terreri convenit , si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

5. *Qua curatio calculo evulso habenda sit.*

20 Calculo evulso , si valens corpus est, neque magnopere vexatum, finire oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atque, ingredi quoque eum paululum, non alienum est, ut excidat , si quid
 25 intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus, in imbecillioribus , ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem , ut distentione nervo-
 30 rum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitur ; sic alter metus excipit , remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, deside-

re is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adjectum. sub quo & sanguis fere conquiescit, & adstringitur vesicā, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & in genibus, & coxis, & super pubem.

Ubi jam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paululum excitentur: ac super vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde, interpositis duabus horis, in solium is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: qui spongia subinde in facie detergendus est. Finisque ejus fomenti est, donec infirmo offendant. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, qui pubem & coxas, & inguina, & plagam ipsam, contentam eodem ante se linteolo, protegat:isque subinde oleo, tepido madefaciendus est; ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, atque vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est.

Pro-

Proximo die, si spiritus difficiliter redditur, si urina non exit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet, in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractanda vesica est, & discutienda, si qua coierunt: quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario
10 clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiam primo die convenit, si timeamus, ne quid intus sit: maximeque, ubi
15 ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eodem lana superinjiciatur.

Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua
20 calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam valens; levi, quam graviore inflammatione adfectus; is, cujus corpus digeritur, quam is, cujus adstrictum est. Inter hæc vero, si somnus est, & æqualis
25 spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter imus sedet, & mediocris est cum febre modica dolor, scire licet, recte procedere curationem.

At in his inflammatio fere quinto vel
30 septimo die finitur: qua levata, solium supervacuum est. supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinæ rodit, abluatur, Imponenda autem medi-

eamenta sunt pus moventia; & si purgandum ulcus videbitur, melle liniendum. Id, si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur *κοινάφραγμα* em-
 5 plastrum. nam & sebum habet ad pus movendum, & mel ad ulcus repurgandum; medullam etiam, maximeque vitulinam; quæ in id, ne fistula relinquatur, præcipue proficit. Linamenta vero tum super ulcus non
 10 sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At, ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est.

Quibus temporibus tamen, si felix cura-
 15 tio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ prælagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si transfiliens urina id
 20 non rodit, si similiter ante tertium diem quædam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde respondet, si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cu-
 25 bare in ventrem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentione nervorum, & ante nonum diem, vomitu bilis, Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinencia, modicis & tempestivis cibis; inter
 30 hæc, fomentis, & quibus supra scripsimus, oportet.

CAP. XXVII.

De Cancro, qui excisa vesica nascitur.

5 **P**ROXIMUS canceri metus est. Is cognoscitur, si, & per vulnus, & per ipsum colem, fluit sanies mali odoris, cumque ea quædam à concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculæ lanulis si-
10 miles. præter hæc, si oræ vulneris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad
15 colem, indurescit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, testiculique intumescunt: si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxæ tumescunt, non facile crura extendi possunt: at, si in alterutrum latus,
20 oculis id expositum est, paresque utrinque easdem notas, sed minores, habet.

Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it,
25 supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus,
30 aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quæ utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleæ folia,

eodem modo decocta; aliave medicamenta, quæ ad cohibendos purgandosque can-
cros proposuimus. ex quibus, si qua erunt
arida, per scriptorium calamum inspira-
buntur.

Ubi stare cœperit cancer, mulso ulcus
eluetur. vitabiturque eo tempore ceratum;
quod, ad recipiendum id malum, corpus
emollit. potius plumbum elotum cum vi- 10
no inungetur: super quæ idem linteolo
illitum imponetur. Sub quibus perveniri
ad sanitatem potest: cum eo tamen, quod
non ignoremus, orto cancro sæpe affici
stomachum, cui cum vesica quoddam con- 15
fortium est: exque eo fieri, ut neque reti-
neatur cibus, neque, si quis retentus est,
concoquatur, neque corpus alatur: ideo-
que ne vulnus quidem aut purgari, aut ali
possit. quæ necessario mortem maturant. 20

Sed ut his succurri nullo modo potest;
sic à primo tamen die tenenda ratio cura-
tionis est. In qua quædam observatio, ad
cibum quoque potionemque pertinens,
necessaria est. Nam cibus inter principia, 25
non nisi humidus dari debet: ubi ulcus pur-
gatum est, ex media materia. olera & sal-
samenta semper aliena sunt. Potione opus
est, non immodica. Nam, si parum bibi-
tur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & 30
vis corporis minuitur: si plus æquo assumi-
tur, subinde vesica impletur, eoque irrita-
tur. Non nisi aquam autem bibendam esse,
mani-

manifestius est, quam ut subinde dicendum sit.

Solet vero sub ejusmodi victu evenire, 5 ut alvus non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum græcum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus, ubi id rodit urina, neque purgari patitur.

10 Fere vero primo per vulnus exit hæc: deinde, eo sanescente, dividitur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, non- 15 nunquam exacto quoque anno fit.

Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta cervix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculæ, simulque nervosa aliqua exci- 20 derunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa curâ providendum est. Ergo, cum jam ad cicatricem vulnus tendit, extentis jacere feminibus & cruribus oportet; nisi tamen mol- 25 les arenæ sive calculi fuerunt: sub his enim tardius vesica purgatur. ideoque diutius plagam patere necessarium est: & tum demum, ubi jam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perducitur.

30 Quod si, antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel averso specillo diducendum est; ut torquentibus
exitus

exitus detur. Hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum demum, quæ cicatricem inducant, imponenda sunt, extendendique, ut supra docui, pedes, quam 5 maxime juncti.

Quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est; 10 extentisque cruribus femina talique inter se deliganda sunt, donec, qualis futura est, cicatrix sit.

C A P. XXVIII.

*Si naturalia fœminarum non admittunt
concubitum, quomodo curari
conveniat.* 15

Et hoc quidem commune esse maribus & fœminis potest. Proprie vero quæ- 20 dam ad fœminas pertinent: ut in primis, quod earum naturalia nonnunquam, inter se glutinatis oris, concubitum non admittunt. Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum exulcera- 25 tione in his partibus facta, & per malam curationem his oris sanescendo junctis. Si ex utero est, membrana ori vulvæ opposita est: si ex ulcere, caro id replevit.

Oportet autem membranam duabus li- 30 neis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literæ X, magna cura habita, ne urinæ iter violetur: deinde undique eam mem-

membranam excidere. At, si caro increvit,
 necessarium est recta linea patefacere: tum
 ab ora vel vulsella vel hamo apprehensam,
 5 tanquam habenulam, excidere: & intus
 implicitum in longitudinem linamentum
 (λημίσκον Græci vocant) in aceto tin-
 ctum demittere, supraque succidam lanam
 aceto madentem deligare: tertio die solve-
 10 re, & vulnus, sicut alia vulnera, curare.
 Cumque jam ad sanitatem tendet, plum-
 beam fistulam medicamento cicatricem
 inducente illinere, eamque intus dare: su-
 praque idem medicamentum injicere, do-
 15 nec ad cicatricem plaga perveniat.

C A P. X X I X.

*Qua ratione Partus emortuus
 ex utero excutitur.*

- 20 **U**B I concepit autem aliqua, si jam
 prope maturus partus intus emor-
 tuus est, neque excidere per se po-
 test, adhibenda curatio est. Quæ numerari
 inter difficillimas potest. nam & summam
 25 prudentiam moderationemque desiderat,
 & maximum periculum affert. Sed ante
 omnia vulvæ natura mirabilis, cum in
 multis aliis, tum in hac re quoque facile
 cognoscitur.
- 30 Oportet autem ante omnia resupinam
 mulierem transverso lecto sic collocare, ut
 feminibus ejus ipsius ilia comprimantur.
 quo fit, ut & imus venter in conspectu
 medici

medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur; quæ, emortuo partu, id comprimit: ex intervallo vero paululum dehiscit. Hac occasione usus medicus, unctæ manus indicem digitum primum debet inferere, atque ibi continere, donec iterum os adaperiatur, rursusque alterum digitum demittere debebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cuius rei facilitatem multum confert & magnitudo vulvæ, & vis nervorum ejus, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur: cum præsertim intus nonnunquam etiam duæ manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema corporis; neque dum inflammationem accepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. Nam, si corpus jam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrime potest; sequiturque sæpe cum vomitu, & cum tremore, mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitum ejus sentit. nam aut in caput, aut in pedes conversum est, aut in transversum jacet: fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel pes in propinquo sit.

Medici vero propositum est, ut infantem manu dirigat vel in caput, vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus

corpus rectius reddit. nam manus in caput, pes in pedes eum convertet. Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus, undique lævis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur: deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. nam, si compresso vulvæ ore id tentatum est, non emittente eo, infans abrumpitur, & unci acumen in ipsum os vulvæ delabatur; sequiturque nervorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere; hiantem, leniter trahere oportet; & per has occasiones paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus uncum; sinistra, intus posita, infantem ipsum, simulque dirigere eum debet.

Solet etiam evenire, ut is infans humore distendatur; exque eo profluat fœdi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut, effuso humore, extenuetur: tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus injectus putri corpusculo facile elabatur. in quo quid periculi sit, supra positum.

Sed in pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur. namque his apprehensus per ipsas manus commode educitur.

Si vero transversus est, neque dirigi potuit, uncus alæ injiciendus, paulatimque attra-

attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque caput ad reliquum corpus spectat. Remedio est, cervix præcisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, 5 qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere, majore parte extracta, caput in vacuam vulvam prolabitur, ex- 10 trahique sine summo periculo non potest.

Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo injecto, valens homo, non imperitus, à sinistro latere ejus debet assistere, & super imum ventrem ejus 15 duas manus imponere, alteraque alteram premere, quo fit, ut illud caput ad os vulvæ compellatur; idque tum eadem ratione, quæ supra posita est, unco extrahi possit.

At, si pes alter juxta repertus est, alter re- 20 tro cum corpore est, quicquid prolapsum est, paulatim abscindendum est. Et, si clunes os vulvæ urgere cœperunt, iterum retro repellendæ sunt, conquistusque pes ejus adducendus. Aliæque etiamnum diffi- 25 cultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is cum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu 30 leniter trahere umbilicum debet ita, ne abruptat, dextraque cum sequi usque ad eas, quas Secundas vocant, quod velamentum infan-

infantis intus fuit : hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere à vulva, totumque illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicum calorem, sine ullo perflatu, habente. Super imum
 10 ventrem ejus imponenda lana succida, in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibetur.

15

C A P. X X X.

De Ani vitiis.

ANI quoque vitia, ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua fissa in eo vetustate induruerunt, jamque callum habent, commodissimum est, ducere alvum; tum spongiam calidam admovere, ut relaxentur illa, & foras prodeant: ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & ulcera renovare; deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle; locumque eum molli lana implere, & ita vincire: altero die, deincepsque cæteris, lenibus medicamentis uti; quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse, alias proposui: utique per primos dies sorbitionibus eum sustinere; paulatim deinde cibis adji-
 20
 25
 30 cere

cere aliquid, generis tamen ejus, quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est; ne anus ipse suppuret. Neque tamen ante prope-
randum est. nam, si crudum incisum est, inflammationi multum accedit, & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medi-
camentis opus est. 10

2. *De Condylomatibus.*

At tubercula, quæ *κονδυλώματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. Alvus ante omnia ducitur. Tum
vulsella tuberculum apprehensum, juxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem
adhibenda esse proposui: tantummodo, si quid increscit, squama æris coercendum est. 20

3. *De Hemorrhoidibus.*

Ora etiam venarum, fundentia sanguinem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit, sanies adjicitur, alvus acribus ducitur; quo magis ora promoveantur. eoque fit, ut om-
nia vasa, quasi capitula conspicua sint. Tum, si capitulum exiguum est, basimque tenuem habet, adstringendum lino paulum
supra est, quam ubi cum ano committitur, imponendaque spongia ex aqua calida est, 30
donec id liveat: deinde aut ungue, aut scalpello, supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequun-
sequun-

sequuntur: interdum etiam urinæ difficultas. Si id majus est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est, paululumque supra basim incidendum: neque relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. Qua incisum est, acus 10 debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triaue sunt, intimum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique teneræ cicatrices sint. Si sanguis pro- 15 fluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum, ungenda femina, & inguina, & quicquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, & farina hordeacea calida implendus is locus, & sic deli- 20 gendus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, coxendices, ac femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco conti- 25 nendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda, &, si capitula simul non exciderunt, digito promovenda: tum lenibus medicamentis, iisdemque, quæ alibi posui, ulcera 30 ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias superius exposui.

AB his ad crura proximus transitus est. In quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum, quæ in capite nocent; & eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem 10 est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta; si, quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, & velut orbes quosdam im- 15 plicatur, pluresve inter se involvuntur, utilius excidere est.

Adurendi ratio hæc est. Cutis superinciditur: tum, patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modice premitur; 20 vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit: & tum superponitur medicamentum, quo adusta sanantur. 25

At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur; scalpelloque undique à corpore vena diducitur; caveturque, ne inter hæc ipsa lædatur; eique retusus hamulus subji- 30 citur; interpositoque eodem fere spacio, quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ, quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi

Ubi jam idem, quacunque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur: deinde, qua proximus hamus est, attrahitur & evellitur; ibique rursus abscinditur. Ac sic undique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans injicitur.

10 C A P. XXXII.

De Digitis coherentibus, & curvatis.

AT, si digiti vel in utero protinus, vel
15 propter communem exulcerationem postea cohæserunt, scalpello inducuntur: dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur: atque ita per se uterque sanescit.

Si vero fuit ulcus in digito, posteaque
20 male inducta cicatrix curvum eum reddidit; primum malagma tentandum est: dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & ubi nervi læsi sunt, evenire consuevit) videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non
25 debet: neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix excidenda est, quæ fere callosa efficit, ut extendi digitus non possit. Tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.
30

De Gangrena.

GANGRENAM inter ungues alas-
que, aut inguina nasci; &, siquando
medicamenta vincuntur, membrum
præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

Sed id quoque cum periculo summo fit,
nam sæpe in ipso opere, vel profusione
sanguinis vel animæ defectione moriun-
tur. Verum hic quoque nihil interest, an
satis tutum præsidium sit, quod unicum est.
Igitur inter sanam vitiatamque partem
incidenda scalpello caro usque ad os est sic,
ut neque contra ipsum articulum id fiat,
& potius ex sana parte aliquid excidatur,
quam ex ægra relinquatur. Ubi ad os ven-
tum est, reducenda ab eo sana caro, & cir-
ca os subsecanda est, ut ea quoque parte
aliquid ossis nudetur: dein id ferrula præ-
cidendum est, quam proxime sanæ carni
etiam inhærenti: ac tum frons ossis, quam
ferrula exasperavit, lævanda est, supraque
inducenda cutis. quæ sub ejusmodi cura-
tione laxa esse debet, ut quam maxime
undique os contegat. Quo cutis inducta
non fuerit, id linamentis erit contegen-
dum, & super id spongia ex aceto deligan-
da. Cætera postea sic facienda, ut in vul-
neribus, in quibus pus non moveri debet,
præceptum est.

LIBER OCTAVUS.

CAP. I.

*De positu & figura Ossium totius
humani corporis.*

SUPEREST ea pars, quæ ad ossa pertinet.
Quæ quo facilius accipi possit, prius
positus figuraſq; eorū indicabo. Igitur
10 calvaria incipit ex interiore parte concava,
extrinsecus gibba, utrinque lævis, &, qua
cerebri membranam contegit, &, qua cute,
capillum gignente, contegitur. Eaque
simplex, ab occipitio & temporibus; du-
15 plex, usque in verticem à fronte, est. Os-
saque ejus, ab exterioribus, dura; ab inte-
rioribus, quibus inter se connectuntur,
molliora sunt. Interque ea venæ discur-
runt, quas his alimentum subministrare,
20 credibile est.

Raro autem calvaria solida, sine futuris
est; locis tamen æstuosis facilius invenitur.
& id caput firmissimum, atque à dolore
tutissimum est: ex cæteris, quo futuræ
25 pauciores sunt, eo capitis valetudo com-
modior est, neque enim certus earum nu-
merus est, sicut nec locus quidem. Fere
tamen duæ, super aures, tempora à supe-
riore capitis parte discernunt: tertia, ad la-
30 tera per verticem tendens, occipitium à
summo capite diducit: quarta, ab eodem
vertice per medium caput ad frontem pro-
cedit; eaque modo sub imo capillo desinit,

Z

modo

modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in unguem committuntur : hæ vero , quæ super aures transversæ sunt , totis oris paulatim extenuantur ; atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum vero in capite os post aurem est ; quæ capillus , ut verissimile est , ob id ipsum non gignitur. Super hos quoque musculos , qui temporæ contegunt , os medium , in exteriorem partem inclinatum , positum est. At facies futuram habet maximam. quæ à tempore incipiens , per medios oculos , naresque transversa pervenit ad alterum tempus. A qua breves duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et malæ quoque in summa parte singulas transversas futuras habent. A mediisque naribus , aut superiorum dentium gingivis , per medium palatum una procedit ; aliaque transversa idem palatum secat. Et futuræ quidem in plurimis hæ sunt.

Foramina autem , intra caput , maxima oculorum sunt ; deinde narium ; tum quæ in auribus habemus. Ex his , quæ oculorum sunt , recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem hæc primum à superciliis , angulisque oculorum , osse inchoantur ad tertiam fere partem : deinde in cartilaginem versa , quo propius ori descendunt , eo magis caruncula quoque molliuntur.

liuntur. Sed ea foramina, quæ à summis ad intimas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur: aliaque ex his, ad
5 fauces pervia, spiritum & reddunt & accipiunt; alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque primo rectum & simplex
10 iter procedendo flexuosum fit. Quod juxta cerebrum in multa & tenuia foramina ducitur, per quæ facultas audiendi est. Juxta ea duo parvuli quasi sinus sunt; superque eos finitur os, quod transversum à genis
15 tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur. Jugale appellari potest ab eadem similitudine, à qua id Græci ζυγῶδες appellant. Maxilla vero est molle os, eaque una est. Cujus eadem & media, & etiam ima pars,
20 mentum est: à quo utrinque procedit ad tempora; solaque ea movetur. Nam maxillæ cum toto osse, quod superiores dentes excipit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt.
25 Alter processus, intralator, vertice ipso tenuatur, longiusque procedens sub osse jugali subit, & super id temporum musculis illigatur. Alter brevior & rotundior, & in eo sinu, qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc & illuc se inclinans maxillæ facultatem motus præstat.

Duriore ossis dentes sunt: quorum par maxillæ, pars superiori ossi malarum hæ-

ret. Ex his quaterni primi, quia secant, *τε-
μνῆ* à Græcis nominantur. Hi deinde qua-
tuor caninis dentibus ex omni parte cin-
guntur. Ultra quos utrinque fere maxilla-
res quini sunt, præterquam in iis, in qui-
bus genuini, qui sero gigni solent, non in-
creverunt. Ex his primores singulis radi-
cibus, maxillares utique binis; quidam
etiam ternis, quaternisve nituntur. Fere-
que longior radix breviorē dentem edit;
rectique dentis recta etiam radix, curvi fle-
xa est. Ex ea radice in pueris novus dens
subit, qui multo sæpius priorem expellit:
interdum tamen supra infrave eum se o-
stendit.

Caput autem spina excipit. Ea constat
ex vertebra quatuor & viginti. Septem in
cervice sunt, duodecim ad costas, reliquæ
quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes
brevesque, ab utroque latere, processus
duos exigunt: mediæ perforatæ, qua spinæ
medulla cerebro commissa descendit: late-
ra quoque inter duos processus tennibus
cavis pervia, per quæ à membrana cerebri
similes membranulæ deducuntur. Omnes-
que vertebræ (exceptis summis) à supe-
riore parte in ipsis processibus parum desi-
dentes sinus habent: ab inferiore alios
deorsum versus processus exigunt. Summa
igitur protinus caput sustinet, per duos si-
nus receptis exiguis ejus processibus. Quo
fit, ut caput deorsum parvis tuberibus ex-
aspe-

asperetur. Secunda superioris parti inferiori inferitur. Quod ad circuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur. itaque superior secundæ circumdata in latera quoque caput moveri finit. Tertia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac, ne sustinere quidem caput posset, nisi utrinque recti valentesque nervi collum continerent, quos *καρπός* Græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. Jamque vertebra tertia tubercula, quæ inferiori inferantur, excipit. Cæteræ processibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur, ac per sinus, quos utrinque habent, superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine continentur. Ac sic, uno flexu modico in primum dato, cæteris negotiis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur.

Infra cervicem vero summa costa contra humeros sita est. Inde septem inferiores usque ad imum pectus perveniunt: hæque, primis partibus rotundæ & leniter quasi capitulatæ, vertebrarum transversis processibus, ibi quoque paululum sinuatis, inhærent: inde latefcunt, & in exteriorem partem recurvatæ paulatim in cartilagine degenerant; eaque parte rursus in interiora leniter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à fa-

cibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis, jam ipsum quoque cartilagine mollium, terminatur. Sub costis vero superioribus quinque (quas *πόδες* Græci nominant) breves tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartilaginem versæ, extremis abdominis partibus inhærescunt; imaque ex his, majore jam parte nihil, nisi cartilago est. 10

Rursus, à cervice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt: nostri scutula operta; *ὀμωπλάταις* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimque lateſcentia ad spinam tendunt; & 15 quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atque ipsa quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant; quoniam, nisi in summo, nulli ossi inhærescunt. Ibi vero validis musculis nervisque constri. 20 cta sunt.

At à summa costa paulo interiorius, quam ubi ea media est, os excreſcit, ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusque est, paululum in interiora curvatum. quod protinus altera verticis parte modice intumescens, sustinet jugulum. Id ipsum recurvum ac inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, 30 altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paululumque motu brachii movetur, & cum lato osse scapularum, infra caput ejus,

ejus, nervis & cartilagine connectitur.

Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, 5 cartilaginosus: medius teres, durus, medullosus: leniter cavus, in priorem & interiorrem; gibbus, in posteriorem & exteriorrem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore est: posterior, quæ ab scapulis: interior, quæ 10 ad latus tendit: exterior, quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cætera ossa, de quibus adhuc dixi, verticillati scapularum ossi 15 inseritur, ac maiore parte extra id situm nervis deligatur. At inferius duos processus habet: inter quos, quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur.

Quæ res sedem brachio præstat. quod 20 constat ex ossibus duobus. Radius, quem *κνίχιδα* Græci appellant, superior breviorque, & primo tenuior, rotundo & leniter cavo capite exiguum humeri tuberculum recipit. quod ibi nervis & cartilagine con- 25 tinetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus extantibus in sinum humeri, quem inter duos processus ejus esse proposui, se inserit. Primo vero duo, radii 30 & brachii, ossa juncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein ra-

dius,

dus, in caput cartilaginofum confurgens, in cervicem ejus infinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paululum procedit. Ac, ne sæpius dicendum fit, illud 5 ignorari non oportet, plurima ossa in cartilaginem definere, nullum articulum non sic finiri. Neque enim aut moveri posset, nisi lævi inniteretur; aut cum carne nervisque 10 conjungi, nisi ea media quædam materia committeret.

In manu vero prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia, & triangula, structura quadam inter se con- 15 nectuntur, cum invicem superior alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paululum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinu radii conjiciuntur. Tum ex altera parte 20 quinque ossa recta, ad digitos tendentia, palmam explent. A quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant. omniumque eadem ratio est. Interius os in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum 25 tuberculum; nervique ea continent. A quibus orti ungues indurescunt. ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inhærent. At superiores quidem partes sic ordinatæ sunt. 30

Ima vero spina in coxarum osse definit; quod transversum longeque valentissimum, vulvam, vesicam, rectum intestinum tuerur.

tur. Idque ab exteriori parte gibbum; ad spinam, resupinatum; à lateribus, id est, in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur os, quod pectinem vocant; idque, super intestina sub pube transversum, ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in fœminis, ne partum prohibeat.

- 10 Inde femina oriuntur. Quorum capita rotundiora etiam, quam humerorum sunt; cum illa ex cæteris rotundissima sint. Infra vero duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa, 15 & ab exteriori parte gibba, rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxæ, sicut humeri in ea ossa, quæ scapularum sunt, conjiciuntur; tum infra introrsus leviter tendunt, quo 20 æqualius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quæ commissura ossi parvo, molli, cartilaginoso tegitur. patellam vocant. 25 Hæc super innatans, nec ulli ossi inhærens, sed carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus juncturam tuetur.

- Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. 30 Etenim per omnia femur humero, crus vero brachio simile est: adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne

respondet. Verum alterum os ab exteriori parte suræ positum est: quod ipsum quoque sura recte nominatur. Id brevius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum 5 à priore parte positum, cui tibiæ nomen est, longius & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur; sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa, infra supraque conjuncta, 10 media, ut in brachio, dehiscunt.

Excipitur autem crus infra osse ex transverso talorum; idque ipsum super os calcis situm est. quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex talo 15 recipit, ut in sinum ejus inseritur. Idque sine medulla durum, magisque in posteriorem partem projectum, teretem ibi figuram repræsentat. Cætera ossa pedis ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem in- 20 structa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

C A P. I I.

Ossa vitiata & corrupta quibus signis 25 cognoscantur, & qua ratione curentur.

OMNE autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut 30 de loco movetur. Id, quod vitiatum est, primo fere pingue fit; deinde vel nigrum, vel cariosum. quæ, supernatis gravibus ul-
ceri-

- ceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eveniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso, & si latius est ejus vitium, quā
5 ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique os integrum patefiat: tum id, quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo squama sece-
10 dat; aut radere, donec jam aliquid cruoris ostendatur, quæ integri ossis nota est. nam necesse est aridum sit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. siquidem ea quoque scalpello radenda
15 est, donec integrum id sit, quod relinquitur. Deinde, siue os siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in summo osse est. siquidem id vel paulo diu-
20 tius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum
25 est. Albo finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie, manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descendit utrumlibet, dubium est.
- 30 In carie quidem expedita cognitio est; si specillum tenue in foramina demittitur; quod magis minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse, testa-
Z 6 tur.

tur. Colligi idem potest etiam ex dolore, & ex febre, quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit. nam finis vitii est, ubi scobis nigra esse desit. Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent: tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fiat. simul enim & post hæc solvetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est; & is sinus carne replebitur; & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. 15

Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis tranfit, oportet excidi. Idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, fieri potest. Sed, quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, catenus, quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariola est, inutilis ustio, sed excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui, osse nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix, etiam si recte cessit curatio, veram sanitatem reddit, CAP.

CAP. III.

Quomodo os excidatur ; & de Modiolo, & Terebra, ferramenti ad id paratis.

- E**XCIDITUR vero os duobus modis. Si parvulum est, quod læsum est, modiolo. quem *κλινίσις* Græci vocant. si spatiosius, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, teres, est, imis oris ferratum: per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei, quo fabri utuntur: alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit. deinde subito latius fit; atque iterum ab alio principio paulo minus quam æqualiter sursum procedit.
- Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. At, si caries subest, medius clavus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus sit, qui clavum recipiat, ut, eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit: deinde is habena, quasi terebra, convertitur. Estque quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur: quia, si leviter imprimitur, parum proficit; si graviter, non movetur. Neque alienum est, instillare paululum rosæ, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen, si copiosius est, aciem
- ferra-

ferramenti hebetat. At, ubi jam iter modiololo impressum est, medius clavus educitur, & ille per se agitur. deinde, cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, 5 modiolus removetur.

At, si latius vitium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe, tertiumque, donec tactus is locus, qui exci- 10 dendus est, his cavis cinctus sit. atque ibi quoque, quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adductus id, quod inter utrumque medium est, excidit; ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiololo imprimitur. Utro modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper, & in osse corrup- 20 to planus, summam quamque testam lævet, donec integrum os relinquatur.

Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit, maximeque ubi vitiata calvaria est. Id quoque vitii specillo 25 significatur. quod depressum in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & renitens aliquid invenit, & madens exit. Si pervium invenit, altius descendens inter os & membranam, nihil oppositum invenit, 30 educiturque siccum: non quo non subsit aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut in latiore sede, diffusa sit.

Sive

Sive autem nigrities, quam terebra detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os transit, modioli quidem usus fere super-
5 vacuus est; quia latius pateat necesse est, quod tam alte processit. Terebra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum majore
10 cura agendum est; cum jam aut simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici superius. illud spatium ipsum; hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis finis-
15 tra manus est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda; ut, quando-
docunque os perrumpitur, sentiamus, neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graves inflam-
20 mationes, cum periculo mortis oriuntur.

Factis foraminibus, eodem modo media septa, sed multo circumspectius, excidenda sunt; ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem
25 membranæ custos immittatur. *μνηστράφιον* Græci vocant. lamina autem ænea est, firma, paululum resima, ab exteriori parte lævis. Quæ demissa sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, subinde ei subji-
30 citur, quod scalpro discutiendum est: ac, si excipit ejus angulum, ultra transire non patitur: eoque & audacius, & tutius, scalprum malleolo subinde medicus ferit, donec

nec excisum undique os, eadem lamina leveretur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est, circumradendæ lævandæque sunt oræ, & , si quid scobis membranæ insedit, colligendum. Ubi, superiori parte sublata, inferior relicta est, non oræ tantum, sed os quoque totum lævandum est; ut sine noxa postea cutis incre-
 scat, quæ aspero ossi innascens protinus 10 non sanitatem, sed novos dolores movet.

Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa pervenero. Si basis aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta non pingua, quæ re- 15 centibus vulneribus accommodantur; supraque imponenda lana succida, oleo atque aceto madens. Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increscit, eaque factum manu finem complet. Si quod etiam os adustum 20 est, à parte sana recedit; subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ quod abscessit, expellat. eaque fere, quia testa tenuis & angusta est, *λίστις*, id est squama, à Græcis nominatur. 25

Potest etiam evenire, ut ex ictu neque findatur os, neque perfringatur; sed summum tantum collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & lævari satis est. Hæc quamvis maxime fiunt in capite, tamen 30 cæteris quoque ossibus communia sunt: ut, ubicunque idem incidet, eodem remedio sit utendum. At, cum ea fracta, fissa, forata, collisa

collisa sunt , quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus 5 dicam, initio ab eadem calvaria accepto.

C A P. I V.

De Calvaria fracta .

I G I T U R, ubi calvaria percussa protinus
10 requirendum est , num bilem is homo vomuerit; num oculi ejus obcæcati sint; num obmutuerit ; num per nares auresve sanguis ei effluerit; num conciderit; num sine sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc
15 enim non nisi osse fracto eveniunt. Atque, ubi inciderunt , scire licet, necessariam, sed difficilem curationem esse. Si vero etiam torpor accessit ; si mens non constat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta
20 est ; verisimile est , etiam cerebri membranam esse violatam: eoque in angusto magis spes est. At , si nihil horum secutum est , & jam potest dubitari , an os fractum sit ; & protinus considerandum est , lapide , an li-
25 gno , an ferro , an alio telo percussum sit, & hoc ipso lævi an aspero , mediocri an vastiore, vehementer an leviter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam
30 certiore id nota explorare. Ergo, qua plaga est, demitti specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum ; ne, cum in quosdam naturales sinus inciderit, opinionem fracti
offis

ossis frustra faciat : neque nimis plenum ; ne parvulæ rimulæ fallant. Ubi specillum ad os venit , si nihil nisi læve & lubricum occurrit , integrum id videri potest : si quid asperi est , utique qua futuræ non sint , fractumos esse testatur.

A futuris se deceptum esse , Hippocrates memoriæ tradidit , more scilicet magnorum virorum , & fiduciam magnarū rerum habentium. Nam levia ingenia , quia nihil habent , nihil sibi detrahunt. Magno ingenio , multa que nihilominus habituro , convenit etiam simplex veri erroris confessio ; præcipueque in eo ministerio , quod utilitatis causa posteris traditur ; ne qui decipiantur eadem ratione , qua quis ante deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris , uti interponeremus , effecit. 20

Potest autem futura eo nomine fallere , quia æque aspera est ; ut aliquis hanc esse , etiamsi rima est , existimet eo loco , quo subesse hanc verisimile est Ergo eo nomine decipi non oportet : sed os deoperire tur-25
tissimum est. Nam neque utique certa sedes , ut supra posui , futurarum est : & potest idem & naturaliter commissum & ictu fissum esse , juxtave aliquid fissum habere. Quin aliquando etiam , ubi ictus fuit ve-30
hementior , quamvis specillo nihil invenitur , tamen aperire commodius est. At , si ne tum quidem rima manifesta est , inducendum

cendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id deradendum. nigritiem enim continet, si quid fissum est.

- 5 Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaque, si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neque ea parte, qua cutis discissa est, rima reperitur; non incommo-
10 dum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, & tumeat; eumque aperire: siquidem ibi fissum os reperietur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit. etiamsi frustra secta est. Os fractum, nisi
15 succursum est, gravibus inflammationibus afficit, difficilisque postea tractatur.

- Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri mem-
20 brana rupta aliquid sanguinis mittat;isque ibi concretus magnos dolores moveat, & oculos quibusdam obæcet. Sed fere contra id dolor est, &, eo loco cute incisa, pallidum os reperitur. ideoque id
25 quoque os excidendum est. Quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quicquid læsum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est,
30 ne quid ex ipsa membranula, quæ sub cute calvariam cingit, super os relinquatur: siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus exci-

excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse deduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis litteræ X figuram accipit; ut deinde à singulis procedentibus angulis cutis subsecetur.

Inter quæ, si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, & caput altius excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert: sed ibi quoque nihil tutius fit. 15

In omni vero fisso fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferra menta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ calvaria causa componuntur. eorumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super fissum fractumve os imponere: deinde super id, aliquanto latius quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto tinctam: tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere; similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fovere: cæteraque eadem facere. Quod si caruncula increfcere cœperit, & febricula aut soluta fuerit, aut levior, & cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedat, in eodem medicamento erit 25 30

erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum, adjecto cerato ex rosa facto; quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebunt, eodem callo glutinantur. estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quæ exciso osse incre-
10 scit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, brevesque somni, & iidem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque alitur, & in cervicibus glandulæ
15 oriuntur, magni dolores sunt, cibique super hæc fastidium increscit; tum demum ad manum scalprumque veniendum est.

Duo vero sub ictu calvariæ pericula
20 sunt; ne vel findatur vel medium desidat. Si fissum est, possunt oræ esse compressæ: vel quia altera super alteram excessit; vel etiam, quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad mem-
25 branam quidem descendat, exitum vero non habeat; ac sic eam irriter, & graves inflammationes moveat.

At ubi medium os desedit, eandem cerebri membranam urget: interdum etiam
30 ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo, si ora alteri insedit, satis est id, quod
emi-

eminet, plano scalpro excidere. Quo sublato, si rima hiat aliquantum, curationi satis est. At, si oræ inter se comprimuntur, à latere ejus, interposito digiti spatium, terebra foramen faciendum est: ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus, ad similitudinem literæ Λ ; sic, ut vertex ejus à foramine, basis ad rimam sit.

Quod si rima longius patet, ab altero 10 foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita nihil latere sub eo osse confractum potest, abundeque exitus datur intus lædentibus. Ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est: sed, si verticem 15 perfractum est, & ab alio ex toto recessit, si circumpositæ calvariæ inhæret exigua parte, ab eo, quod naturaliter se habet, scalpro dividendum est. Deinde in eo, quod desedit, juxta rimam, quam fecimus, 20 foramina facienda sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat, imaque pars ejus intus ad fracturam, 25 cornua ad os integrum spectent. Deinde, si qua labant, & ex facili removeri possunt, forcipe ad id factum colligenda sunt, maximeque ea, quæ acuta membranam infestant. Si id ex facili fieri non potest, sub-30 jicienda lamina est, quam custodem ejus membranæ esse, proposui: & super eam, quicquid spinosum est, & intus eminet, exciden-

cidendum est. eadem lamina , quicquid
deorsum insedit, attollendum. Hoc genus
curationis efficit, ut , qua parte fracta ossa
5 tamen inhærent, solidentur : qua parte ab-
rupta sunt, sine ullo tormento sub medica-
mentis tempore excidant , spaciumque in-
ter hæc satis illis magnum ad extrahen-
dam saniem relinquatur , plusque in osse
10 propugnaculi cerebrum habeat , quam ha-
biturum fuit, eo exciso.

His factis, ea membrana acri aceto re-
spargenda est ; ut, siue aliquid sanguinis ex
ea profluit, cohibeatur , siue intus concre-
15 tus cruor remanet, discutiatur : tum idem
medicamentum eodem modo , qui supra
positus est, mollitum , ipsi membranæ im-
ponendum est : cæteraque eodem modo
facienda sunt, quæ ad linteolum illitum,
20 & lanam succidam pertinent: collocandus-
que is loco intepido : & curandum quoti-
die vulnus ; bis etiam , æstate.

Quod si membrana per inflammationem
intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si
25 usque eo tumebit , ut super ossa quoque
emineat,coercebit eam bene trita lenticu-
la, vel folia vitis contrita , & cum recenti
vel butyro, vel adipe anserino mixta : cer-
vixque molliri debebit liquido cerato , ex
30 irino facto. At, si parum pura membrana
videbitur , par modus ejus emplastri &
mellis miscendus erit ; idque superinfun-
dendum ; ejusque continendi causa unum

aut

aut alterum linamentum injiciendum ; & super linteolo , cui emplastrum illitum sit , contegendum. Ubi satis pura membrana est , eadem ratione adjiciendum emplastro 5 ceratum , ut carnem producat.

Quod ad abstinentioniam vero , & primos ulterioresque cibos potionesque pertinet , eadem , quæ in vulneribus præcepi, servanda sunt : eo magis , quo periculosius hæc 10 pars afficitur. Quinetiam , cum jam non solum sustineri , sed ali cibis quoque oportebit , tamen erunt vitanda , quæcunque mandenda sunt : item fumus , & quicquid excitat sternutamentum. Spem vero cer- 15 tam faciunt , membrana mobilis ac sui coloris , caro increscens rubicunda , facilis motus maxillæ atque cervicis. Mala signa sunt , membrana immobilis , nigra , vel livida ; vel aliter coloris corrupti , dementia , 20 acris vomitus , nervorum vel resolutio vel distentio , caro livida , maxillarum rigor , atque cervicis . Cætera , quæ ad somnum , cibi desiderium , febrem , puris colorem attinent , eadem , quæ in cæteris vulneri- 25 bus , vel salutaria , vel mortifera sunt.

Ubi bene res cedit , incipit ab ipsa membrana ; vel , si os eo loco duplex est , inde quoque caro increscens id , quod inter ossa vacuum est , replet : nonnunquam etiam 30 super calvariam excrescit. Quod si incidit , inspergenda squama æris est , ut id reprimat & cohibeat , eaque carni superdanda , quæ

quæ ad cicatricem perducant. Omnibusque ea locis commode inducitur, excepta
5 frontis ea parte, quæ paululum super id
est, quod inter supercilia est. Ibi enim
vix fieri potest, ut non per omnem ætatem
sit exulceratio: quæ linteolo, medica-
mentum habente, contegenda crit. Illa
10 utique, capite fracto, servanda sunt, ut,
donec jam valida cicatrix erit, vitentur
sol, ventus, frequens balneum, major vi-
ni modus.

C A P. V.

De Naso fracto.

15 **I**N naribus vero, & os, & cartilago
frangi solet, & quidem modo adversa,
modo à latere. Si adversa fracta sunt,
20 alterumve ex his, nares desidunt, difficul-
ter spiritus trahitur. Si à latere os fractum
est, is locus cavus est: si cartilago, in al-
teram partem nares declinantur.

Quicquid è cartilagine concidit, exci-
25 tandum leniter est, aut subjecto specillo,
aut duobus digitis utrinque compressis:
deinde in longitudinem implicata lina-
menta, & molli pellicula cincta circum-
sutaque, intus injicienda sunt; aut eodem
30 modo compositum aliquid ex arido peni-
cillo; aut grandis pinna, gummi, vel fabri-
li glutine illita, & molli pellicula circum-
data, quæ desidere cartilaginem non fi-
nunt. Sed, si adversa ea fracta est, æqua-

liter utraque naris implenda est. Si à latere, id, quod inseritur, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus jacet, ab altera tenuius. Extrinsicus autem circumdanda habena est mollis, medio illita mixtis inter se similia & thuris fuligine: eaque ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi glutin inhaerescit, &, cum induruit, nares commodè continet. Sin, quod intus inditum est, lædit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, exercitatae nares eadem tantummodo habena continendæ sunt: deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida; eaque tumens locus quotidie fovendus est.

Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque ubi adversum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi à latere, ea, in quam os impulsus est: imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increment. à tertio die fovendum id aqua calida est, tantoque magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus intrinsicè singula in suas sedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinsicè eadem habena, & super eam ceratum; neque ultra fascia adhibenda est.

At,

At, si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multos ex
5 vulnere feretur; vulsella vero extrahetur: finitisq; inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex iis, quæ leniter reprimunt. Pejus est, ubi aut ossi aut cartilagini fractæ cutis quoque vulnus accessit, id admodum raro fit. Si incidit, illa
10 quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt: cuti vero superimponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt:
15 sed insuper nullo vinculo deligandum est.

C A P. VI.

De Auribus fractis.

IN aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod si incidit, antequam pus
20 oriat, imponendum glutinans medicamentum est. sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac & in naribus ignorari non oportet; non
25 quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increescere, solidarique eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sinitur. Nunc autem de ea dico, quæ, cute integra, frangitur.
30 In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera parte cutis; & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est: deinde utendum est medicamento leniter sanguinem

supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat : tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne vitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subjicienda est, quæ, quod est inter hanc & caput, compleat : tum leniter ea deliganda est; & à tertio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinencia primis temporibus necessaria est, donec inflammatio finiatur.

C A P. VII.

De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. 15

AB his ad maxillam venturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os, modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum : atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta. quod gentis pessimum est : quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur ; & carnem vulnerant, interdum quoque nervum aut musculum. Quinetiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit : Maxillæ vero semper aliqua parte etiam vexata, ossa inter se cohærent.

Igi-

Igitur inprimis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore, & à mento, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt: deinde, si maxilla transversa fracta est (sub quo casu fere dens super proximum dentem excidit) ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes; aut, si hi labant, posteriores inter se seta deligandi sunt. id in alio
10 genere fracturæ supervacuum est, cætera eadem facienda. Nam linteolum duplex, madens vino & oleo, superinjiciendum est, cumque eo simila & thuris fuligo: deinde aut fascia, aut mollis habena, medio in longitudinem incisa, ut utrinque mentum
15 complectatur; & inde capita ejus supra caput adducta ibi ligentur.

Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit; famem primum esse necessariam: deinde, à die tertio, humidum cibum; sublata inflammatione, paulo plenior, eumque, qui carnem alat: vinum per omne tempus esse alienum. Deinde tertio die
20 solvi debere, foverique per spongiam vapore calidæ; eademque, quæ primo foverant, superdari: idem quinto die fieri, & donec inflammatio finiatûr; quæ vel nono die, vel septimo fere solvitur: ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum
30 loco suo non est, reponatur. neque id esse solvendum, nisi duæ partes ejus temporis, intra quod quæque ossa conferuntur, transferint.

Fere vero inter quartumdecimum & unum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, malæ, jugulum, pectus, latum os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta: inter vigesimum & trigessimum diem, crura, brachiaque: inter septimum & vigesimum & quadragesimum, humeri & femora.

Sed de maxilla illud quoque adjiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus sit. Atque etiam, cum tempus processit, in lagano similibusque aliis perseverandum est, neque quicquam edendum, donec ex toto maxillam callus firmaverit. Itemque, primis utique diebus, habendum silentium.

C A P. V I I I.

De Jugulo fracto.

20

IUGULUM vero, si transversum fractum est, nonnunquam per se recte coit., & , nisi movetur, sanari sine vincitura potest: nonnunquam vero, maximeque ubi motum est, elabitur; fereque id, quod à pectore est, super id, quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cujus ea ratio est, quod per se non movetur; sed cum humeri motu consentit. Itaque, eo consistente, super id humerus agitur. Raro vero admodum in priorem partem jugulum inclinatur; adeo ut magni professores nunquam se vidisse memoriæ mandaverint. Sed
locu-

locuples tamen ejus rei author Hippocrates est.

Verum , ut dissimilis uterque casus est ,
5 sic quædam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas jugulum tendit , simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est , & illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est , ipsum
10 quidem retro dandum , humerus autem in priorem partem adducendus est: ac, si is inferior est , non id ; quod à pectore est , deprimendum est, quia immobile est; sed humerus ipse attollendus ; sin autem superior
15 est, id, quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt , incidi contra cutis debet ; & ex ossibus ea , quæ carnem vulnerrant, præcidenda; tum retusa ossa commit-
20 tenda sunt ; si quod ab aliqua parte eminet , opponendum est triplex linteolum in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula factò canaliculo , eodemque intus incerato , ne fascia
25 diducatur. quæ jugulo composito circumdanda est sæpius potius , quam valentius. quod ipsum quoque in omnibus fractis perpetuum est. A dextro vero jugulo , si id fractum est, ad alam sinistram ; à sinistro, ad
30 dexteram , rursusque sub ala sua fascia dari debet: post hæc , si jugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus ; si in partem priorem, ad cervicem deligandum est:

supinusque homo collocandus. cætera eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt;

2. *De diversis ossium curis.*

Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur; ut malæ, pectus, latum os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem cura ratio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente, rimas quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, & os læsum esse, ex dolore colligimus; nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

C A P. IX.

20

De Costis fractis.

PROPRIE tamen quædam de costis dicenda sunt; quia juxta viscera sunt, & gravioribus periculis is locus expostus est. Costa igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars ejus, quæ rara est, lædatur: interdum sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam superat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter indolescit: sed abunde est eadem, quæ supra scrip-

scrip-

scripta sunt, facere; & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab uno vero & vigesimo
 5 die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibus uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quò melius os vestiatur: quod illo loco tenerum adhuc injuriæ sub tenui cute expositum est. Per
 10 omne autem tempus curationis, vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum movet: ne spiritum quidem magno-
 15 pere continere expedit.

At, si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graves inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo, si
 20 vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus, tamen sine ullo acri, ducenda est; diutiusque inedia pugnandum. Panis vero ante septimum diem non
 25 assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex lycio factum, cui cocta quoque resina adjecta sit, aut Polyarchi malagma; aut panni ex vino & rosa & oleo; superque imponenda lana
 30 succida mollis, & duæ fasciæ à mediis orfæ, minimeque adstrictæ. Multo vero magis omnia vitanda, quæ supra posui; adeo, ut ne spiritus quidem sæpius movendus
 sit.

fit. Quod si tussis infestabit, ad id potio
sumenda erit, vel extrixagine, vel ex ru-
ta, vel ex herba stœchade, vel ex cumino
& pipere. Gravioribus vero doloribus ur-
gentibus, cataplasma imponi quoque con-
veniet, vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pin-
guis fici tertia pars sit adjecta. Et id qui-
dem interdium superjacebit: noctu vero
idem aut ceratum, aut malagma, aut pan-
ni; quia potest cataplasma decidere. Ergo
quotidie quoque resolvetur, donec jam ce-
rato aut malagmate possimus esse contenti.
Et decem quidem diebus extenuabitur fa-
me corpus; ab undecimo vero ali incipiet.
ideoque etiam laxior, quam primo, fascia
sit, qua ligabitur. Fereque ea curatione ad
quadragesimum diem perveniet.

Sub qua si metus erit suppurationis, plus
malagma, quam ceratum ad digerendum
proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per
quæ supra scripta sunt, discuti potuerit; om-
nis mora vitanda erit, ne os infra vitietur:
sed, qua parte maxime tumebit, demitten-
dum erit candens ferramentum, donec ad
pus perveniat; idque effundendum. Si nus-
quam tumor se ostendit, ubi maxime pus
subsit, sic intelligemus. creta cimolia to-
tum locum illinemus, & siccare patiemur:
quo loco maxime humor intus persevera-
bit, ibi pus proximum erit; eoque uri de-
bebit. Si latius aliquid abscedet, duobus
aut tribus locis erit perforandum; demit-
ten-

tendumque linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit devinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, 5 quæ in cæteris adustis, facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, ali corpus debebit, ne tabes, pernicioſa futura, id malum subsequatur. Nonnunquam etiam, levius ipſo offe affecto, & inter initia neglecto, non pus, 10 ſed humor quidam mucco ſimilis, intus coit; molleſcitque contra cutis. In qua ſimili uſtione utendum eſt.

2. De Spina fracta.

In ſpina quoque eſt, quod proprie notemus. Nam ſi quid ex vertebra excidit, aut 15 aliquo modo fractum eſt, locus quidem concavus fit; punctiões autem in eo ſentiuntur: quia neceſſe eſt ea fragmenta ſpinofa eſſe. quo fit, ut homo in anteriorem 20 partem ſubinde nitatur. Hæc noſcendæ rei cauſa ſunt. Medicamentis vero iſdem opus eſt, quæ prima parte huius capitis expoſita ſunt.

C A P. X.

25 De Humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, vel evulſorum, communibus curationibus

30 S IMILES rurfus ex magna parte caſus curationeſque ſunt humeris & femoribus. Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis: ſiquidem ea minime periculofe media fran-

guntur : at, quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. nam & majores dolores adfert, & difficilius curatur. Earum maxime tolerabilis est simplex, eaque transversa : peior, ubi obliqua, atque ubi fragmenta : pessima, ubi eadem acuta sunt. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo saepius excidunt, aliudque super aliud effertur. idque ante omnia considerari debet: & sunt notæ certæ. Si suis sedibus sunt mota, resima, punctiōisque sensum repræsentant, & tactu inæqualia sunt. Si vero non adversa, sed obliqua junguntur (quod fit, 15 ubi loco suo non sunt) membrum id altero latere brevius est, & muscoli ejus tument.

Ergo, si hoc deprensus est, protinus id membrum oportet extendere. Nam nervi musculique, intenti per ossa, contrahuntur: neque in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile, & periculose, vis nervis adhibetur. nam distentio nervorum vel cancer sequitur; vel certe, cum mitissime agitur, pus. itaque, si ante reposita ossa non sunt, post eam reponenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quodque membrum, si adhuc tenerum est, etiam 30 unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diversa contenta.

tendant. Si firmiores nervi sunt, ut in viris robustis, maximeque eorum feminibus & cruribus evenit; habenis quoque, vel lineis fasciis utrinque capita articulorum deliganda, & per plures & in diversa duenda sunt. Ubi vero paulo longius, quam naturaliter esse debet, membrum vis fecit; tum demum ossa manibus in suam sedem
10 compellenda sunt: indiciumque ossis repositi est dolor sublatus. At membrum alteri æquatum, involvendum duplicibus triplicibusve pannis in vino & oleo tinctis: quos lineos esse, commodius est.

15 Fere vero fasciis sex opus est. Prima brevissima adhibenda: quæ circa fracturam ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochleam serpat; satisque est, eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio
20 longior ea: quæ, si qua parte os eminet, ab ea, si totum æquale est, undelibet super fracturam incipere debet, priori adversa, deorsumque tendere; atque iterum ad fracturam reversa, in superiore parte ultra prior
25 rem fasciam desinere. Super has injiciendum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat. Ac, si qua parte os eminet, triplex ei pannus objiciendus, eodem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia compre
30 hendenda sunt, quartaque, sic, ut semper insequens priori adversa sit, & tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore finiant: quia satius est sæpius circuire, quam

quam adstringi : siquidem id , quod adstringitur est , alienatur , & cancro opportunum est. Articulum autem quamminime vincire opus est : sed , si juxta hunc os fractum est , necesse est.

Deligatum vero membrum in diem tertium continendum est. Eaque vinctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit ; secundo laxior ; 10 tertio jam pene resoluta. Ergo tum rursum id membrum deligandum , adjiciendaque prioribus quinta fasciâ est , iterumque quinto resolvendum est , & tum sex fasciis involvendum, sic , ut tertia & quinta 15 infra, cæteræ supra finiantur. Quotiescunque autem solvitur membrum , calida aqua fovendum est. Sed , si juxta articulum fractura est , diu instillandum vinum est , exigua parte olei adjecta, eademque omnia faci- 20 cienda, donec ab eo inflammatio solvatur, vel tenuius quoque , quam ex consuetudine , id membrum fiat. quod si septimus dies non dedit , certe nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur. 25

Rursus ergo , si parum commissa sunt , committi debent : si qua fragmenta eminent , in suas sedes reponenda sunt : deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæque superaccommodandæ sunt, quæ fissæ 30 circumpositæque ossa in sua sede contineant : & , in quam partem fractura inclinat , ab ea latior valentiorque ferula imponen-

ponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra adstringi, quam ut ossa contingant: & cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coartari; ac, si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duæ partes ejus temporis, quos quodque confervet, compleantur: postea levius aqua calida fovere, quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Ergo cerato quoque liquido id leniter est unguendum, perfricandaque summa cutis est; laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua, cætera eadem fiant; tantummodo singulæ fasciæ, quoties resolutæ fuerint, subtrahantur.

2. *De Humero fracto.*

Hæc communia sunt: illa propria, Siquidem humerus fractus est, non sic, ut membrum aliud, intenditur: sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus. Una autem fascia, brachium amplexa, ex cervice ipsius, qui læsus est, id sustinet: altera, ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum: tertia vincto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus ejus inter se vinctis. Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, demissum inter femi-

femina ejus, qui curatur, baculum tenet: medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, plantam injicit dextram, si sinister, sinistram, si dexter humerus curatur; simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut inum os fractum est, brevioribus opus est; si summum, longioribus: ut 10 ab eo sub altera quoque ala per pectus ad scapulas porrigantur. Protinus vero brachium, cum deligatur, sic inclinandum est, ut id, quod afficitur, ante fasciis quoque sic figuratum sit, ne postea suspensum aliter, 15 atque cum deligabatur, humerum inclinet: brachioque suspenso, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. per quæ fit, ut minime moveatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. 20 Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent: à lacerto breviores; sed sub ala brevissimæ. Sæpiusque resolvendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi ri- 25 gescant, & inutile brachium efficiatur. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida fovendus, & molli cerato perfricandus; ferulæque vel omnino non imponendæ contra eminenti- 30 cubiti, vel aliquanto breviores sint.

3. De Brachio fracto.

At, si brachium fractum est, in primis
confi-

considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente: deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. nam, ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet, paululum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit: idque involutum mittella commodissime excipitur. quæ latitudine ipsa brachio, perangustis capitibus collo injicitur: atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

4. *De Cubito fracto.*

Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est. sit enim brachium immobile. Ac, si nihil aliud quam dolori occurrendum est, idem, qui fuit, ejus usus est.

5. *De Cruribus Femoribusque fractis.*

In crureæque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habere debet,

bet, per quæ, si quis humor excesserit descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus cava, per quæ loris datis, moræ quædam crus femurque, ut collocatum est, detineant. Esse etiam is debet, à planta, si crus fractum est, circa poplitem; si femur, usque ad coxam; si juxta superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa insit. 10 Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri brevius; quia nunquam in antiquum statum revertitur: summisque digitis postea cruris ejus insisti, ex quo multa debilitas est; fœdior tamen, ubi fortunæ negligentia quoque accessit. 15

6. De Digito fracto.

Digitum satis est ad unum surculum deligari post inflammationem. 20

7. Communes curationes ad humeros, brachia.

Crura, femina, digitosque confractos pertinentes.

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus ista communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum jam 25 increfcere callum oportet, liberalius alimentum: longa à vino abstinencia: fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio est, liberale; cum ea defuit, modicum: tum 30 etiam longior ulterioribus, è liquido cerato, membris, & mollis tamen unctio. Nec protinus exercendum id membrum, sed pau-

paulatim ad antiquos usus reducendum est.

- Gravius aliquanto est, cum ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit; maximeque, si id musculi femoris aut humeri fenserint. nam & inflammationes multo graviores, & promptiores cancos habent. Ac femur quidem, si ossa inter se cesserunt, fere præcidi necesse est. Humerus vero
10 quoque in periculum venit; sed facilius conservatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod juxta ipsos articulos ictum est. Igitur curiosius id agendum est, & per mediam plagam musculus trans-
15 versus præcidendus: sanguis vero, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia in decimum diem extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, & lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt:
20 his vero neque intendi nervos, neque ossa tractari, satis expedit. ipsique homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat, quemadmodum minimum læduntur. Omnibus autem his vulneribus imponendum
25 primo linamentum ex vino madens, cui rosæ paulum admodum adjectum sit: cæteræ eadem. Deliganda fasciis sunt, aliquanto, quam vulnus, laxioribus; scilicet laxius, quam si ea plaga non esset, quantoque faci-
30 lius & alienari & occupari cancro vulnus potest. numero potius fasciarum id agendum est, ut laxæ quoque æque contineant.

Quod in femore humerove sic fiet, si
ossa

ossa forte recte concurrerint : sin aliter se habebunt, catenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamentum con-
 rineat. Cætera eadem, quæ supra scripsi, 5
 facienda sunt. præterquam quod neque se-
 rulis, neque canalibus, inter quæ vulnus
 sanescere non potest ; sed pluribus tan-
 tummodo & latioribus fasciis opus est :
 ingerendumque subinde in eas est calidum 10
 oleum, & vinum ; magisque hoc. In prin-
 cipio fame utendum ; vulnus calida aqua
 fovendum ; frigusque omni ratione vitan-
 dum est, & transeundum ad medicamen-
 ta, quæ puri movendo sunt. Majorque 15
 vulneri, quam ossi cura adhibenda. ergo
 quotidie solvendum nutriendumque est.

Inter quæ si quod parvulum fragmen-
 tum ossis eminet, id, si retusum est, in
 suam sedem dandum : si acutum, ante acu- 20
 men ejus, si longius est, præcidendum, si
 brevius, limandum, & utrunque scalpro
 lævandum : tum ipsum recondendum est.
 ac, si id manus facere non potest, vulsella
 quali fabri utuntur, injicienda est acutæ 25
 ossis prominentis cuspidi, ab ea parte, qua
 sima est ; ut ea parte, qua gibba est, emi-
 niens os in suam sedem compellat. Si id ma-
 jus est, membranulisque cingitur, sinere
 oportet has sub medicamentis resolvi, id- 30
 que os, ubi jam nudatum est, abscindere ;
 quod maturius scilicet faciendum est. po-
 testque ea ratione & os coire, & vulnus
 sanescere.

sanescere : illud suo tempore ; hoc , prout se habet.

Nonnunquam etiam in magno vulnere
 5 evenit , ut fragmenta quædam velut emo-
 riantur , neque cum cæteris cocant quod
 hic quoque ex modo fluentis humoris col-
 ligitur. Quo magis necessarium est, sæpius
 ulcus resolvere , quam nutrire : sequitur-
 10 que fere , ut id os per se post aliquot dies
 excidat ; aut , cum jam ante misera con-
 ditio vulneris sit, tamen id interdum majus
 diuturniusque faciat. Sæpe etiam integra
 cute os abrumpitur , protinusque prurigo
 15 & dolor oritur. Quare solvere , si accidit,
 maturius oportet , & fovere aqua , per
 æstatem , frigida ; per hiemem , egelida :
 deinde ceratum myrteum imponere.

Interdum fractura quibusdam velut acu-
 20 leis carnem vexat. Quo à prurigine &
 punctiõibus cognito, aperire id medicus,
 eosque aculeos præcidere necesse habet.
 Reliqua vero curatio in utroque hoc casu
 eadem est, quæ, ubi plagam ictus proti-
 25 nus intulit. Puro jam ulcere, cibus his
 quoque utendum est carnem producenti-
 bus. Si brevius adhuc membrum est , &
 ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis &
 lævissimi generis inter ea demitti debet ,
 30 sic, ut capite paululum emineat ; isque quo-
 tidie plenior adigendus est, donec par id
 membrum alteri fiat. Tum paxillus remo-
 vendus , vulnusque sanandum est. Cicatrix
 vero

vero inducta fovenda aqua frigida est, in qua myrtus, hederæ, aliæve similes verbenæ decoctæ sint: illinendumque medicamentum, quod siccet. & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur.

Si quando vero ossa non conferbuerunt, quia sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est. possunt enim coire. 10 Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur: ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur, & si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. magna tamen 15 cura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum vino fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua, in qua verbenæ, 20 de quibus supra dixi, decoctæ sint: quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ: cætera, & ante, & post, eadem facienda, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum adversa inter se ossa confervere: 25 eoque & brevius membrum, & indecorum fit; & si capita acutiora sunt, assidue puncturæ sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa id membrum fo- 30 vetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter hæc, medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus

bus ea diducit, compellitque id, quod
eminet, in suam sedem: &, si parum va-
luit, ab ea parte, inquam os se inclinat,
5 involutam lana regulam objicit; atque ita
deligando, assuescere iterum vetustæ sedi
cogit.

Nonnunquam autem recte quidem ossa
conferbuerunt, superincrevit vero ni-
10 mius callus; ideoque locus intumuit. Quod
ubi incidit, diu leniterque id membrum
perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro;
multumque aqua calida salsa fovendum; &
imponendum malagma, quod digerat;
15 adstrictiusque alligandum: oleribusque,
& præterea vomitu utendum per quæ cum
carne callus quoque extenuatur: confert-
que aliquid de sinapi cum ficu in alterum
pariter membrum impositum, donec id
20 paulum erodat, eoque evocet materiam.
Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad
ordinem vitæ revertendum est.

C A P. X I.

De Ossibus luxatis.

25 **A**c de fractis quidem ossibus hæcenus
dictum sit. Moverentur autem ea sedi-
bus suis duobus modis. Nam modo,
quæ juncta sunt, inter se dehiscunt: ut cum
30 latum os scapularum ab humero recedit; &
in brachio, radius à cubito; & in crure, tibia
à fura; &, interdum saltu, calcis os à talo;
quod raro tamen fit: modo articuli suis se-
dibus

dibus excidunt. Ante de prioribus dicam.

Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus est, depressusque digitus sinum invenit. deinde gravis inflammatio oritur; 5 atque in talo præcipue: siquidem febres quoque, & caneros, & nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quotum vitandorum causa, facienda eadem sunt, quæ 10 in ossibus mobilibus læsis. Atque id ubi incidit, protinus his locis imponenda, quæ supra proposita sunt, ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam diducta ossa nunquam rursus inter se junguntur: &, ut ali- 15 quid decoris eo loco, sic nihil usus admittitur.

Maxilla vero & vertebræ omnesque articuli, cum validis nervis comprehenduntur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo ca- 20 su nervis vel ruptis, infirmatis; faciliusque in pueris & adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elabuntur in priorem & in posteriorem, in anteriorem & in 25 anteriorem partem: quidam omnibus modis, quidam certis. Suntque quædam communia omnium signa, quædam propria cujusque. siquidem semper ea parte tumor est, in quam os prorumpit; ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem in omnibus de- 30 prehenduntur, alia vero in singulis. quæ, simulatque de quoque dicam, proponenda erunt.

Sed

Sed ut excidere omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim nunquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quæ, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. Ac, quibus
10 in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam cæteri crescunt: omniumque, quæ loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam ulteriore. utputa, si humerus loco
15 suo non est, major in eo ipso fit macies, quam in brachio; major in hoc, quam in manu. Tum pro sedibus, & pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus membri relinquitur: quoque
20 in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur.

Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, laceſſen-
25 dum non est: ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & nervorum habitus. Nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponi-
30 tur; sed & multo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent: sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt.

Oportet autem ipsam inflammationem levare, succida lana ex aceto superimposita: à cibo, si valentioris articuli casus est, triduo; interdum etiam quinque diebus abstinere: bibere aquam calidam, dum sitis finiatur: curiosiusque hæc facere, his ossibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si vero etiam febris accessit, multo magis: deinde die quinto fovere ex aqua calida; remotaque lana, ceratum imponere ex cyprino factum; nitro quoque adjecto, donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infractionem ei membro adhibere: cibis uti bonis; uti vino modice: jamque ad usus quoque suos id membrum promovere quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt: nunc de singulis dicam.

CAP. XII.

De Maxilla luxata.

MAXILLA in priorem partem propellitur, sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa mentumque inclinatur: dentes paribus non respondent; sed sub his, qui secant, canini sunt. At, si utraque, totum mentum inclinatur, & in exteriori rem partem promovetur; inferioresque dentes longius, quam superiores excedunt; intentique temporum muscoli apparent.

parent, Primo quoque tempore homo in
 sedili collocandus est, sic, ut minister à
 posteriore parte caput ejus contineat, vel
 sic, ut juxta parietem is sedeat, subiecto
 inter parietem & caput ejus scorteo pulvi-
 no duro, eoque caput per ministrum urge-
 atur, quo sit immobilius. tum medici di-
 giti pollices; linteolis vel fasciis, ne dila-
 10 bantur, involuti in os ejus conjiciendi,
 ceteri extrinsecus admovendi sunt. ubi
 vehementer maxilla apprehensa est, si una
 parte procidit, concutiendum mentum,
 & ad guttur adducendum est: tunc simul
 15 & caput adprehendendum, &, excitato
 mento, maxilla in suam sedem compellenda,
 & os ejus comprimendum est, sic,
 ut omnia pene uno momento fiant. Sin
 utraque parte prolapsa est, omnia eadem
 20 facienda; sed æqualiter retro est maxilla
 agenda. Reposito osse, si cum dolore o-
 culorum & cervicis iste casus incidit, ex
 brachio sanguis mittendus est. Cum om-
 nibus vero, quorum ossa mota sunt, pri-
 25 mo liquidior cibus conveniat, tum his
 præcipue: adeo ut sermo quoque frequens,
 motu oris temporum nervos lædat.

C A P. X I I I.

De Capite luxato.

30 **C**APUT duobus processibus in duos si-
 nus summæ vertebræ demissis super
 cervicem contineri, in prima parte

proposui. Hi processus interdum in posteriore partem excidunt : quo fit , ut nervi sub-occipitio extendantur , & mentum pectori adglutinetur , neque bibere is , neque loqui possit , interdum sine voluntate semen emittat. quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi , non quo curatio ejus rei ulla sit ; sed ut res indicibus cognosceretur , & non putarent sibi medicum defuisse , si qui sic aliquem perdidissent.

CAP. XIV.

De Spina luxata.

ID E M casus manet eos quorum in spina vertebræ exciderunt. Id enim non potest fieri , nisi & medulla , quæ per medium ; & duabus membranulis , quæ per duos à lateribus processus feruntur ; & nervis , qui continent , ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem , & in priorem ; & supra septum transversum , & infra. Si in utramvis partem exciderint , à posteriore parte vel tumor , vel sinus erit. Si super septum id incidit , manus resolvuntur , vomitus , aut distentio nervorum sequitur , spiritus difficulter movetur ; dolor urget , & aures obtusæ sunt. Si sub septo , femina resolvuntur , urina supprimitur , interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi casibus , ut tardius , quam ex capitis , sic tamen intra triduum

duum homo moritur. Nam, quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, pronum hominem collocandum esse, & extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, & intus impellere: in his accipiendum est, quæ paululum excefferunt; non in his, quæ toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis non exciderit vertebra, paululum tamen in priorem partem promineat. id non jugulat. Sed ab interiore parte non contingit quidem propelli. Ab exteriore si quid propulsum est, plerunque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis destituta est.

CAP. XV.

De Humero luxato.

20

HUMERUS autem modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est, ei junctus cubitus recedit ab latere, sursumque ad ejusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen, quam naturaliter; difficilisque in priorem partem quam in posteriorem cubitus porrigitur.

Igitur, si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certe imbecilibus nervis intentum est, satis est,

collocare id in sedili; & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat; alteri, ut brachium extendat: ipsum posteriore parte recidentem, humerum genu sub ala ejus cogere, simulque & latum os, & altera manu brachium ejus ad latus impellere.

At si vastius corpus, nervive robustiores sunt, necessaria est spatha lignea, quæ & ro-
 crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala usque ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum; ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit: in-
 que ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quæ lora mollia conjiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo manus tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur, sic, ut caput ejus summæ²⁰ alæ subjiciatur: deinde, loris suis ad brachium deligatur; uno loco, paulum infra humeri caput; altero, paulum supra cubitum; tertio, supra manum. cui rei protinus intervalla tunc quoque foraminum aptata²⁵ sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum trajicitur, ita altæ, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur: eoque fit, ut³⁰ capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas esse alias rationes scire

scire facile est uno Hippocrate lecto ; sed non alia magis usu comprobata est.

At, si in partem priorem humerus incidit, supinus homo collocandus ; fasciaque, aut habena, media ala circumdanda est, capitaque ejus post caput hominis ministro tradenda ; brachium alteri ; præcipiendumque, ut ille habenam, hic brachium extendat : deinde medicus, caput quidem hominis sinistra debet repellere ; dextra vero cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere. faciliusque id in hoc casu, quam in priore revertitur. Re-
15 posito humero, lana ala subjienda est ; si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur ; si in priore, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta, caput ejus debet comprehendere, deinde
20 per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad ejusdem humeri caput tendere, sæpiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinc-
25 ctus hac ratione humerus commodius continetur, si adductus ad latus sit, & ad id quoque fascia deligetur.

C A P. XVI.

De Cubito luxato.

30 **I**N cubito autem tria coire ossa, humeri, & radii, & cubiti ipsius, ex his, quæ prima parte hujus voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui annexus humero est, ab hoc excidit, radius,

B b 4

qui

qui adjunctus est, interdum distrahitur, interdum subsistit. In omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest: sed, si in priorem prolapsus est, extentum brachium est, neque recurvatur: si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est; interdum febrem, vomitumque bilis movet: si in exteriorem, interioremve, brachium porrectum est, sed paululum in eam partem, à qua os recessit, recurvatur.

Quicquid incidit, reponendi ratio una est (neque in cubito tantum, sed in omnibus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa junguntur) utrumque membrum in diversas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit; tum id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsus est, in contrarium impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illuc se dederunt. Ac modo manibus solis utendum est, modo quædam alia adhibenda.

Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis adjectis, satis est: deinde rotundum aliquid, à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ, fracto humero
supra

supra posita est, & tum ossa reponere.

Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum sæpiusque id resolvendum est; multoque magis aqua calida fovendum, & diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, siue extra remanlit, siue intus revertit, callus circumdatur, isque, si per quietem increvit, flexus illius postea prohibet.

CAP. XVII.

De Manu luxata.

MANUS quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad minimum digitum convertitur, & reponi non difficillime potest. Super locum autem durum & renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic, ut prona sit, si in posteriorem partem excidit; supina, si in priorem; si in interiorem, exterioremve, in latus. Ubi satis nervi ducti sunt, si usque in alterutrum latus procidit, manibus in contrarium repellendum est. At his, quæ in priorem posterioremve partem prolapsa sunt, superimponendum aliquid durum, idque supra prominens os manu urgendum est, per quod os vis adjecta facilius in suam sedem compellit.

C A P. XVIII.

De Palma luxata.

IN palma quoque ossa interdum suis sedibus promoventur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moveri, paribus ossibus oppositis, non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est: tumor ab ea parte, in quam os venit: sinus ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione, digito tantummodo bene pressum os in suam sedem revertitur.

C A P. XIX.

De Digitis luxatis.

AT in digitis totidem fere casus, eademque signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æque 20 vi opus est; quod articuli breviores, & nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt; tumque palma compelli: ut ita in 25 locum, unde lapsus est digitus, restituatur.

C A P. XX.

De Femore luxato.

CUM de humeris dixerim; de his quoque, quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem in hoc casu quadam similitudo est femori & humero. tibia

tibiæ & cubito, pedi & manui. quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt.

Femur in omnes quatuor partes promovetur : sæpiſſime in interiorem ; deinde in anteriorem ; raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapſum eſt, crus longius altero & valgius eſt : extra enim pes ultimus ſpectat. Si in
10 anteriorem, brevius, varumque fit, & pes intus inclinatur; calx ingreſſu terram non contingit, ſed planta ima; meliusque id crus ſuperius corpus, quam in priore caſu, fert, minusque baculo eget. Si in priorem,
15 crus plicari non poteſt, extenſumque alteri cruri ad calcem par eſt; ſed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc caſu præcipuus eſt; & maxime urina ſupprimitur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur,
20 rectusque eorum pes eſt. Si in posteriorem, extendi non poteſt crus, breviusque eſt; ubi conſiſtit, calx quoque terram non contingit.

25 Magnum autem femori periculum eſt, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam ſemper iterum excidere contendunt: ſed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Hera-
30 clides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto ſe reſtituiſſe memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad extendendum in hoc caſu

femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est; sic illud verum: cum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere, ut reponatur: si non habent, repositum non continere.

Tentandum igitur est, &, si tenerius ¹⁰ membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi: si validius, melius adducent, qui eandem habenas ad valida bacula deligarint; tumque eorum fustium imas partes oppositæ moræ ¹⁵ objecerint, superioresque ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur: qui, ut in torcularibus, con- ²⁰ versi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus, sic, ut semper ea pars superior ²⁵ fit, in quam os prolapsus est; ea etiam inferior, à qua recessit. Nervis extensis, si in priorem partem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum; subitoque super id genu adducendum est eodem mo- ³⁰ do, eademque de causa, qua idem in brachio fit, protinusque, si complicari femur potest, intus est.

In cæteris vero casibus, ubi ossa paululum inter se recesserunt, medicus debet id, quod eminet, retro cogere; minister 5 contra coxam propellere. Reposito osse, nihil novi aliud curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si motum femur fuerit adhuc laxioribus nervis, rursus erumpat. Potest tamen conditus articulus 10 medius aut summus canaliculo aliquo contineri.

C A P. XXI.

De Genu luxato.

15 **G**ENU vero & in anteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere, notissimum est. In priorem non prolabi, plerique scripserunt. potestque id vero proximum esse; cum ibidem 20 opposita patella, ipsa quoque caput tibiæ contineat. Meges tamen eum, cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse, memoriæ prodidit.

In his casibus intendi nervi rationibus 25 iisdem, quas in femore retuli, possunt. Et id quidem, quod in posteriorem partem excidit eodem modo rotundo aliquo super popliteum imposito, adductoque eo crure, reconditur. Cæteræ vero manibus simul, tum 30 ossa in diversas partes compelluntur.

C A P. XXII.

De Talo luxato.

TALUS quidem in omnes partes prola-
bitur. Ubi in interiorē partē ex-
cidit, ima pars pedis in exteriorē
partē convertitur. Ubi huic contrarius
casus, contrarium etiā signum est. At, si in
priorē partē prorumpit, à posteriore 10
latus nervus durus & intentus est; simul-
que iis pes est. Si in posteriorē, calx pene
conditur, planta major sit. Reponitur au-
tem is quoque per manus; prius in diversa
pede & crure diductis. Et in hoc quoque 15
casu diutius in lectulo perseverandum est;
ne is talus, qui totum corpus sustinet, pa-
rum confirmatis nervis, ferendo oneri ce-
dat, rursusque prorumpat. Calceamentis
quoque humilioribus primo tempore 20
utendum; ne vinctura talum ipsum lædat.

C A P. XXIII.

De Planta luxata.

PLANTARVM vero ossa iisdem modis, 25
quibus in manibus, prodeunt; iisdem-
que conduntur. Fascia tantummodo
calcem quoque debet comprehendere: ne,
cum mediā plantam, in unquē ejus vin-
ciri necesse est, liber talus in medio reli- 30
ctus, materiam pleniorē recipiat, ideo-
que suppuret.

C A P. XXIV.

De Digitis luxatis.

5 **I**N digitis nihil ultra fieri debet, quam quod in his, qui sunt in manu, positum est.

C A P. XXV.

10 *De his, quæ cum vulnere loco moventur.*

Hæc facienda sunt in his casibus, ubi sine vulnere ossa exciderunt: sæpe tamen cum vulnere loco moventur. Hic vero & ingens periculum est, & eo
 15 gravius, quo majus membrum est, quoque validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoque ab humeris, femoribusque, metus mortis est; ac, si reposita ossa sunt, spes nulla est: non repositis tamen, nonnul-
 20 lum periculum est. Eoque major in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Nam Hippocrates nihil tuto reponi posse, præter digitos, & plantas, & manus, dixit: atque in his quoque diligenter esse a-
 25 gendum, ne præcipitentur ægri. Quidam brachia quoque & crura reposuerunt: & ne cancri, distentionesque nervorum orirentur (sub quibus in ejusmodi casu fieri solet mors matura) sanguinem ex brachio mis-
 30 runt. Verum ne digitus quidem (in quo minimum, ut malum, sic etiam periculum est) reponi debet aut in inflammatione, aut postea, cum jam vetus res est. Si quoque, repo-

reposito osse, nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est.

Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic jacere convenit, ut maxime cubantem juvat: tantum ne moveatur, neve dependeat. In omni tali morbo magnum ex longa fame præsidium est: deinde ex curatione eadem, quæ proposita est. Ubi ossibus fractis vulnus accessit, si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. ideo, quod excedit, abscindendum est; imponendaque super arida linamenta sunt, & medicamenta non pingua; donec, quæ saltem esse in ejusmodi re sanitas potest, veniat. nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est facile noxæ postea pateat.

F I N I S.



.INDEX

INDEX CAPITUM

IN

A. CORNEL. CELSUM.

LIB. I. PRÆFATIO, pag. 1.

C A P. I.



Uemadmodum sanos agere conveniat.
pag. 21.

Cap. 2. *Qua imbecillis servanda sint.*
p. 23.

Cap. 3. *Observationes quadam, prout res novæ in-
cidunt, & corporum genera, & sexus, & æta-
tes, & tempora anni sunt.* p. 26.

Cap. 4. *De his, quibus caput infirmum est.* p. 36.

Cap. 5. *De his, qui lippitudine, gravedine, de-
stillatione, consillisque laborant.* p. 38.

Cap. 6. *Ad solutam alvum remedia.* p. 39.

Cap. 7. *Remedia ad Coli dolorem.* p. 40.

Cap. 8. *Qua agenda sint stomacho laborantibus.*
p. 40.

Cap. 9. *Quid observandum sit dolore nervorum la-
borantibus.* p. 41.

Cap. 10. *Observatio in pestilentia.* p. 43.

Lib. 2. Præfatio. pag. 44.

Cap. 1. *Qua anni tempora, qua tempestatum gene-
ra, quæ partes ætatis, qualia corpora vel ætia
vel morbis opportuna sint, & quod valetudi-
nis genus in quoque timeri possit.* pag. 45.

Cap. 2. *De signis adversa valetudinis futura.* p. 51.

Cap. 3. *Qua bona in agrotantibus signa sint.* p. 52.

Cap. 4. *Mala signa agrotantium.* p. 54.

Cap. 5. *De signis longa valetudinis.* p. 56.

Cap. 6. *De indiciis Mortis.* p. 57.

Cap. 7. *De notis, quas aliquis in singulis morbo-
rum generibus habere possit.* p. 61.

Cap. 8.

INDEX CAPITUM.

Cap. 8. <i>Quæ nota in quoque morbi genere vel spem vel pericula ostendant.</i>	p. 70
Cap. 9. <i>De Morborum curationibus.</i>	p. 81.
Cap. 10. <i>De sanguinis detractiõne per vènas</i>	p. 82.
Cap. 11. <i>De sanguinis detractiõne per cucurbitulas.</i>	p. 88.
Cap. 12. <i>De dejectione.</i>	p. 89.
Cap. 13. <i>De vomitu.</i>	p. 92.
Cap. 14. <i>De frillione.</i>	p. 93.
Cap. 15. <i>De gestatione.</i>	p. 96.
Cap. 16. <i>De abstinencia.</i>	p. 98.
Cap. 17. <i>De sudore.</i>	p. 99.
Cap. 18. <i>Qui cibi potionesve, aut valentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint.</i>	p. 102.
Cap. 19. <i>Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit, quæ vescimur.</i>	p. 107.
Cap. 20. <i>De his, quæ boni succi sunt.</i>	p. 107.
Cap. 21. <i>De his, quæ mali succi sunt.</i>	p. 108.
Cap. 22. <i>Quæ res lenes, quæve acres sint.</i>	p. 109.
Cap. 23. <i>De his, quæ crassiorem, quæve tenuiorem pituitam faciunt.</i>	p. 109.
Cap. 24. <i>De his, quæ stomacho idonea sunt.</i>	p. 109.
Cap. 25. <i>Quæ res aliena stomacho sunt.</i>	p. 110.
Cap. 26. <i>De his, quæ inflant.</i>	p. 111.
Cap. 27. <i>De his, quæ calefaciunt, aut refrigerant.</i>	p. 112.
Cap. 28. <i>De his, quæ intus facile corrumpuntur.</i>	p. 112.
Cap. 29. <i>De his, quæ alvum movent.</i>	p. 113.
Cap. 30. <i>De his, quæ alvum adstringunt.</i>	p. 113.
Cap. 31. <i>De his, quæ urinam movent.</i>	p. 114.
Cap. 32. <i>De his, quæ ad somnum apta sunt.</i>	p. 115.
Cap. 33. <i>De his, quæ materiam evocant.</i>	p. 115.

L I B. 3.

Cap. 1. <i>De morborum generibus.</i>	pag. 117.
Cap. 2. <i>Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an minuantur; & quæ ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.</i>	p. 119.
Cap. 3.	

INDEX CAPITUM.

Cap. 3. De febrinum generibus.	p. 122.
Cap. 4. De Curationum diversis generibus.	p. 124.
Cap. 5. De febrinum speciebus & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.	p. 131.
Cap. 6. Quando potiones febricitantibus dari expediat.	p. 135.
Cap. 7. Quomodo pestilentes febres curari debeant.	p. 141.
Cap. 8. Curatio Semitertiana febris, quae huiusmodi dicitur.	p. 144.
Cap. 9. Curatio lentarum februm.	p. 144.
Cap. 10. Remedia in febribus ad capitis dolorem, & praecordiorum inflammationem, & ariditatem & scabritiem lingua.	p. 146.
Cap. 11. Remedia contra frigus, quod febrem praecedat.	p. 148.
Cap. 12. Curatio horroris in febribus.	p. 149.
Cap. 13. Curatio quotidiana febris.	p. 151.
Cap. 14. Curatio tertiana febris.	p. 151.
Cap. 15. Curatio quartana febris.	p. 153.
Cap. 16. Curatio duarum quartanarum.	p. 155.
Cap. 17. Curatio quotidiana febris, quae ex quartana facta sit.	p. 156.
Cap. 18. De tribus insaniae generibus: & primo de ejus curatione, quae à grecis <i>Opvitis</i> dicitur.	p. 156.
Cap. 19. De Cardiacis.	p. 165.
Cap. 20. De lethargicis.	p. 167.
Cap. 21. De hydropicis.	p. 169.
Cap. 22. De tæbe, & ejus speciebus.	p. 176.
Cap. 23. De comitiali morbo.	p. 182.
Cap. 24. De Regio morbo.	p. 185.
Cap. 25. De Elephantia.	p. 186.
Cap. 26. De Attonitis.	p. 188.
Cap. 27. De resolutione nervorum.	p. 188.

INDEX CAPITUM.

LIB. 4.

Cap. 1. De humani corporis interioribus sedibus.	p. 192.
Cap. 2. De curationibus morborum, qui nascuntur à Capite.	p. 197.
Cap. 3. De morbo, qui circa faciem nascitur.	p. 200.
Cap. 4. De resolutione lingua.	p. 201.
Cap. 5. De distillatione ac gravedine.	p. 202.
Cap. 6. De Cervicis morbis.	p. 204.
Cap. 7. De faucium morbis: & primum de angina.	p. 207.
Cap. 8. De stomachi morbis.	p. 217.
Cap. 9. De laterum doloribus.	p. 221.
Cap. 10. De viscerum morbis, & primo, de pulmone.	p. 223.
Cap. 11. De hepaticis.	p. 225.
Cap. 12. De lienosis.	p. 227.
Cap. 13. De Renum morbis.	p. 229.
Cap. 14. De intestinorum morbis: & primo de cholera.	p. 230.
Cap. 15. De Celiacæ ventriculi dolore.	p. 232.
Cap. 16. De tenuioris intestini morbo.	p. 234.
Cap. 17. De morbo intestini plenioris.	p. 236.
Cap. 18. De torminibus.	p. 237.
Cap. 19. De lavisate intestinorum.	p. 239.
Cap. 20. De lumbricis alvum occupantibus.	p. 240.
Cap. 21. De tenesmo.	p. 241.
Cap. 22. De ventris fluxu.	p. 242.
Cap. 23. De vulvæ morbo.	p. 246.
Cap. 24. De seminis nimia ex naturalibus profusione.	p. 248.
Cap. 25. De Coxarum morbis.	p. 249.
Cap. 26. De Genuum dolore.	p. 250.
Cap. 27. De Manuum & pedum articulorumque vitiis.	p. 251.
Cap. 28. De Refectione convalescentium à morbo.	p. 254.

Lib.

INDEX CAPITUM.

Lib. 5. Præfatio pag. 255.

- Cap. 1. De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta sunt: & primo de his, quæ sanguinem supprimunt. p. 256.
- Cap. 2. Quæ vulnus glutinent. p. 256
- Cap. 3. Quæ concoquant, & moveant pus. p. 257.
- Cap. 4. Quæ aperiant vulnera. p. 257.
- Cap. 5. Quæ purgent. p. 257.
- Cap. 6. Quæ rodant. p. 258.
- Cap. 7. Quæ exedant corpus. p. 259.
- Cap. 8. Quæ adurant. p. 259.
- Cap. 9. Quæ crustas ulceribus inducant. p. 260.
- Cap. 10. Quæ crustas ulceribus resolvant. p. 260.
- Cap. 11. Quæ discendant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt. p. 260.
- Cap. 12. Quæ evocent, & educant. p. 261.
- Cap. 13. Quæ exasperata lavent. p. 261.
- Cap. 14. Quæ carnem nutrant, & ulcus impleant. p. 261.
- Cap. 15. Quæ Molliant. p. 261.
- Cap. 16. Quæ cutem purgent. p. 262.
- Cap. 17. De Misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum. p. 262.
- Cap. 18. De Malagmatis. p. 264.
- Cap. 19. De Emplastris. p. 275.
- Cap. 20. De pastillis. p. 284.
- Cap. 21. De Pessis. p. 286.
- Cap. 22. De Medicamentis, quibus aridis utimur. p. 287.
- Cap. 23. De Antidotis. p. 291.
- Cap. 24. De Acopis. p. 293.
- Cap. 25. De catapotitiis. p. 294.
- Cap. 26. De quinque generibus nozarum corporis. p. 299.
- Cap. 27. De vulneribus, quæ per morsus inferuntur, eorumque curationibus. p. 325.
- Cap. 28. De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur. p. 334.

LIB.

INDEX CAPITUM.

LIB. 6.

Cap. 1. De vitiiis singularum corporis partium.	p. 363.
Cap. 2. De porrigine.	p. 364.
Cap. 3. De Sycofi.	p. 365.
Cap. 4. De Areis.	p. 365.
Cap. 5. De Varis , & lenticulis , & Ephelide.	p. 366.
Cap. 6. De Oculorum Morbis.	p. 368.
Cap. 7. De Aurium morbis.	p. 393.
Cap. 8. De Narium morbis.	p. 402.
Cap. 9. De dentium dolore.	p. 404.
Cap. 10. De tonsillis..	p. 407.
Cap. 11. De oris ulceribus.	p. 408.
Cap. 12. De lingua ulceribus.	p. 411.
Cap. 13. De parulis & ulceribus gingivarum.	p. 411.
Cap. 14. De nova morbo.	p. 413.
Cap. 15. De Cancro oris.	p. 414.
Cap. 16. De parotidibus.	p. 415.
Cap. 17. De umbilico prominente.	p. 416.
Cap. 18. De Obscurarum partium vitiiis.	p. 416.
Cap. 19. De digitorum ulceribus.	p. 428.

Lib. 7. Præfatio. pag. 430.

Cap. 1. De vexatis.	p. 432.
Cap. 2. De his , quæ per se intumescunt , quomodo incidenda , & curanda sint.	p. 432.
Cap. 3. De bonis , malisve signis Suppurationum.	p. 436.
Cap. 4. De fistulis.	p. 437.
Cap. 5. De telis è corpore extrahendis.	p. 441.
Cap. 6. De gangliis & Meliceride , & Atheromate & Steatomate , capitis tuberculis.	p. 445.
Cap. 7. De Oculorum vitiiis , quæ scalpello & manu curantur.	p. 447.
Cap. 8. De Aurium morbis , qui manu & scalpello curantur.	p. 465.
Cap. 9.	

INDEX CAPITUM.

Cap. 9. <i>Curia in auribus, labrisque ac Naribus, quomodo farciri & curari possint.</i>	p. 466.
Cap. 10. <i>De Polypo.</i>	p. 469.
Cap. 11. <i>De Ozaena.</i>	p. 469.
Cap. 12. <i>De Oris vitiis, quae manu & ferro curantur.</i>	p. 470.
Cap. 13. <i>De Cervicis visio.</i>	p. 475.
Cap. 14. <i>De Umbilici vitiis.</i>	p. 475.
Cap. 15. <i>Quomodo aqua hydropicis emittatur.</i>	p. 478.
Cap. 16. <i>De ventre, icteru perforato, & intestinis lesis.</i>	p. 480.
Cap. 17. <i>De interiore membrana abdominis rupta.</i>	p. 482.
Cap. 18. <i>De Testiculorum natura & Morbis.</i>	p. 483.
Cap. 19. <i>De testiculorum curationibus communibus: & primo de incisione & curatione inguinis, vel scroti.</i>	p. 488.
Cap. 20. <i>De intestini in scrotum devoluti curatione.</i>	p. 493.
Cap. 21. <i>De Omenti in scrotum prolapsi curatione.</i>	p. 495.
Cap. 22. <i>De Ramicis curatione.</i>	p. 497.
Cap. 23. <i>De carne, quae inter tunicas testiculorum congrevit, & de nervo indurato.</i>	p. 499.
Cap. 24. <i>De Ramice inguinis.</i>	p. 499.
Cap. 25. <i>Ad regendam glandem colis, si nuda est.</i>	p. 500.
Cap. 26. <i>De urinae reddenda difficultate, & curatione.</i>	p. 502.
Cap. 27. <i>De cancro, qui excisa vesica nascitur.</i>	p. 515.
Cap. 28. <i>Si naturalia faminarum non admittunt concubitum, quomodo curari conveniat.</i>	p. 518.
Cap. 29. <i>Qua ratione partus mortuus ex utero excutiat.</i>	p. 519.
Cap. 30. <i>De Ani vitiis.</i>	p. 523.
Cap. 31. <i>De varicibus.</i>	p. 526.
	Cap. 32.

INDEX CAPITUM.

Cap. 32. De digitis coherentibus & curvatis.	p. 527.
C. 33. De gangrena.	p. 528.

L I B. 8.

Cap. 1. De positu & figura ossium totius humani corporis.	p. 529.
Cap. 2. Ossa vitiata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur.	p. 538.
Cap. 3. Quomodo os excidatur: & de modiolio & Terebra, ferramentis ad id paratis.	p. 541.
Cap. 4. De calvaria fracta.	p. 545.
Cap. 5. De Naso fracto.	p. 553.
Cap. 6. De Auribus fractis.	p. 555.
Cap. 7. De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa pertinentibus.	p. 556.
Cap. 8. De jugulo fracto.	p. 558.
Cap. 9. De costis fractis.	p. 560.
Cap. 10. De humerorum, brachiorum, femorum, trurum, digitorum fractorum, vel evulsorum, communibus curationibus.	p. 563.
Cap. 11. De ossibus luxatis.	p. 575.
Cap. 12. De Maxilla luxata.	p. 578.
Cap. 13. De capite luxato.	p. 579.
Cap. 14. De spina luxata.	p. 580.
Cap. 15. De humero luxato.	p. 581.
Cap. 16. De cubito luxato.	p. 583.
Cap. 17. De Manu luxata.	p. 585.
Cap. 18. De palma luxata.	p. 586.
Cap. 19. De digitis luxatis.	p. 586.
Cap. 20. De femore luxato.	p. 586.
Cap. 21. De genu luxato.	p. 589.
Cap. 22. De talo luxato.	p. 590.
Cap. 23. De planta luxata.	p. 590.
Cap. 24. De digitis luxatis.	p. 591.
Cap. 25. De his, qua cum vulnere loco moventur.	p. 591.

F I N I S.



